

1. Bir grup öğrenci proje çalışması kapsamında "Işığın, patates bitkisinin filizlenmesi üzerinde olumlu etkisi vardır." görüşünü ileri sürerek araştırmaya başlıyor. Öğrencilerin bu amaçla yaptığı çalışmaların aşamaları aşağıda verilmiştir.
- 10 adet patates alınarak her biri uzunlamasına ikiye kesilmiştir.
 - Her bir patates parçasının üzerindeki göz bölgeleri sayılıp kaydedilmiştir.
 - Her bir patates parçasının alt kısmı, ıslatılmış kağıt havlulara sarılmış ve kesik kısımları üste gelecek şekilde şeffaf naylon torbalara yerleştirilmiştir.
 - Naylon torbaların ağızları kapatılarak üzerlerine toplu iğneyle eşit sayıda delik açılmıştır.
 - Bu şekilde hazırlanan patateslerden yarısı ışık alan yarısı da karanlık ortama konulup diğer koşullar özdeş tutulmuştur.
 - Öğrenciler bir hafta sonra naylon torbaların ağızlarını açarak her bir patates parçasının üzerindeki filizleri sayarak kaydetmişlerdir. Bu çalışmayı üç kez tekrarlamışlardır.
 - Bulgularına göre ışığın, filizlenmeyi olumlu yönde etkilediğini kaydetmişlerdir.

Öğrencilerin bu proje çalışmasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz?

- (A) Kontrollü deney yapma
- (B) Gözlem yapma
- (C) Teori oluşturma
- (D) Çıkarım yapma
- (E) Hipotez oluşturma

TYT / 2018

2. Canlılar; hareket, beslenme, solunum, boşaltım, uyarıya tepki verme, üreme ve büyüme gibi ortak özelliklere sahiptirler. **Buna göre, bitkilerdeki bazı yaşamsal olaylar ile canlıların ortak özellikleri arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?**

- (A) Atık maddeleri uzaklaştırma – Boşaltım
- (B) CO₂ kullanarak O₂ üretme – Solunum
- (C) Madde yapımı ve yıkımı – Metabolizma
- (D) Yavru oluşturma – Üreme
- (E) Işığa doğru yönelme – Uyarıya tepki verme

YGS / 2014

3. Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur?

- (A) Glukoz → Maltoz
- (B) Protein → Aminoasit
- (C) ATP → ADP
- (D) Hidrojen peroksit → Su
- (E) Nişasta → Glukoz

ÖSS / 2009

4. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde insan derisindeki ter bezlerinden sıvı salgılanarak vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılır.

Vücut sıcaklığının düşürülmesinde, salgılanan sıvı içerisindeki suyun hangi özelliğinden yararlanılmaktadır?

- (A) Suyun iyi bir çözücü madde olması
- (B) Suyun özgül ısısının yüksek olması
- (C) Suyun +4 °C'de en yoğun olması
- (D) Su moleküllerinin adezyon yapması
- (E) Su moleküllerinin yüzey gerilimi oluşturabilmesi

YGS / 2015

5. Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi, suyun hangi özelliğine bağlanabilir?

- (A) Öz ısısının yüksek olmasına
- (B) Molekülleri arasındaki hidrojen bağlarının varlığına
- (C) Hem katı hem sıvı hem de gaz hâlinde olabilmesine
- (D) +4 °C'de en yoğun hâlde bulunmasına
- (E) İyi bir çözücü olmasına

LYS / 2014

6. Selülozun, insanlar tarafından sindirilemeyip dışarıya atılmasına karşın sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

- (A) Yapı biriminin glikoz molekülleri olması
- (B) Yapısında glikozit bağlar içermesi
- (C) Küresel ölçekte en bol bulunan polisakkarit olması
- (D) Uzun zincirli bir polisakkarit olması
- (E) Sindirim kanalı duvarındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyarması

YGS / 2017

7. Yapısal bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- ☐ A Saf kitin yumuşak olmakla birlikte yapısına kalsiyum karbonat tuzunun katılmasıyla sertleşir.
- ☐ B Eklem bacaklı canlıların dış iskeletinde bulunur.
- ☐ C Diğer polisakkaritlerden farklı olarak yapısında azot bulunur.
- ☐ D Birçok mantarın hücre duvarının yapısına katılır.
- ☐ E Böceklerin hücre zarının sertliğini sağlar.

LYS / 2017


8. Nişasta, selüloz ve glikojen molekülleri için;

- I. yapı maddesi olarak işlev görme,
 - II. aynı monomerden yapılmış olma,
 - III. hücre içerisinde depolanabilme
- özelliklerinden hangileri ortakdır?

- ☐ A Yalnız I
- ☐ B Yalnız II
- ☐ C Yalnız III
- ☐ D I ve II
- ☐ E II ve III

LYS / 2015

9. Aşağıdaki şemada, insan kanında gerekenden fazla glikoz olması durumunda, glikozun dönüştürüldüğü moleküller ve depolandığı yerler gösterilmiştir.



Buna göre, I ve II numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

I II

- (A) Yağ Karaciğer
(B) Yağ Pankreas
(C) Protein Pankreas
(D) Nişasta Kas
(E) Nişasta Karaciğer

YGS / 2014

10. Aşağıdaki tabloda X, Y, Z, T ve U maddeleri ile ilgili olarak karaciğerde gerçekleşen bazı metabolizma olayları verilmiştir.

Madde	Sentezleme	Yıkım	Depolanma	Salgılanır
X	+	+	+	
Y		+	+	
Z	+			+
T	+			+
U		+		

Not: Gerçekleşen olaylar + ile gösterilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre, X, Y, Z, T ve U maddelerinden hangisi glikojeni göstermektedir?

- (A) X
(B) Y
(C) Z
(D) T
(E) U

LYS /

11. Trigliseritlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji verirler.
- (B) Yapılarında üç adet ester bağı bulunur.
- (C) Yapılarında üç molekül gliserol bulunur.
- (D) Doymuş veya doymamış olmasını, içerdikleri yağ asitlerinin özelliği belirler.
- (E) Yapıya katılan yağ asitlerinin bir kısmı insan vücudunda sentezlenirken bir kısmı besin yoluyla alınır.

YGS / 2017


12. Birbirine bağlı çok sayıda benzer ya da özdeş monomerden meydana gelmiş uzun moleküllere polimer denir.

Buna göre, aşağıdaki makromoleküllerden hangisi polimerdeğildir?

- (A) Kolesterol
- (B) Kitin
- (C) Glikojen
- (D) Selüloz
- (E) Nişasta

LYS / 2011

13. Aşağıda insan vücudunda sentezlenen tripeptit, trisakkarit ve trigliserit organik moleküllerinin sentezleri şematize edilmiştir.




Bunların sentezlenmeleri sırasında açığa çıkan su molekülü sayılarının kıyaslanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- (A) I = II = III
(B) I = II > III
(C) I = II < III
(D) I > II = III
(E) I < II = III

YGS / 2016

14. Amino asitlerin açık formülünü gösteren aşağıdaki şemada, moleküldeki kimyasal bağlardan beş tanesi numaralandırılmıştır.



Buna göre, bir protein molekülü sentezlenirken ikiamino asit, hangi numarayla gösterilen yerlerden birbirine bağlanır?

Birinci amino asit İkinci amino asit

- | | | |
|-----|---|---|
| (A) | 1 | 4 |
| (B) | 2 | 3 |
| (C) | 3 | 5 |
| (D) | 4 | 2 |
| (E) | 5 | 1 |

LYS / 2014

15. Aşağıdaki organik molekül çiftlerinden hangilerinin yapı taşı benzerdir?

- A) Glikojen – Kolesterol
- B) Glikojen – Nişasta
- C) İnsülin – Kolesterol
- D) İnsülin – Glikojen
- E) İnsülin - Nişasta

YGS / 2013

16. Bir proteinin, yüksek sıcaklıkta, düşük pH koşulunda ya da çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu ortamda, üç boyutlu yapısı bozulmuş, ancak bu durumdan peptit bağları etkilenmemiştir.

Üç boyutlu yapısı bozulmuş bu proteinle ilgili olarak;

- I. Birincil yapısı etkilenmemiştir.
- II. Aminoasitlerin dizilimi bozulmuştur.
- III. İşlev yapamaz konuma gelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız III
- B) Yalnız I
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) Yalnız II

YGS / 2011

17. I. Protein
II. Protein ayırıcı
III. Protein yıkan enzim
IV. Aminoasit
V. Aminoasit ayırıcı

"Aminoasitler, proteinlerin yapı taşlarıdır."
hipotezini kanıtlamak için düzenlenen bir deneyde, yukarıdakilerden hangilerinin birlikte kullanılması gerekir?

- (A) I ve II
(B) I ve III
(C) III ve IV
(D) III ve V
(E) I, III ve V

YGS / 2012

18. Yemek yedikten sonra uzun süre yüzen bir insan enerji elde etmek için kandaki glukozu kullandıktan sonra aşağıdaki moleküllerden hangisini ilk olarak kullanır?

- (A) Kan proteinlerini
(B) Kas proteinlerini
(C) Karaciğerde depolanmış glikojeni
(D) Kandaki aminoasitleri
(E) Yağ dokuda depolanmış yağı

YGS / 2010

19. Azot atomları işaretlenmiş esansiyel (temel) amino asitlerle beslenen bir insanın karaciğer dokusu, belirli bir süre sonra incelenmiştir.

İncelenen dokuda bulunan,


- I. glikoz,
- II. protein,
- III. üre,
- IV. amonyak

bileşiklerinden hangileri işaretli azot taşımaz?

- (A) Yalnız I
- (B) Yalnız II
- (C) I ve III
- (D) II ve III
- (E) III ve IV

ÖSS / 2002

20. Aşağıdaki grafikte, X ve Y enzimlerinin çalıştığı sıcaklık aralıkları gösterilmiştir.



Bu grafiğe göre,

- I. X enzimi endotermik, yani vücudunu belirli bir sıcaklıkta tutması zorunlu bir canlıya ait olabilir.
 - II. Y enzimi termofilik, yani sıcaklık artışına toleranslı bir canlıya ait olabilir.
 - III. X ve Y enzimlerini taşıyan iki farklı canlı aynı yaşam alanını kesinlikle paylaşamaz.
- yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

- (A) Yalnız II
- (B) I ve II
- (C) I ve III
- (D) II ve III
- (E) I, II ve III

21. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Canlılarda yapı malzemesi olarak kullanılırlar.
- (B) Temel yapı birimleri amino asitlerdir.
- (C) Amino asit dizilimleri DNA tarafından belirlenir.
- (D) Amino asit dizilimleri, canlıların akrabalık durumlarını belirlemede kullanılabilir.
- (E) Canlılarda işlev gören tüm enzimlerin yapısı sadece proteinlerden oluşmuştur.

LYS / 2013

22. Yeni toplanmış mısır tanelerinde yüksek düzeyde şeker bulunduğundan taneler tatlıdır. Ancak toplandıktan 1 gün sonra tanelerdeki şekerin %50'si nişastaya dönüştüğünden tatlı tadını kaybeder. Yeni koparılmış mısır koçanı birkaç dakika için kaynayan suya daldırıldıktan sonra soğuk suda soğutulduğunda ve soğuk ortamda saklandığında taneler tatlılığını korur.

Bu işlemin başarısı, enzimlerin aşağıda verilen özelliklerinin hangisinden kaynaklanır?

- (A) Enzimlerin çok hızlı çalışmasından
- (B) Enzimlerin substrata özgül olmasından
- (C) Enzimlerin yapılarının yüksek sıcaklıklarda bozulmasından
- (D) Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH aralığının olmasından
- (E) Enzimlerin pasif durumdan aktif duruma geçebilmelerinden

YGS / 2010

23. Hücrede, enzimlerle gerçekleşen belirli bir tepkimenin hızı ve belirli bir zaman aralığında elde edilen ürün miktarı,

- I. inhibitör madde miktarı,
- II. enzim-substrat bileşimi,
- III. reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi miktarı

özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?

- (A) Yalnız I
- (B) Yalnız II
- (C) I ve II
- (D) I ve III
- (E) I, II ve III

ÖSS / 2009

24. Aşağıdaki moleküllerden hangisi koenzim olarak görev yapar?

- (A) ATP
- (B) B₁ vitamini
- (C) DNA
- (D) RNA
- (E) Gliserol

YGS / 2016

25. Vitaminlerle ilgili,

- I. Yağda çözünen vitaminler vücutta depolanabildiklerinden fazla miktarda alındıklarında olumsuz bir etki göstermezler.
II. Bazı vitaminler koenzim olarak işlev görebilirler.
III. Vücutta enerji depoları tükendiğinde vitaminler, enerji elde etmek için kullanılabilirler.
IV. Bütün canlılar, ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilirler.
V. Öncül madde olarak alınan bazı vitaminler vücutta aktifleştirilebilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- (A) I ve IV
(B) II ve V
(C) III ve IV
(D) III ve V
(E) IV ve V

LYS / 2013

26. Vücutta, K vitamini eksikliğine;

- I. Sindirim kanalında etkili emilimin olmaması
II. Besin içeriğinde yeterli yağın bulunmaması
III. Bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaları öldüren ilaçların uzun süre kullanılması
durumlarından hangileri neden olabilir?

- (A) Yalnız I
(B) Yalnız II
(C) Yalnız III
(D) I ve III
(E) I, II ve III

ÖSS / 2001


27. İşaretli kükürt (^{35}S) içeren bir besi ortamında çoğaltılan bakterilerden elde edilen;
I. DNA,
II. protein,
III. polisakkarit
moleküllerinin hangilerinde işaretli kükürt bulunması beklenir?
- (A) Yalnız I
(B) Yalnız II
(C) Yalnız III
(D) I ve II
(E) II ve III

LYS / 2016

28. Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA'nın ortak özelliklerinden biridir?
- (A) Her birinin yapısında tüm pirimidin baz çeşitleri yer alır.
(B) Her iki molekül de nükleotit polimeridir.
(C) Her zaman zarlı organel içerisinde bulunurlar.
(D) Zincirlerindeki pürin ve pirimidin bazlarının sayıları her zaman birbirine eşittir.
(E) Hücre döngüsünde replikasyon geçirirler.

TYT / 2019

29. Aşağıda, hücreye kullanılabilir enerji sağlayan bir molekül olan ATP şematize edilmiştir.



Buna göre, “?” ile gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Nükleotit
- (B) Adenin
- (C) Riboz
- (D) Guanin
- (E) Nükleozit

YGS / 2014

30. I. Fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer
II. Taşıdığı şeker çeşidi
III. Organik bazın şekere bağlandığı yer
IV. Yapıdaki nükleik asit zincir sayısı

DNA ve RNA yukarıdakilerin hangileri bakımından birbirinden farklılık gösterir?

- (A) I ve II
- (B) I ve IV
- (C) II ve III
- (D) II ve IV
- (E) III ve IV

LYS / 2010

31. Nükleik asitlerin,

- I. organel yapısında yer alma,
- II. protein sentezinde rol oynama,
- III. aminoasitleri tanıma

özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

ÖSS / 2006

32. Bir geni oluşturan DNA molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla, gende bulunan,

- I. Organik baz sayısı
- II. Nükleotit çeşitlerinin sayısı
- III. Nükleotit sayısı
- IV. Deoksiriboz molekül sayısı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız IV
- C) I ve II
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV


ÖSS / 2000

33. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır." hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir?

- A) Nişasta ayırıcı + Nişasta yıkan enzim
- B) Nişasta yıkan enzim + Monosakkarit ayırıcı
- C) Nişasta + Monosakkarit ayırıcı
- D) Monosakkarit + Nişasta yıkan enzim
- E) Monosakkarit + Monosakkarit ayırıcı

(1999 - ÖSS)

34.




Koşulları sabit bir ortamda tutulan ve bolca sulandıktan sonra üç gün su verilmeyen bir bitkinin, 1., 2. ve 3. günler için ayrı ayrı olmak üzere 24 saat boyunca terleme hızı ölçülmüş ve yukarıdaki grafik elde edilmiştir.

Bu grafikteki K, L ve M eğrileri hangi günlere aittir?

	K	L	M
A)	3.	2.	1.
B)	1.	3.	2.
C)	2.	1.	3.
D)	3.	1.	2.
E)	1.	2.	3.

(1988 - ÖSS)

35.



Büyük bir akvaryumdaki su sıcaklığı, bir uçtan öbür uca doğru gittikçe, 0 °C'den 30 °C'ye artmaktadır. Bu akvaryuma bir balık türü konuyor. Bir süre sonra akvaryumun değişik sıcaklıktaki bölgelerinde bulunan balıklar sayılıyor ve bu sayılardan yukarıdaki grafik elde ediliyor.

Bu bilgilere göre, deneyde kullanılan balık türü için en uygun sıcaklık aralığı nedir?

- A) 25 °C – 30 °C B) 20 °C – 25 °C
C) 15 °C – 20 °C D) 10 °C – 15 °C
E) 5 °C – 10 °C

Q - 1541

(1985 - ÖSS)

36.

Sık dallı ve bol yapraklı bir ağaç türünün, ormanda yetiştirildiğinde, fazla dallanmayıp boyuna geliştiği ve sadece tepe kısımlarının bol yapraklı olduğu belirlenmiştir.

Bu farklı gelişme biçimine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nem B) Sıcaklık
C) Oksijen D) Işık
E) Mineral maddeler

(1992 - ÖSS)

37. Hücrede gerçekleşen biyokimyasal olaylarla ilgili,
- Hücre içi enerji üreten reaksiyonların başlaması için enerji gerekir.
 - Metabolik bir yolda yer alan enzimler birbirini izleyerek işlev görür.
 - Reaksiyonun başlaması için enzimin bulunması her zaman yeterlidir.
- açıklamalarından hangileri doğrudur?**
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
- (2006 - ÖSS Fen-1)

38. Ototrof bir organizmada glikozdan protein, yağ ve polisakkarit sentezlenirken,
- Klorofil
 - Enzimler
 - ATP
 - Madensel tuz
- moleküllerinden hangileri harcanır?**
- A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) II, III ve IV
- (1998 - ÖSS)

39. Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde, dokularda, aşağıdaki moleküllerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?


- A) Temel aminoasitlerin
- B) Gliserolün
- C) Glikojenin
- D) Yağ asitlerinin
- E) Karbon dioksitin

(1998 - ÖSS)

40. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar?

- A) ATP
 - B) tRNA
 - C) Aminoasit
 - D) mRNA
 - E) Su
- (2005 - ÖSS)

41. Aşağıdaki grafik, insanda uzun süreli açlıkta vücuttaki yağ, protein ve karbonhidrat miktarlarının değişimi göstermektedir.



Bu grafikte yağ, protein ve karbonhidrat miktarlarının değişimini gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	Yağ	Protein	Karbonhidrat
A)	III	II	I
B)	II	III	I
C)	II	I	III
D)	I	III	II
E)	I	II	III

(1998 - ÖSS)

42. Vitaminlerle ilgili bazı özellikler şunlardır:

- Bazılarının suda, bazılarının yağda çözünmesi
- Bazılarının heterotrof canlıların vücudunda depolanamaması
- Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reaksiyonun gerçekleşmesinde rol alması
- Heterotrof canlılar tarafından doğrudan sentezlenememesi


Bu özelliklerden hangileri, heterotrof canlılarda, bir vitamin eksikliğiyle ortaya çıkan bozukluğun başka bir vitaminle giderilemesinin nedenidir?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve IV E) III ve IV

(1999 - ÖSS)


43. Enzimlerin aktif oldukları pH aralıkları farklıdır. İnsanda, midede salgılanan pepsin enzimi ile onikiparmak bağırsağına boşaltılan tripsin enziminin aktif oldukları pH değerleri aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

— : pepsin
 : tripsin



(2001 - ÖSS)

- 44.



Yukarıdaki grafik bir kimyasal olayın iki ayrı enerji düzeyinde de gerçekleşebileceğini göstermektedir.

Bir hücrede, bu olayın 2. eğrideki gibi gerçekleşmesini,

- I. Reaksiyona giren molekül sayısının azalması
 - II. Enzimlerin reaksiyona girmesi
 - III. Reaksiyona giren molekül sayısının artması
- durumlarından hangileri sağlar?**

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

(1996 - ÖSS)

45. Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilir ve izlendiğinde, işaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada, daha sonra gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.

Buna göre, işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp glikoz sentezlendikten sonra, işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan,

- I. Aminoasit yapımı
- II. Nişasta sindirimi
- III. Protein yapımı
- IV. Nişasta yapımı

olayları, aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

- A) IV - III - I - II
- B) IV - II - I - III
- C) III - IV - II - I
- D) II - IV - III - I
- E) II - I - III - IV

(1995 - ÖSS)

46. Bir fareye işaretlenmiş yağ molekülü verilmiş ve fare bir süre aç bırakılmıştır.

Bu sürenin sonunda, işaretlenmiş karbonun karaciğerindeki glikojen molekülünde olduğu saptanmıştır.

Bu durum, farenin karaciğer hücrelerinde;

- I. Yalnızca gliserolün depolamada kullanılması
- II. Yağların karbonhidratlara dönüşmesi
- III. Yağ asitlerinin kullanılmayıp, hücre dışına atılması

olaylarından hangilerinin gerçekleştiğine kanıt olabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

(1998 - ÖYS)

47. Aşağıdakilerden hangisi, hücrede çalışan enzimlerin, reaksiyon hızını doğrudan etkilemez?

- A) Ortamın pH düzeyi
- B) Kofaktör konsantrasyonu
- C) Oksijen miktarı
- D) Substrat konsantrasyonu
- E) Ortamın sıcaklığı

(1998 - ÖYS)

48. Mısır bitkisinin kök ucundaki hücrelerinde, solunum hızının belirli bir sıcaklık derecesine kadar arttığı, ancak daha yüksek sıcaklık derecelerine doğru, giderek azaldığı belirlenmiştir.

Solunum hızındaki bu azalmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karbondioksitin ortamda birikmesi
- B) Enzimlerin etkinliklerinin değişmesi
- C) Ortamdaki oksijen miktarının azalması
- D) Suyun buharlaşması
- E) Ortamdaki asit-baz dengesinin bozulması

(1993 - ÖYS)

49. Canlıların, hücrelerindeki biyokimyasal olayları ancak belli sıcaklık sınırları arasında yapabilmeleri, aşağıdaki moleküllerden hangisinin tipik özelliğine bağlıdır?

- A) Su
B) Protein
C) Madensel tuz
D) Yağ
E) Karbonhidrat

(1987 - ÖYS)

50. Aşağıdakilerden hangisi, A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerinden biridir?

- A) Suda erime
B) Göz retinasının normal yapısının korunmasında rol oynama
C) Güneş ışınları yardımı ile deride oluşma
D) Karaciğerde depolanma
E) Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme

(1987 - ÖYS)

51. İnsanlarda D vitamini eksikliği, aşağıdaki maddelerden hangilerinin vücuttaki dengesinin bozulmasına neden olur?

- A) İyot-klor B) Kalsiyum-fosfor
C) Sodyum-potasyum D) Magnezyum-demir
E) Azot-bakır

(1985 - ÖYS)

52. İnsanlarda D vitamini eksikliği, aşağıdaki maddelerden hangilerinin vücuttaki dengesinin bozulmasına neden olur?

- A) İyot-klor B) Kalsiyum-fosfor
C) Sodyum-potasyum D) Magnezyum-demir
E) Azot-bakır

(1985 - ÖYS)

53. Baygınlık geçiren bir insana, çabucak şeker verilmesi gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisini kullanmak en uygun olur?

- A) Sakkaroz B) Maktoz
C) Laktoz D) Glikoz
E) Glikojen

(1983 - ÖYS)

54. Aşağıdaki olayların hangisinde ATP sentezi yapılır?

- A) Aminoasitlerden proteinlerin oluşması
B) Bir amipten iki amibin oluşması
C) Yeşil bitkilerin CO_2 ve H_2O 'dan glikoz sentezlemesi
D) Tuzlu su ortamında canlıların su kaybetmesi
E) Bitkilerin topraktan madensel bileşikleri alması

(1983 - ÖYS)

55. Elçi RNA'ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tekrar tekrar kullanılmaları
- B) Tek dizi nükleotit taşımaları
- C) Nükleotitlerden yapılmış olmaları
- D) Aminoasitleri bağlamaları
- E) Biyolojik şifreyi taşımaları

(1981 - ÖYS)

1-C	2-B	3-A	4-B	5-B	6-E	7-E	8-B	9-A	10-A
11-C	12-A	13-C	14-E	15-B	16-D	17-E	18-C	19-A	20-B
21-E	22-C	23-C	24-B	25-B	26-E	27-B	28-B	29-E	30-D
31-B	32-E	33-C	34-E	35-B	36-D	37-C	38-C	39-A	40-E
41-B	42-B	43-A	44-B	45-B	46-B	47-C	48-B	49-B	50-D
51-B	52-B	53-D	54-C	55-A					