

桐城市范岗镇单季稻“3414”肥料效应田间试验

叶四明

(桐城市范岗镇人民政府(农业农村发展中心), 安徽 桐城 231400)

摘要 [目的] 初步明确桐城市范岗镇砂壤质稻田单季稻氮、磷、钾肥的适宜施用量, 为完善当地水稻测土配方施肥指标体系积累基础数据。[方法] 2025 年以杂交籼稻吨两优 900 为材料, 采用“3414”完全试验设计(N、 P_2O_5 、 K_2O 各 4 个水平, 14 个处理, 不设重复), 研究不同施肥处理对水稻经济性状、产量及效益的影响, 拟合肥料效应方程, 并以缺素区相对产量评价土壤供肥能力。[结果] 处理 10 (N 270 kg/hm²、 P_2O_5 180 kg/hm²、 K_2O 337.5 kg/hm²) 产量最高, 为 10200.0 kg/hm², 较无肥区增产 54.5%, 扣除肥料成本后收益 22091.4 元/hm²; 但钾素序列产量非单调变化, 其增产幅度尚不能排除单小区田间误差。缺氮、缺磷、缺钾区相对产量分别为 74.3%、85.5% 和 94.9%, 肥料贡献率依次为 25.7%、14.5% 和 5.1%, 效应表现为 N>P>K。三元二次方程未通过典型性检验, 各单因素方程回归均未达显著水平, 仅作参考描述; 施 N 超过 270 kg/hm² 后结实率和千粒重下降、产量不再增加, 磷、钾肥效应在试验范围内未出现拐点。[结论] 在单年单点、不设重复的条件下, 初步提出该区域单季稻施 N 270 kg/hm²、 P_2O_5 90~180 kg/hm²、 K_2O 112.5~225 kg/hm², 氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%、钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分施, 磷肥全部基施。因试验 2 水平高于当地常规推荐量、磷钾效应未出现拐点, 其适宜用量尚需多点多年重复试验验证。

关键词 单季稻; “3414”试验; 肥料效应; 推荐施肥量; 测土配方施肥; 桐城市

中图分类号 S511; S147.2 文献标识码 A

Field Experiment on Fertilizer Effects of Single-season Rice Based on “3414” Design in Fangang Town, Tongcheng City

YE Si-ming

(Agricultural and Rural Development Center, People's Government of Fangang Town, Tongcheng City, Tongcheng, Anhui 231400)

Abstract [Objective] To preliminarily determine the appropriate application rates of nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) fertilizers for single-season rice grown on sandy loam paddy soil in Fangang Town, Tongcheng City, and to accumulate basic data for improving the local index system of soil testing and formulated fertilization. [Method] A “3414” field experiment (three factors, four levels, 14 treatments, without replication) was conducted in 2025 with the hybrid indica rice cultivar Dunliangyou 900. Agronomic traits, grain yield and economic returns were investigated, fertilizer response functions were fitted, and soil nutrient supply capacity was evaluated by the relative yields of nutrient-omission plots. [Result] Treatment 10 (N 270 kg/hm², P_2O_5 180 kg/hm², K_2O 337.5 kg/hm²) gave the highest yield of 10200.0 kg/hm², 54.5% higher than that of the unfertilized control, and the highest return after deducting fertilizer cost (22091.4 yuan/hm²); however, yields along the K series varied non-monotonically, so this yield advantage cannot be separated from plot-to-plot error. The relative yields of the N-, P- and K-omission plots were 74.3%, 85.5% and 94.9%, and the contribution rates of N, P and K fertilizers were 25.7%, 14.5% and 5.1%, respectively, indicating a fertilizer response order of N > P > K. The ternary quadratic model failed the typicality test, and none of the single-factor regressions reached significance, so the equations describe trends only. Rice yield levelled off at an N rate of about 270 kg/hm² (the linear-plus-plateau model placed the join point at approximately 280 kg/hm²); seed-setting rate and 1000-grain weight declined and yield no longer increased when the N rate exceeded 270 kg/hm², whereas no turning point was reached for P or K within the tested range. [Conclusion] Under the single-site, single-season and unreplicated conditions of this trial, N 270 kg/hm², P_2O_5 90–180 kg/hm² and K_2O 112.5–225 kg/hm² are proposed for single-season rice on sandy loam paddy soil in Fangang Town, with N split as basal:tillering:panicle = 50%:25%:25%, K split as basal:panicle = 60%:40%, and P applied entirely as basal fertilizer. Because the level-2 rates of this trial were higher than conventional local recommendations and no turning point was reached for P or K, the appropriate rates of these two nutrients require verification by multi-site and multi-year replicated trials.

Key words Single-season rice; “3414” experiment; Fertilizer effect; Recommended fertilization rate; Soil testing and formulated fertilization; Tongcheng City

单季稻是安徽省桐城市范岗镇的主要粮食作物，长期以来当地农户多凭经验施肥，氮磷钾配比失调、重施基肥等问题普遍，既增加成本又降低肥料利用率并带来面源污染风险^[1-2]。测土配方施肥以土壤测试和肥料田间试验为基础确定肥料用量、配比与施用方法，其中“3414”试验是核心环节，可建立肥料效应函数并据以确定推荐施肥量与土壤养分丰缺指标^[3-4]。国内各稻区已开展大量水稻“3414”试验^[5-6]，安徽省内的结果也表明缺氮区减产幅度最大，但最佳施肥量因土壤类型、品种和栽培方式而异^[7-9]。范岗镇砂壤质稻田保肥供肥能力弱、系统肥效数据缺乏，新推广杂交籼稻的应用也使原有施肥参数亟需更新。为此于 2025 年开展本试验，研究氮磷钾施肥水平对经济性状、产量和效益的影响，拟合肥料效应方程并评价土壤供肥能力。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于 2025 年在桐城市范岗镇新西村孙庄组进行。试验田地势平坦、肥力均匀、排灌方便、交通便利，具有代表性，面积约 0.11 hm²，前茬为冬闲田。土壤为水稻土，质地砂壤，pH 6.1。

1.2 供试材料

供试水稻品种为杂交籼稻吨两优 900。供试肥料为尿素（N 46.3%）、颗粒过磷酸钙（P₂O₅≥12%）和氯化钾（K₂O≥60%），均为当地农资市场常规产品。

1.3 试验设计

试验采用《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911—2016）推荐的“3414”完全试验设计方案^[3]，即氮（N）、磷（P₂O₅）、钾（K₂O）3 个因素，每个因素设 4 个水平，共 14 个处理。其中，0 水平为不施该种肥料；2 水平按当地高产田农户实际施肥习惯和目标产量确定，即 N 18 kg/667m²、P₂O₅ 12 kg/667m²、K₂O 15 kg/667m²，折合 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 180 kg/hm²、K₂O 225 kg/hm²；1 水平为 2 水平的 0.5 倍；3 水平为 2 水平的 1.5 倍。各处理施肥量见表 1。

该 2 水平高于安徽省单季稻常规推荐量（一般 N 180~225 kg/hm²、P₂O₅ 60~90 kg/hm²、K₂O 120~150 kg/hm²）^[7,9]，故本试验实际考察的是常规推荐量及以上区间的肥料效应。小区面积 30 m²（长 10 m、宽 3 m），分 2 排布置、随机排列，不设重复，因而无法通过区组校正田间肥力梯度。小区间人工筑埂并覆膜以防肥水串渗，四周设保护行与排灌沟，各小区单排单灌。

表 1 各处理施肥水平及施肥量

处理编号	处理	施肥水平			施肥量/(kg/hm ²)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	N ₀ P ₀ K ₀	0	0	0	0.0	0.0	0.0
2	N ₀ P ₂ K ₂	0	2	2	0.0	180.0	225.0
3	N ₁ P ₂ K ₂	1	2	2	135.0	180.0	225.0
4	N ₂ P ₀ K ₂	2	0	2	270.0	0.0	225.0
5	N ₂ P ₁ K ₂	2	1	2	270.0	90.0	225.0
6	N ₂ P ₂ K ₂	2	2	2	270.0	180.0	225.0
7	N ₂ P ₃ K ₂	2	3	2	270.0	270.0	225.0
8	N ₂ P ₂ K ₀	2	2	0	270.0	180.0	0.0
9	N ₂ P ₂ K ₁	2	2	1	270.0	180.0	112.5
10	N ₂ P ₂ K ₃	2	2	3	270.0	180.0	337.5
11	N ₃ P ₂ K ₂	3	2	2	405.0	180.0	225.0
12	N ₁ P ₁ K ₂	1	1	2	135.0	90.0	225.0
13	N ₁ P ₂ K ₁	1	2	1	135.0	180.0	112.5
14	N ₂ P ₁ K ₁	2	1	1	270.0	90.0	112.5

1.4 田间管理

2025 年 5 月 2 日播种育秧，6 月 7 日人工移栽，栽插规格 30 cm×20 cm（约 16.7 万穴/hm²），每穴 2~3 苗。氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%于 6 月 6 日、6 月 13 日、8 月 10 日分 3 次施用，磷肥全部作基肥，钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分 2 次施用。7 月 18 日、8 月 23 日两次施药防治主要病虫；各小区药剂种类、用量及水分管理完全一致，与当地常规栽培相同。

1.5 测定项目与方法

成熟期每小区选取有代表性稻株 10 穴，调查单穴有效穗数，按栽插密度 16.7 万穴/hm²折算群体有效穗数，并测定株高、穗长、每穗总粒数、每穗实粒数、结实率和千粒重；各小区全部单收单打，脱粒、晒干扬净后称重，折算成单位面积产量。本试验未测定耕层土壤养分含量，土壤供肥能力按《测土配方施肥技术规程》（NY/T 2911—2016）以缺素区相对产量评价^[3]。

1.6 数据处理

数据用 Excel 整理，用 Python 3.12（NumPy、SciPy）进行回归拟合和 Pearson 相关分析，相关系数显著性采用 *t* 检验。

相对产量（%）=缺素区产量/全肥区（处理 6）产量×100；肥料贡献率（%）=（全肥区产量-缺素区产量）/全肥区产量×100；农学效率（kg/kg）=（全肥区产量-缺素区产量）/该养分施用量^[3]。土壤养分丰缺等级按缺素区相对产量划分：<50%为“极低”，50%≤相对产量<75%为“低”，75%≤相对产量<95%为“中”，≥95%为“高”^[3]。

肥料效应方程分别按三元二次方程、一元二次方程和线性加平台模型拟合^[4,10]，一元二次方程分别以处理 2、3、6、11（氮）、4、5、6、7（磷）和 8、9、6、10（钾）的产量拟合，最高产量施肥量由一阶导数为 0 求得；因三元二次方程未通过典型性检验、磷钾方程极值点远超设计范围，最佳经济施肥量改用相邻水平间的边际分析（边际产值与边际肥料成本之比）评价^[11]。

经济效益按试验当年当地市场价计：尿素 2.10 元/kg、颗粒过磷酸钙 0.80 元/kg、氯化钾 3.20 元/kg，折合纯 N 4.54 元/kg、P₂O₅ 6.67 元/kg、K₂O 5.33 元/kg；稻谷按 2025 年国家中晚籼稻最低收购价折合 2.58 元/kg。扣除肥料成本后收益=产值-肥料成本，产投比=增产值/肥料成本。因各处理除肥料外投入相同，仅以肥料成本作为差异性成本，所得收益仅用于处理间比较，不代表实际纯收益。

本试验不设重复，无法估计试验误差，故未作方差分析与多重比较，处理间差异仅作趋势性描述；效应方程残差中不含独立的试验误差估计，所给 R^2 、 F 、 P 值仅用于比较模型拟合优劣，不作为肥效显著性的推断依据。全文除相关分析外不使用“显著”等统计学推断术语。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理对水稻经济性状的影响

由表 2 可知，各处理株高 115.2~120.7 cm，有效穗数 208.5 万~286.5 万穗/hm²，每穗总粒数 187.5~208.9 粒，结实率 80.5%~87.6%，千粒重 23.1~23.8 g。无肥区（处理 1）的株高、穗长、有效穗数、每穗总粒数和每穗实粒数均为各处理最低，但结实率（86.0%）和千粒重（23.2 g）处于中上水平，说明不施肥主要通过限制群体大小和穗粒数、而非籽粒充实度来降低产量。

磷、钾为 2 水平时，随施氮量由 0 增至 405 kg/hm²，有效穗数由 210.0 万穗/hm²增至 286.5 万穗/hm²，每穗总粒数由 189.7 粒增至 202.5 粒（N2 水平后不再增加），表明增施氮肥主要扩大群体、增加有效穗数，对每穗总粒数的促进在 N2 水平即达上限；但结实率由 87.0%降至 80.5%，千粒重在 N2 水平最高（23.5 g）、N3 降至 23.1 g，说明施氮超过 270 kg/hm²后群体过大，结实率与千粒重随之下降。

随施磷量增加，有效穗数由 244.5 万穗/hm²增至 273.0 万穗/hm²，每穗实粒数由 164.6 粒增至 176.7 粒；随施钾量增加，结实率由 84.2%升至 87.6%、千粒重由 23.1 g 增至 23.8 g。相关分析以 14 个处理为观测单位（ $n=14$ ， $df=12$ ， $r_{0.05}=0.532$ ， $r_{0.01}=0.661$ ），产量与每穗总粒数、有效穗数、穗长、株高和每穗实粒数呈极显著正相关（ r 依次为 0.979、0.936、0.807、0.801 和 0.748），与千粒重、结实率未达显著（ r 分别为 0.517 和 -0.126）。因各构成因素与产量互为乘积关系，上述结果只能说明增产主要伴随有效穗数与每穗总粒数增加，不足以判定因果或主次。

表 2 不同施肥处理水稻主要经济性状

处理	株高/cm	穗长/cm	有效穗数/(万穗/hm ²)	每穗总粒数/粒	每穗实粒数/粒	结实率/%	千粒重/g
1	115.2	23.8	208.5	187.5	161.3	86.0	23.2
2	116.1	23.9	210.0	189.7	165.1	87.0	23.3
3	118.1	24.1	229.5	192.1	167.5	87.2	23.3
4	118.5	24.2	244.5	194.6	164.6	84.6	23.1
5	118.6	24.3	253.5	195.9	167.1	85.3	23.4
6	118.9	24.7	264.0	202.5	175.2	86.5	23.5
7	118.9	24.8	273.0	203.8	176.7	86.7	23.6
8	118.9	24.5	271.5	196.1	165.1	84.2	23.1
9	119.0	24.6	271.5	201.3	172.5	85.7	23.3
10	119.2	25.1	276.0	208.9	183.1	87.6	23.8
11	120.7	25.8	286.5	202.5	163.0	80.5	23.1
12	118.7	24.2	238.5	194.4	169.1	87.0	23.4
13	118.8	24.4	241.5	196.8	171.7	87.2	23.5
14	118.6	24.3	252.0	195.3	166.0	85.0	23.3

2.2 不同施肥处理对水稻产量的影响

由表 3 可知，各处理产量 6600.0~10200.0 kg/hm²，以处理 10（N₂P₂K₃）最高，较无肥区增产 3600.0 kg/hm²、增产率 54.5%，其次为处理 7、9、6（分别增产 46.0%、40.4%和 39.4%）。缺氮区（处理 2）仅增产 3.5%，远低于缺磷区（19.2%）和缺钾区（32.3%），说明氮素是限制该田块产量的首要因子，磷次之，钾的限制作用最小。需指出小区实收误差 0.1 kg 即相当于 33.3 kg/hm²，不设重复时差异较小者不宜据以判定优劣。

磷钾为2水平时，N0~N3的产量分别为6833.3、7600.0、9200.0和9166.7 kg/hm²，N2较N1增产21.1%而N3较N2减产0.4%，表明施氮达270 kg/hm²后产量趋于平台。氮钾为2水平时，P0~P3产量由7866.7升至9633.3 kg/hm²，P3较P2仍增产4.7%。氮磷为2水平时，K0~K3产量为8733.3、9266.7、9200.0和10200.0 kg/hm²，总体上升，但K1与K2接近且序列内部非单调，可能与未设重复、存在田间误差有关。

表 3 不同施肥处理水稻产量与经济效益

处理	施肥组合	折合产量/(kg/hm ²)	增产率/%	位次	产值/(元/hm ²)	肥料成本/(元/hm ²)	扣肥料成本后收益/(元/hm ²)	产投比
1	N ₀ P ₀ K ₀	6600.0	0.0	14	17028.0	0.0	17028.0	—
2	N ₀ P ₂ K ₂	6833.3	3.5	13	17630.0	2400.0	15230.0	0.25
3	N ₁ P ₂ K ₂	7600.0	15.2	12	19608.0	3012.3	16595.7	0.86
4	N ₂ P ₀ K ₂	7866.7	19.2	11	20296.0	2424.6	17871.4	1.35
5	N ₂ P ₁ K ₂	8366.7	26.8	7	21586.0	3024.6	18561.4	1.51
6	N ₂ P ₂ K ₂	9200.0	39.4	4	23736.0	3624.6	20111.4	1.85
7	N ₂ P ₃ K ₂	9633.3	46.0	2	24854.0	4224.6	20629.4	1.85
8	N ₂ P ₂ K ₀	8733.3	32.3	6	22532.0	2424.6	20107.4	2.27
9	N ₂ P ₂ K ₁	9266.7	40.4	3	23908.0	3024.6	20883.4	2.27
10	N ₂ P ₂ K ₃	10200.0	54.5	1	26316.0	4224.6	22091.4	2.20
11	N ₃ P ₂ K ₂	9166.7	38.9	5	23650.0	4236.9	19413.1	1.56
12	N ₁ P ₁ K ₂	7966.7	20.7	10	20554.0	2412.3	18141.7	1.46
13	N ₁ P ₂ K ₁	8233.3	24.7	9	21242.0	2412.3	18829.7	1.75
14	N ₂ P ₁ K ₁	8266.7	25.3	8	21328.0	2424.6	18903.4	1.77

注：小区面积30 m²，折合产量=小区产量×10000/30；CK为处理1（无肥区）；增值=（各处理产量-CK产量）×稻谷价格，产投比=增值/肥料成本。因各处理除肥料外投入相同，表中收益仅用于处理间比较，不代表实际纯收益。

2.3 土壤供肥能力与肥料贡献率

由表4可知，无肥区相对产量为71.7%，即土壤基础地力对产量的贡献率为71.7%。缺氮区、缺磷区和缺钾区的相对产量分别为74.3%、85.5%和94.9%，据此试验田土壤供氮能力属“低”水平，供磷、供钾能力属“中”水平，其中供钾能力已接近“高”水平。氮、磷、钾肥贡献率分别为25.7%、14.5%和5.1%，农学效率分别为8.77、7.41和2.07 kg/kg，肥料增产效应表现为N>P>K^[12]。

需指出的是，相对产量反映当季供应能力而非养分储量，砂壤质稻田缓效钾可在当季释放，故缺钾区相对产量较高并不等于钾素储量充裕；且缺氮区相对产量紧邻“低”与“中”的临界值（75%），小区实收相差0.2 kg即可改变判定，对基数选择亦敏感（以产量最高的处理10为基数时，三者分别为67.0%、77.1%和85.6%）。本试验未测定土壤养分含量，上述等级仅为初步判定，尚需结合土壤化验结果和多点试验验证。

表 4 缺素区相对产量、土壤供肥能力与肥料贡献率

处理	类型	产量/(kg/hm ²)	相对产量/%	养分丰缺等级	肥料贡献率/%	农学效率/(kg/kg)
1	无肥区 (N ₀ P ₀ K ₀)	6600.0	71.7	—	—	—
2	缺氮区 (N ₀ P ₂ K ₂)	6833.3	74.3	低	25.7	8.77
4	缺磷区 (N ₂ P ₀ K ₂)	7866.7	85.5	中	14.5	7.41
8	缺钾区 (N ₂ P ₂ K ₀)	8733.3	94.9	中	5.1	2.07
6	全肥区 (N ₂ P ₂ K ₂)	9200.0	100.0	—	—	—

注：相对产量以全肥区（处理6）产量为100%；农学效率=（全肥区产量-缺素区产量）/该养分施用量。氮磷钾肥综合贡献率为28.3% [=（全肥区产量-无肥区产量）/全肥区产量×100]。因各单养分贡献率系分别以相应缺素区计算，养分间存在交互作用，三者之和（45.3%）与综合贡献率含义不同，不可相加比较。

2.4 肥料效应方程拟合与推荐施肥量

2.4.1 三元二次肥料效应方程

以 N、P₂O₅、K₂O 施用量 (kg/hm²) 为自变量、产量 (kg/hm²) 为因变量，拟合得到三元二次肥料效应方程：

$$y=6624.85+8.4197N+5.1043P-6.3947K-0.0198N^2-0.0073P^2+0.0188K^2+0.0163NP+0.0145NK-0.0041PK$$

该方程 $R^2=0.9366$ 、 $F=6.56$ ($P=0.043$)，但 14 个观测值拟合 10 个参数、残差自由度仅 4，校正 R^2 降至 0.7939，拟合优度表现偏高源于自由度不足。方程中 K 的一次项系数为负、二次项为正，不符合报酬递减规律；驻点 (N 671.4、P₂O₅ 1087.2、K₂O 29.4 kg/hm²) 中 N、P₂O₅ 分别为试验最高用量的 1.7 倍和 4.0 倍、K₂O 远低于 2 水平，均无农艺学意义；二阶偏导数矩阵特征值一正二负 (0.0402、-0.0067、-0.0502)，驻点为鞍点。故未通过典型性检验，不能用于推荐施肥量计算^[4]，这可能与磷钾效应未出现拐点及未设重复有关；磷钾出现拐点时该方程可获较好拟合并据以推荐施肥^[13]。

2.4.2 单因素肥料效应方程

分别拟合氮、磷、钾的一元二次效应方程 (表 5、图 1)。因每个因素仅设 4 个施肥水平、拟合 3 个参数后残差自由度仅为 1，各单因素回归方程均未达显著水平 (N、P₂O₅、K₂O 的 P 值分别为 0.270、0.119 和 0.350)，故效应方程只作趋势描述、不作统计推断。

氮肥效应方程为 $y=6710.00+10.8148x-0.01097x^2$ ($R^2=0.9269$)，符合报酬递减规律、属典型方程，但据其计算的最高产量施氮量达 492.7 kg/hm²，超出试验设计范围，系产量在 N2 与 N3 之间已趋平台而二次方程曲率较小所致。改用线性加平台模型得 $y=6694.4+8.766x$ ($x<282.0$)、 $y=9166.5$ ($x\geq282.0$)，拟合优于一元二次方程 (R^2 分别为 0.9722 和 0.9269)，拐点约 280 kg/hm²；因平台段仅 N3 一个观测点，其置信区间无法估计，但与处理间直接比较的结果方向一致。

磷肥效应方程为 $y=7830.00+7.3704x-0.00206x^2$ ($R^2=0.9859$)，二次项系数接近于 0，产量在试验施磷范围内近似呈线性增加 ($y=7846.7+6.815x$ ， $r=0.9926$)；由方程计算的最高产量施磷量 (1791.0 kg/hm²) 无实际意义，说明磷肥效应尚未达到拐点。钾肥效应方程为 $y=8816.67+0.7407x+0.00922x^2$ ($R^2=0.8773$)，二次项系数为正，属非典型方程；以线性方程拟合得 $y=8700.0+3.852x$ ($r=0.9106$)，产量随施钾量增加总体呈上升趋势。

表 5 氮、磷、钾单因素肥料效应方程

因素	模型	效应方程	R^2	F	P	典型性	最高产量施 肥量/(kg/hm ²)	最高产量/ (kg/hm ²)
N	一元二次	$y=6710.00+10.8148x-0.01097x^2$	0.9269	6.34	0.270	典型	492.7 ^b	9374.5 ^b
N	线性加平 台	$y=6694.4+8.766x$ ($x<282.0$) ; $y=9166.5$ ($x\geq282.0$)	0.9722	—	—	—	282.0	9166.5
P ₂ O ₅	一元二次	$y=7830.00+7.3704x-0.00206x^2$	0.9859	35.00	0.119	典型	1791.0 ^b	14430.2 ^b
P ₂ O ₅	线性	$y=7846.7+6.815x$	0.9853	—	—	—	—	—
K ₂ O	一元二次	$y=8816.67+0.7407x+0.00922x^2$	0.8773	3.58	0.350	非典型	—	—
K ₂ O	线性	$y=8700.0+3.852x$	0.8292	—	—	—	—	—

注：x 为该养分施用量 (kg/hm²)，y 为产量 (kg/hm²)；“—”表示不适用。F、P 由 4 个施肥水平的产量拟合求得，残差自由度仅为 1，各回归方程均未达显著水平，方程仅用于描述趋势。典型性检验仅适用于一元二次方程（一次项系数为正、二次项系数为负），线性及线性加平台模型不适用。^b由方程外推所得，超出试验设计范围，无实际农学意义，不作为推荐施肥依据。




图1 氮 (a)、磷 (b)、钾 (c) 单因素肥料效应

2.4.3 边际效益分析与推荐施肥量

由于磷、钾效应方程无法直接求得最佳经济施肥量，进一步用边际分析法比较相邻水平间的边际效益（表6）^[11]。氮肥 N0→N1、N1→N2 的边际产投比分别为 3.23 和 6.74，N2→N3 时边际产量为负，说明施氮以 270 kg/hm² 为宜。磷肥 P0→P1、P1→P2、P2→P3 的边际产投比分别为 2.15、3.58 和 1.86，均大于 1，但 P2→P3 已明显下降。钾肥 K0→K1 为 2.29、K1→K2 为负值、K2→K3 又回升至 4.30，序列内部不一致，表明钾肥效应已接近本试验的误差检出限，不宜据单一相邻水平推断最适用量。

综合单因素效应方程、边际效益分析和土壤供肥能力评价，本试验条件下单季稻的推荐施肥量为 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 90~180 kg/hm²、K₂O 112.5~225 kg/hm²。处理 10 (K₂O 337.5 kg/hm²) 虽在本试验中产量与收益最高，但缺钾区相对产量已达 94.9%、钾肥贡献率仅 5.1%，其增产幅度未超出单小区试验误差的判别能力，故不作为推荐用量；考虑到磷素在土壤中易累积，土壤有效磷含量较高的田块 P₂O₅ 用量不宜超过 90 kg/hm²。

表6 相邻施肥水平间的边际效益

因素	施肥水平变化	边际产量/(kg/hm ²)	边际产值/(元/hm ²)	边际肥料成本/(元/hm ²)	边际产投比
N	N0→N1	766.7	1978.0	612.3	3.23
N	N1→N2	1600.0	4128.0	612.3	6.74
N	N2→N3	-33.3	-86.0	612.3	-0.14
P ₂ O ₅	P0→P1	500.0	1290.0	600.0	2.15
P ₂ O ₅	P1→P2	833.3	2150.0	600.0	3.58
P ₂ O ₅	P2→P3	433.3	1118.0	600.0	1.86
K ₂ O	K0→K1	533.3	1376.0	600.0	2.29
K ₂ O	K1→K2	-66.7	-172.0	600.0	-0.29
K ₂ O	K2→K3	1000.0	2580.0	600.0	4.30

注：边际产投比=边际产值/边际肥料成本；稻谷价格 2.58 元/kg，纯 N、P₂O₅、K₂O 价格分别为 4.54、6.67、5.33 元/kg。

2.5 不同施肥处理的经济效益

由表 3 可知，各处理扣除肥料成本后收益为 15230.0~22091.4 元/hm²，以处理 10 最高，较无肥区增收 5063.4 元/hm²，处理 9、7 次之。缺氮区（处理 2）和低氮的处理 3 增产值不足以抵消肥料成本，增收为负，说明氮肥不足时磷钾投入难以发挥效益。产投比以处理 8、9 最高（均 2.27），处理 11 因施氮过大而肥料成本最高、产投比仅 1.56。综合产量、收益与产投比，处理 9 (N 270、P₂O₅ 180、K₂O 112.5 kg/hm²) 是投入较低、效益较好的方案。

3 讨论

本试验缺氮区相对产量 74.3%、氮肥贡献率 25.7%，氮的增产作用远大于磷钾，与安徽潜山（缺氮区 75.6%）^[7]及省内外其他稻区^[5-6,9]的结果一致，表明氮素是该区域砂壤质稻田单季稻产量形成的首要限制因子。施氮超过 270 kg/hm² 后结实率和千粒重下降、产量不再增加，与长江流域中稻氮肥增产效应随用量递减的特征一致^[14]。生产上宜将氮肥总量控制在 270 kg/hm² 左右，并通过氮肥后移提高利用率^[2,14]。

三元二次方程拟合失败或呈非典型在生产性试验中较为常见^[4,10]。本试验该方程校正 R^2 仅 0.7939，驻点落在试验范围外且无农艺学意义，不能用于推荐施肥；此时将一元二次方程、线性加平台模型与边际分析相结合更稳妥^[4,11]。氮肥的线性加平台模型拟合优于一元二次方程，说明对已出现平台的养分该模型更适用，但受水平数与重复数限制，拐点仅为粗略估计。

磷、钾肥在设计范围内持续增产，很大程度上是设计所致：2 水平高于安徽省常规推荐量，故未出现拐点，不应据此认为已达土壤磷钾响应的真实上限。缺磷区相对产量 85.5%，供磷能力属“中”，与质地砂壤、保肥能力弱有关；缺钾区相对产量虽达 94.9%，但高产条件下增施钾肥仍表现出一定效应；南方双季稻区多点试验也表明钾肥主要作用于千粒重^[15]，与本试验千粒重随施钾量上升的表现一致。邻近的潜山市同为砂壤质水稻土，其耕层有效磷 13.0 mg/kg、速效钾 54 mg/kg，均属中等偏下，且推荐磷钾用量低于本试验^[7]，说明本区域砂壤质稻田磷钾保蓄能力较弱，而本试验的绝对水平不宜外推。磷素易累积、长期大量施用存在环境风险^[2,12]，生产上宜以处理 6、7、9 的用量为基础按土壤测定值调整。本试验单年单点且未设重复，部分处理（如 K1 与 K2）的产量波动可能含田间误差，推荐量尚需多点多年验证^[2]。

4 结论

（1）施肥明显改善水稻经济性状并大幅提高产量（未设重复，未作差异显著性检验）。处理 10（N 270、P₂O₅ 180、K₂O 337.5 kg/hm²）产量最高，为 10200.0 kg/hm²，较无肥区增产 54.5%，扣除肥料成本后收益 22091.4 元/hm²。

（2）试验田土壤供氮能力属“低”水平，供磷、供钾能力属“中”水平；氮、磷、钾肥贡献率分别为 25.7%、14.5%和 5.1%，肥料效应表现为 N>P>K；产量与每穗总粒数、有效穗数呈极显著正相关。

（3）三元二次方程未通过典型性检验，各单因素方程回归均未达显著水平，仅作趋势描述。氮肥响应在施 N 270 kg/hm² 左右趋于平台（拐点约 280 kg/hm²），超过该用量后结实率和千粒重下降；磷、钾效应在试验范围内未出现拐点。

（4）在单年单点、不设重复的条件下，初步提出该区域单季稻施 N 270 kg/hm²、P₂O₅ 90~180 kg/hm²、K₂O 112.5~225 kg/hm²，氮肥按基肥:分蘖肥:穗肥=50%:25%:25%、钾肥按基肥:穗肥=60%:40%分施，磷肥全部基施。磷、钾用量因 2 水平偏高、未出现拐点而可靠性较低，尚需多点多年验证，生产上应结合土壤测试值下调。

参考文献

- [1] 耿维, 袁嫚嫚, 邬刚, 等. 安徽省作物养分供需分析及化肥减施潜力研究[J]. 中国生态农业学报, 2020, 28(2): 221-235.
- [2] 周卫, 丁文成. 新阶段化肥减量增效战略研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2023, 29(1): 1-7.
- [3] 中华人民共和国农业部. 测土配方施肥技术规程: NY/T 2911—2016[S]. 北京: 中国农业出版社, 2016.
- [4] 章明清, 李娟, 张立成, 等. 三元肥料效应模型的整合与优化建模策略[J]. 土壤学报, 2021, 58(3): 755-766.
- [5] 冯静, 李京蓉, 关绍华, 等. 钟祥市潯育型土壤水稻“3414”肥料效应完全试验分析[J]. 湖北农业科学, 2020, 59(24): 48-50.
- [6] 依德萍, 桑红翠, 魏静涛, 等. 水稻“3414”试验肥料效应分析[J]. 河北农机, 2023(16): 114-116.
- [7] 顾五毛. 潜山市单季稻“3414”肥料效应田间试验[J]. 安徽农学通报, 2019, 25(17): 82-84, 158.

- [8] 苏文兵, 潘锦勇. 霍邱县水稻测土配方施肥效应分析[J]. 现代农业科技, 2022(17).
- [9] 程扶旗. 绩溪县水稻氮磷钾肥料效应研究[J]. 安徽农学通报, 2026, 32(4): 13-16.
- [10] 范晓晖, 刘文婷, 陈慕松, 等. 基于 R 语言的水稻“3414”肥效试验统计分析[J]. 湖北农业科学, 2020, 59(13): 67-71.
- [11] 彭显龙, 车俊杰, 宋聪, 等. 确定经济合理施氮量的新方法: 基于施氮量与稻米产量效应函数[J]. 植物营养与肥料学报, 2022, 28(7): 1182-1193.
- [12] 孙洪仁, 张吉萍, 江丽华, 等. 我国水稻土壤有效磷和速效钾丰缺指标与适宜磷钾施用量研究[J]. 中国稻米, 2018, 24(5).
- [13] 姚莉, 蔡红梅, 王宏, 等. 基于“3414”试验模型的四川盆地中部水稻氮磷钾肥效应研究[J]. 中国农学通报, 2024, 40(29): 75-79.
- [14] 王姣琳, 徐新朋, 杨兰芳, 等. 长江流域中稻产量、肥料增产效应及利用率特征[J]. 植物营养与肥料学报, 2021, 27(6): 919-928.
- [15] 吴可, 谢慧敏, 刘文奇, 等. 氮、磷、钾肥对南方双季稻区水稻产量及产量构成因子的影响[J]. 作物杂志, 2021(4): 178-183.