


Face plantaire des orteils


frontal : —
 sphénoïde : —
 temporal : —
 occiput : —
 Ganglions
 submaxillaire et
 sublingual (plancher
 buccal) : ○



Tronc cérébral (entre les deux pouces)



Face plantaire des orteils






Nerf vague X dans la moelle allongée
(pouce droit sur l'interphalangienne du gros orteil)

face plantaire des orteils

Foramen jugulaire
(nerf vague X)


Nerf vague X dans le foramen jugulaire





Nerf vague X dans le foramen jugulaire
(pouce gauche sur l'interphalangienne proximale
des 4ème et 5ème orteils)


Face plantaire des orteils





Sinus carotidien (index gauche)


Vue frontale ventrale



Territoires cervical, thoracique et diaphragmatique gauches du nerf Vague X (jaune)

**Territoires cervical, thoracique et diaphragmatique gauches du nerf
Vague X (jaune)**


Vue frontale ventrale



**Territoires cervical et thoracique droits
du nerf Vague X (jaune)**

**Territoires cervical et thoracique droits
du nerf Vague X (jaune)**

Vue frontale ventrale



**Hiatus œsophagien et nerfs vagues droit
(postérieur) et gauche(antérieur)**



Vue frontale ventrale

Nerfs vagues X (hiatus œsophagien) et SIO

Petite courbure de l'estomac

Pylore (à hauteur de L1)

Plexus prévertébral

Ombilic à hauteur de L3-L4)


Branche ilio-pubienne


Diaphragme

Estomac

Grande courbure de l'estomac

Estomac






Petite courbure de l'estomac

(cardia : pouce droit, pylore : pouce gauche)

Vue frontale ventrale



Territoire abdominal droit du nerf Vague X (jaune)

Vue sagittale médiale de la colonne vertébrale

Origine médullaire du Parasympathique pelvien ou sacré (jaune)

masse commune
(tendon d'Achille)

Articulaire postérieure de L5

Origine médullaire parasympathique sacrée

L1

L3

L4

L5

Sacro-
iliaque

S1

S2


S3
Rectum

Coccyx

Queue de cheval

Anus

Ganglion impair



Origine médullaire du Parasympathique pelvien ou sacré (jaune)


Vue sagittale médiale de la colonne vertébrale

Origine médullaire du Sympathique (rouge)

Origine médullaire sympathique


masse commune
(tendon d'Achille)

Queue de cheval



Origine médullaire du Sympathique

Vue frontale postérieure de la colonne vertébrale





**Chaine ganglionnaire latéro-vertébrale thoracique
(articulations costo-transversaires, entre les 2 pouces)**

Vue sagittale médiale de la colonne vertébrale

Chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale (CGLV) cervicale (vert)



Ganglion cervical inférieur (pouce droit)




Vue sagittale médiale de la colonne vertébrale

Chaine ganglionnaire latéro-vertébrale lombale (jaune)

Articulaire postérieure de L5

CGLV lombaire et piliers du diaphragme

masse commune
(tendon d'Achille)






Chaîne ganglionnaire lombaire et piliers du diaphragme (entre les deux pouces)

Vue sagittale médiale de la colonne vertébrale

Chaine ganglionnaire latéro-vertébrale sacro-coccygienne (en bleu)



Chaine ganglionnaire latéro-vertébrale sacro-coccygienne (en bleu)





Plexus hypogastrique inférieur (fibres antérieures)

Vue sagittale médiale de la colonne vertébrale

Plexus hypogastrique inférieur (fibres moyennes et postérieures)

Plexus hypogastrique inférieur


masse commune
(tendon d'Achille)

S1
S2
S3

Ganglion impair

Coccyx

CGLV sacrée





Plexus hypogastrique inférieur (fibres moyennes et postérieures)