




Systeme Érectile Masculin et Féminin

Anatomie, physiologie et approche ROP


Finalité et situation anatomique

L'excitation sexuelle provoque l'érection des organes (clitoris et pénis) et la lubrification vaginale pour permettre la copulation.

Les organes génitaux externes s'attachent à la face inférieure du triangle uro-génital du périnée, dont ils sont intimement solidaires.




La Dynamique Musculaire



Muscles Ischiocaverneux (Pairs) :

S'attachent aux branches ischio-pubiennes et aux piliers.

Action : Propulsent le sang des piliers vers le corps du pénis/clitoris.



Muscles Bulbospongieux (Pairs) :

S'insèrent sur le périnée, le bulbe du vestibule (Femme) ou le corps spongieux (Homme).

Action : Chassent le sang vers l'avant. Chez l'homme, facilitent la vidange de l'urètre (miction/éjaculation).

Ligaments d'ancrage (Homme) :

Ligament suspenseur (symphyse pubienne/ligne blanche) et Ligament fundiforme (ligne blanche).

Glandes Annexes & Vascularisation




Vascularisation : Artérielle via les branches terminales des artères pudendales internes (issues des iliaques internes).

Glandes chez la Femme	Glandes chez l’Homme
Glandes vestibulaires de Bartholin (lubrification de l’entrée du vagin) + Transsudation vasculaire de la paroi vaginale	Glandes bulbo-urétrales de Cowper (sécrétion d’un liquide alcalin protecteur pour les spermatozoïdes)

Lecture Clinique ROP : Attention aux congestions veineuses pelviennes. Ne pas assimiler directement le drainage veineux des organes érectiles au système porte hépatique ; le retour s’effectue principalement vers le système iliaque interne.



Réseau vasculaire et drainage



Lecture Clinique ROP : Les congestions veineuses pelviennes doivent être prises en compte. Ne pas assimiler directement le drainage veineux des organes érectiles au système porte hépatique.

Le Câblage Somatique : Le Nerf Pudendal


Le nerf pudendal est le principal nerf du périnée, agissant comme le câble maître somatique.



- 1. **Sensibilité** : Assure l'innervation sensitive des organes génitaux externes.
- 2. **Commande Motrice** : Contrôle somatique des muscles périnéaux striés (ischio-caverneux et bulbo-spongieux).

Contrôle Autonome : Dualité Sympathique et Parasympathique

Parasympathique Sacré



Origine : Racines S2 à S4.


Mécanisme : Vasodilatation des artères pudendales internes.

Effet Clinique : Augmentation de l'afflux sanguin, remplissage des corps érectiles (Érection). Congestion vulvo-vaginale et lubrification chez la femme.

Sympathique Thoraco-lombaire


- **Origine** : Segments L1 à L3.
- **Mécanisme** : Contractions des voies génitales lisses.
- **Effet Clinique** : Phase d'émission de l'éjaculation (progression des sécrétions vers l'urètre prostatique) et prostatique) et participation à l'Orgasme dans les deux sexes.

La Séquence Physiologique



La fonction sexuelle exige une transition fluide de la dominance parasympathique vers l'activation sympathique et somatique.

Perspective Clinique : Dysfonctions Sexuelles



La Dimension Psycho-Émotionnelle

"La sexualité se passe autant dans la tête et dans le cœur que dans le corps."



Obstacles Majeurs : Stress psycho-émotionnels, perte d'estime de soi, anxiété de performance, dépression.




Facteurs Historiques : Traumatismes sexuels passés, tabous éducatifs ou religieux.



Implication Clinique : L'évaluation ROP doit systématiquement intégrer les relations viscéro-émotionnelles (axe cerveau-bassin).

Cartographie ROP : Le Nerf Pudendal (S2-S4)



Le traitement de ces zones cibles vise à restaurer la commande somatique et à libérer les tensions myofasciales du triangle uro-génital.

Cartographie ROP : Structures Érectiles et Ligaments

Corps caverneux & Muscles ischiocaverneux : Bord médial des branches ischiopubiennes.

La résolution des dysfonctions érectiles exige une double approche : la libération mécanique du bassin et l'apaisement de l'axe viscéro-émotionnel.



Synthèse Limbique : Points du Nerf olfactif (I) et Cerveau limbique (pour traiter la composante psycho-émotionnelle).

Ensemble des organes érectiles : Extrémité médiale de la branche iliopubienne.

Ligaments sacrotubéral et sacroépineux : Bord postérieur des talons.

La fonction érectile est l'expression d'une synergie parfaite.

Son bon fonctionnement, comme sa prise en charge clinique en ROP, requiert l'équilibre constant entre la biomécanique pelvienne, la réponse hémodynamique et la sécurité neuro-émotionnelle du patient.

