

Comprendre le Système Nerveux Autonome par ses grands repères podaux



L'Exigence du Geste Thérapeutique

Inter-phalangienne
proximale de l'index


Pulpe du pouce




Une approche exclusivement manuelle, sans adjonction d'huile ou de crème, reposant sur la précision de la pression épicrotique.

La force et la trituration sont proscrites. Plus la pression est forte, moins la lecture des repères osseux et des zones réflexes est aisée.

Correspondance ROP : Diencéphale & Dure-mère



Focus Clinique : L'Étage Supérieur



Structures Cibles :

- Charnière crânio-cervicale (Occiput-C1-C2) et Foramen magnum.
- Foramen jugulaire (passage des nerfs IX, X, XI).
- Nerf Trijumeau (V) et Hypoglosse (XII).


Techniques Clés :

- Rééquilibration Symphyse Sphéno-Basilaire (SSB) - S2.
- Compression du 4^{ème} ventricule.

Objectif Thérapeutique : Stimuler le nerf vague nouveau pour instaurer la « neuroception de sécurité » et réguler l'ensemble de la cascade autonome.

Cible II : Syndrome Locorégional


Traitement des boucles liées à la région symptomatique.



L'objectif est de relâcher les fixations locales de la cavité concernée pour restaurer la mobilité tissulaire et briser la boucle neuro-végétative entretenue par la dysfonction.

Vascularisation et la Petite Courbure


Tronc Cœliaque (Th12) → Artère splénique,
Artère gastrique gauche,
Artère gastrique droite.



Intérêt Pratique en ROP

La petite courbure exige une attention prioritaire. Profondément située et accolée à la colonne (Th10-L1), elle concentre une riche vascularisation et innervation parasympathique. C'est le lieu privilégié des fixations mécaniques et des ulcérations gastriques.

Innervation et « Zone d'Écoute » ROP



La Zone d'Écoute (ROP)


En clinique, la rate ne s'isole pas.
Le praticien écoute une zone globale intégrant :

1. Dernières vertèbres thoraciques,
2. Articulations costo-transversaires,
3. Plexus coeliaque,
4. Diaphragme gauche,
5. Pédicule splénique

L'Approche Thérapeutique ROP : Cartographie d'Intervention

Axe Crânio-Sacré (Régulation Limbique) :

- Symphyse sphéno-basilaire.
- Tronc cérébral et Hypothalamus.
- **Indication** : Énurésie, dominance émotionnelle, peurs.



Axe Neuro-Végétatif (Innervation) :

- Sympathique : Vertèbres Th11 à L2.
- Parasympathique : Sacrum S2-S4 et Coccyx.
- **Indication** : Restauration du balancier neurologique de remplissage/miction.

Axe Biomécanique (Structure Pelvienne) :

- Symphyse pubienne et fosses obturatrices.
- Noyau fibreux central du périnée et plexus pudendal.
- **Indication** : Rééquilibrer la tension des fascias urétraux (IUE) et relâcher les ligaments pubo-vésicaux.

L'Approche ROP : Cartographie des Zones Podales

Syndrome Général d'Adaptation


- **Parasympathique pelvien :** Moelle sacrée S2-S4 (Étage vertébral L1-L2).
- **Sympathique :** Articulations costo-transversaires Th10-L2, chaîne ganglionnaire lombo-sacrée.
- **Organes cibles :** Foie, intestins, reins (pour cystites chroniques).

Syndrome Loco-Régional

- **Ligaments pubo-vésicaux :** Bord postérieur de la malléole tibiale.
- **Trigone / Prostate :** Fossette à la face postéro-médiale du calcaneum (via le sillon du noyau fibreux central).
- **Sphincter externe / Urètre :** Bord inférieur du calcaneum, en avant du coccyx.

Système Limbique

- **Balance Émotionnelle :** Écoute et induction simultanée — un pouce sur la zone réflexe de la vessie, l'autre sur le cerveau limbique.



Cartographie Podale : Zones Réflexes

Syndrome Général d'Adaptation

- Colonne et articulations costo-transversaires (chaîne ganglionnaire Th6-Th9).
- Plexus coélique.

Syndrome Loco-Régional

- Organes liés : Estomac, pancréas, rein gauche, racine du méso-côlon.
- Zone Rate : Localisée sur l'angle splénique du côlon (médial et supérieur à la styloïde du 5e métatarse gauche), sous l'hémi-coupole diaphragmatique.
- Foie : Travailler le lobe gauche et l'ensemble du foie pour améliorer la circulation de la veine splénique.

Complément ROP

- Balance Cerveau Limbique-Rate : Technique d'écoute-induction (un pouce sur la rate, l'autre sur le cerveau limbique).

