



Comprender el Sistema Nervioso Autónomo a través de sus grandes referencias podales



La precisión del gesto terapéutico

Interfalángica
proximal del índice


Pulpejo del pulgar




Un enfoque exclusivamente manual, sin adición de aceite ni crema, basado en la precisión de la presión epicrítica.

La fuerza y la trituración están contraindicadas. Cuanto mayor es la presión, más difícil resulta la identificación de los reparos óseos y de las zonas reflejas.

Correspondencia ROP : Diencéfalo & Duramadre



Foco clínico: El nivel superior



Estructuras diana:

- Unión craneocervical (Occipucio-C1-C2) y foramen magno.
- Foramen yugular (paso de los nervios craneales IX, X, XI).
- Nervio trigémino (V) y nervio hipogloso (XII).


Técnicas clave:

- Reequilibración de la sincondrosis esfenobasilar (SSB) - S2.
- Compresión del 4.º ventrículo.

Objetivo terapéutico: Estimular de nuevo el nervio vago para instaurar la « neurocepción de seguridad » y regular toda la cascada autonómica.

Objetivo II: Síndrome locorregional

Tratamiento de los bucles vinculados a la región sintomática.



El objetivo es liberar las fijaciones locales de la cavidad afectada para restaurar la movilidad tisular y romper el bucle neurovegetativo mantenido por la disfunción.

Vascularización y la Pequeña Curvatura

Tronco Celíaco
(Th12)




Arteria esplénica,
Arteria gástrica izquierda,
Arteria gástrica derecha.

Arteria gástrica izquierda

Arteria gástrica derecha


Arteria gastro-omental



Interés Práctico en ROP

La pequeña curvatura requiere una atención prioritaria. Profundamente situada y adosada a la columna (Th10-L1), concentra una rica vascularización e inervación parasimpática. Es el lugar privilegiado de las fijaciones mecánicas y de las ulceraciones gástricas.

Inervación y « Zona de Escucha » ROP



La Zona de Escucha (ROP)


En clínica, la rata no se aísla.
El practicante escucha una zona global integradora :

1. Últimas vértebras torácicas,
2. Articulaciones costo-transversas,
3. Plexo celíaco,
4. Diafragma izquierdo,
5. Pedículo esplénico

Enfoque terapéutico ROP: Cartografía de intervención

Eje craneosacro (regulación límbica):

- Sincondrosis esfenobasilar.
- Tronco encefálico e hipotálamo.
- **Indicación:** Enuresis, predominio emocional, miedos.



Eje neurovegetativo (inervación):

- Simpático: vértebras T11 a L2.
- Parasimpático: sacro S2-S4 y cóccix.
- **Indicación:** Restablecimiento del equilibrio neurológico del llenado vesical y la micción.

Eje biomecánico (estructura pélvica):

- Sínfisis púbica y fosas obturadoras.
- Núcleo fibroso central del periné y plexo pudendo.
- **Indicación:** Reequilibrar la tensión de las fascias uretrales (IUE) y relajar los ligamentos pubovesicales.

La Aproximación ROP: Cartografía de las Zonas Podales

Síndrome General de Adaptación


- **Parasimpático pélvico:** Médula sacra S2-S4 (Niveles vertebrales L1-L2).
- **Simpático:** Articulaciones costo-transversas Th10-L2, cadena ganglionar lumbosacra.
- **Órganos diana:** Hígado, intestinos, riñones (en cistitis crónicas).

Síndrome Locorregional

- **Ligamentos pubovesicales:** Borde posterior del maléolo tibial.
- **Trígono / Próstata:** Fosita en la cara posteromedial del calcáneo (vía el surco del núcleo fibroso central).
- **Esfínter externo / Uretra:** Borde inferior del calcáneo, por delante del cóccix.

Sistema Límbico

- **Equilibrio Emocional:** Escucha e inducción simultánea – un pulgar en la zona refleja de la vejiga, el otro en el cerebro límbico.



Cartografía Podal: Zonas Reflejas

Síndrome General de Adaptación

- Columna y articulaciones costo-transversas (cadena ganglionar Th6-Th9).
- Plexo celíaco.

Síndrome Loco-Regional

- Órganos relacionados: Estómago, páncreas, riñón izquierdo, raíz del mesocolon.
- Zona Rate: Localizada en el ángulo esplénico del colon (medial y superior a la apófisis estiloides del 5.º metatarso izquierdo), bajo la cúpula diafragmática.
- Hígado: Trabajar el lóbulo izquierdo y el conjunto del hígado para mejorar la circulación de la vena esplénica.

Complemento ROP

- Balance Cerebro Límbico-Rate: Técnica de escucha-inducción (un pulgar en la rate, el otro en el cerebro límbico).

