

Comprendere il Sistema Nervoso Autonomo attraverso i suoi grandi riferimenti podali



L'Esigenza del Gesto Terapeutico


Inter-falangea
prossimale dell'indice

Polpa del pollice


Un approccio esclusivamente manuale, senza l'uso di olio o crema, basato sulla precisione della pressione epicritica.

La forza e la triturazione sono prescritte. Più la pressione è forte, meno si leggono i reperi ossei e le zone riflesse è mirata.

Corrispondenza ROP : Diencéfalo & Dura-madre



Focus Clinico : Il Piano Superiore



Strutture Bersaglio :

- Cerniera cranio-cervicale (Occipite-C1-C2) e Foro Magno.
- Foro giugulare (passaggio dei nervi IX, X, XI).
- Nervo Trigemino (V) e Ipoglosso (XII).


Tecniche Chiave :

- Riequilibrio del Sistema Simpatico Sfeno-Basilare (SSB) - S2.
- Compressione del 4° ventricolo.

Obiettivo Terapeutico : Stimolare il nuovo nervo vago per instaurare la “neurocezione di sicurezza” e regolare l’intera cascata autonoma.

Obiettivo II: Sindrome Locorégionale


Trattamento dei loop legati alla regione sintomatica.



L'obiettivo è rilasciare le fissazioni locali della cavità interessata per ripristinare la mobilità tissutale e interrompere il loop neurovegetativo mantenuto dalla disfunzione.

Vascolarizzazione della piccola curvatura

Tronco celiaco (Th12) —→ Arteria splenica,
Arteria gastrica sinistra,
Arteria gastrica destra.




Rilevanza pratica in ROP

La piccola curvatura richiede un'attenzione prioritaria. Profondamente situata e addossata alla colonna vertebrale (Th10-L1), concentra una ricca vascolarizzazione e un'innervazione parasimpatica. È il sito privilegiato delle fissazioni meccaniche e delle ulcerazioni gastriche.

Innervazione e « Zona d'Ascolto » ROP

Simpatico autonomo: segmento midollare Th6-Th9
→ Plesso celiaco → Peduncolo splenico.



La Zona d'Ascolto (ROP)


In clinica, la milza non viene valutata isolatamente. Il terapeuta valuta una zona globale che comprende:

1. Ultime vertebre toraciche,
2. Articolazioni costo-trasversarie,
3. Plesso celiaco,
4. Emidiaframma sinistro,
5. Peduncolo splenico

L'Approccio Terapeutico ROP: Cartografia di Intervento

Asse cranio-sacrale (regolazione limbica):

- Sincondrosi sfeno-basilare.
- Tronco encefalico e ipotalamo.
- **Indicazione:** Enuresi, predominanza emotiva, paure.



Asse neurovegetativo (innervazione):

- Simpatico: vertebre da T11 a L2.
- Parasimpatico: sacro S2-S4 e coccige.
- **Indicazione:** Ripristino dell'equilibrio neurologico tra riempimento vescicale e minzione.

Asse biomeccanico (struttura pelvica):

- Sinfisi pubica e fosse otturatorie.
- Nucleo fibroso centrale del perineo e plesso pudendo.
- **Indicazione:** Riequilibrare la tensione delle fasce uretrali (IUE) e rilasciare i legamenti pubo-vescicali.

L'Approccio ROP: Cartografia delle Zone Podali

Sindrome Generale di Adattamento


- **Parasimpatico pelvico:** Midollo sacrale S2-S4 (Livello vertebrale L1-L2).
- **Simpatico:** Articolazioni costo-trasversarie T10-L2, catena ganglionare lombo-sacrale.
- **Organi bersaglio:** Fegato, intestini, reni (nelle cistiti croniche).

Sindrome Locorégionale

- **Legamenti pubovesicali:** Bordo posteriore del malleolo tibiale.
- **Trigono / Prostata:** Fossetta sulla faccia posteromediale del calcagno (attraverso il solco del nucleo fibroso centrale).
- **Sfintere esterno / Uretra:** Bordo inferiore del calcagno, davanti al coccige.

Sistema Limbico

- **Equilibrio Emotivo:** Ascolto e induzione simultanei — un pollice sulla zona riflessa della vescica, l'altro sul cervello limbico.



Cartografia Podale: Zone Riflesse

Sindrome Generale di Adattamento

- Colonna vertebrale e articolazioni costo-trasversarie (catena gangliare simpatica Th6-Th9).
- Plesso celiaco.

Sindrome Loco-Regionale

- Organi correlati: stomaco, pancreas, rene sinistro, radice del mesocolon.
- Zona della milza: localizzata a livello della flessura splenica del colon (mediale e superiore rispetto al processo stiloideo del 5° metatarso sinistro), sotto la cupola diaframmatica.
- Fegato: trattare il lobo sinistro e l'intero fegato per migliorare la circolazione della vena splenica.

Complemento ROP

- Bilanciamento Cervello Limbico-Milza: tecnica di ascolto-induzione (un pollice sulla milza, l'altro sul cervello limbico).

