

СЕМИНАР №1 ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ

ЗАВЬЯЛОВА Н.А.

6-Й СЕМЕСТР

Рассмотрим несколько уравнений - это уравнение переноса(1) и волновое уравнение(2), которые относятся к уравнениям гиперболического типа:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = f, \quad (1)$$

где $c > 0$ - скорость распространения возмущений.

$$u(0, x) = \mu(x)$$

$$u(t, 0) = \psi(t)$$


$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f \quad (2)$$

Далее - уравнение теплопроводности(3), которое является уравнением параболического типа, а также уравнение Гельмгольца(4) - уравнение эллиптического типа:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f, \quad (3)$$

где $D > 0$ - корректная постановка.

$$\Delta u + k^2 u = f \quad (4)$$



$$x_{m+1} - x_m = h$$

$$t^{n+1} - t^n = \tau$$

$$u(t^n, x_m) = u_m^n$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h}$$

Получаем разностное уравнение:

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + c \frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h} = f_m^n$$

Определение 1. Решение разностной задачи сходится к решению дифференциального, если:

$$\|[u]_h - u_m^h\| \rightarrow 0 \text{ при } \tau, h \rightarrow 0,$$

$$\|[u]_h - u_m^h\| \leq A\tau^p, \quad A = \text{const},$$

то сходимость порядка p по τ ($[u]_h$ - проекция точного решения на сетку).

Определение 2. Решение разностной задачи аппроксимирует дифференциальную задачу, если невязка $|r| = \|L_h[u]_h - f_h\| \rightarrow 0$, при $t, h \rightarrow 0$, причем L_h - разностный оператор, а f_h - проекция правой части.

Стоит также упомянуть спектральный признак устойчивости:

$$\Delta^n = u^n - u^{*n}, \text{ где } u^{*n} - \text{возмущённое решение}$$

$$\Delta_m^n = \sum_k \lambda_k^m e^{ikmh}, \quad |\lambda_k| \leq 1 \rightarrow \text{устойчиво}$$

Теорема 1. *Сходимость = аппроксимация + устойчивость*

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + c \frac{u_m^n - u_{m-1}^n}{h} = f_m^n$$

Аппроксимация разложения в ряд Тейлора в окрестности точки u_m^n

$$u_m^{n+1} = u(t^n + \tau, x_m) = u_m^n + \tau u_t' + \frac{\tau^2}{2} u_t'' + \frac{\tau^3}{6} u_t''' + o(\tau^4)$$

$$u_{m-1}^n = u(t^n, x_m - h) = u_m^n - h u_x' + \frac{h^2}{2} u_x'' - \frac{h^3}{6} u_x''' + o(h^4)$$

Тогда:

$$r = u_t' + \frac{\tau}{2} u_t'' + \frac{\tau^2}{6} u_t''' + o(\tau^3) + c(u_x' - \frac{h}{2} u_x'' + \frac{h^2}{6} u_x''' + o(h^4)) - f$$

$$u_t' + c u_x' = f$$

$$r = \frac{\tau}{2} u_t'' + o(\tau^2) - c \frac{h}{2} u_x'' + o(h^2)$$

$$||r|| \leq o(\tau) + o(h) - \text{аппроксимация 1-го порядка по } \tau \text{ и по } h$$

Устойчивость

Для линейной задачи:

$$\frac{\Delta_m^{n+1} - \Delta_m^n}{\tau} + c \frac{\Delta_m^n - \Delta_{m-1}^n}{h} = 0$$

$$\Delta_m^n = \sum_k \lambda_k^n e^{ikmh}$$

Исследование для одной гармоники:

$$\Delta_m^n \rightarrow \lambda_k^n e^{ikmh}$$

$$\lambda^n e^{ikmh} \frac{\lambda^{n+1} e^{ikmh} - \lambda^n e^{ikmh}}{\tau} + c \frac{\lambda^n e^{ikmh} - \lambda^n e^{ik(m-1)h}}{h} = 0$$

Вводим число Куранта:

$$\sigma = \frac{c\tau}{h} > 0$$

Рассмотрим пример:

$$\lambda - 1 + \sigma(1 - e^{-ikh}) = 0$$

$$\lambda = (1 - \sigma) - \sigma e^{-ikh}$$

$$|\lambda| \leq 1 \text{ при } \sigma \in [0; 1] \rightarrow \sigma = \frac{c\tau}{h} \leq 1 - \text{условие устойчивости}$$

$$C < 0 \rightarrow \sigma < 0 \rightarrow \lambda = (1 + |\sigma|) + |\sigma| e^{-ikh}$$

Определение 3. *Условие Куранта-Фридрихса-Леви:*

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \quad (c = \frac{\partial x}{\partial t})$$

$$x = ct + Const - \text{характеристика}$$

Характеристика, выпущенная из верхней точки шаблона, должна проходить через шаблон:

$$c > 0 \rightarrow \frac{c\tau}{h} \leq 1, \text{ т.е. при } c < 0 - \text{ не устойчиво}$$

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + c \frac{u_{m+1}^n - u_m^n}{h} = f_m^n$$

$$\text{КФЛ: } \frac{|c|\tau}{h} \leq 1$$

Необходимо, но не достаточно \uparrow

Спектральный признак:

1. $u_m^n \rightarrow \Delta_m^n$
2. $f_m^n \rightarrow$
3. $\Delta_m^n \rightarrow \lambda^n e^{ikmh}$
4. $:\lambda^n e^{ikmh}$



$$\frac{\lambda - 1}{\tau} + c \frac{e^{ikh} - 1}{h} = 0$$

$$\lambda = 1 + \sigma - \sigma e^{ikh}$$


$$\sigma < 0: \lambda = 1 - |\sigma| + |\sigma|e^{ikh}$$

$$|\sigma| \leq 1 - \text{устойчиво}$$

$$\frac{|c|\tau}{h} \leq 1$$



Метод неопределённых коэффициентов



$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = f$$

$$Au_{m-1}^n + Bu_m^n + Cu_{m+1}^n + Du_m^{n+1} \approx \frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$u_{m\pm 1}^n = u_m^n \pm hu'_x + \frac{h^2}{2}u''_x \pm \frac{h^3}{6}u'''_x + o(h^4)$$

$$u_m^{n+1} = u_m^n + \tau u'_t + \frac{\tau^2}{2}u''_t + o(\tau^3)$$

$$u_m^n: A + B + C + D = 0$$

$$u'_t: D \cdot \tau = 1$$

$$u'_x: -hA + hC = c$$

$$u''_t: \frac{\tau^2}{2}D = 0 - \text{не подходит (противоречие со 2-м)}$$

$$u''_x: \frac{h^2}{2}A + \frac{h^2}{2}C = 0$$

Отсюда получаем:

$$\begin{aligned} -A + C &= \frac{c}{h} \text{ и } A + C = 0 \\ \Rightarrow C &= \frac{c}{2h}; \quad A = -\frac{c}{h} \end{aligned}$$

Также:

$$B = -D = -\frac{1}{\tau}$$

$$r \sim o(\tau) + o(h^2)$$

$$u_x''': A + C = 0$$

$$-c \frac{u_m^{n+1}}{2h} - \frac{u_m^n}{\tau} + c \frac{u_{m+1}^n}{2h} + \frac{u_m^{n+1}}{\tau} = f_m^n$$

$$\frac{u_m^{n+1} - u_m^n}{\tau} + c \frac{u_{m+1}^n - u_m^n}{2h} = f_m^n$$

$$\text{КФЛ: } \frac{|c|\tau}{h} \leq 1$$

Спектральный признак:

$$u_m^n \rightarrow \Delta_m^n$$

$$f_m^n \rightarrow$$

$$\Delta_m^n \rightarrow \lambda^n e^{ikmh}$$

$$: \lambda^n e^{ikmh}$$

В итоге получаем:

$$\frac{\lambda - 1}{\tau} + c \frac{e^{ikh} - e^{-ikh}}{2hi} = 0$$

$$\lambda = 1 + \sigma i \sin(kh)$$

$$\lambda^2 = 1 + \sigma^2 \sin^2(kh) \leq 1 \Rightarrow \sigma = 0 - \text{ схема неустойчива}$$