

Гиперболические уравнения (системы уравнений, граничные условия уравнения газовой динамики, КФЛ)

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x} = \mathbf{f}$$

\mathbf{U} – вектор неизвестных $1 \times N$

\mathbf{A} – квадратная матрица $N \times N$

\mathbf{f} – вектор правой части $1 \times N$

Опр.: Система уравнений в частных производных является гиперболической, если все собственные значения матрицы \mathbf{A} являются вещественными

Собственные векторы-строки: $\boldsymbol{\omega}_i^T \mathbf{A} = \lambda_i \boldsymbol{\omega}_i^T$

$$\mathbf{A} = \boldsymbol{\Omega}_L^{-1} \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\Omega}_L$$

$$\boldsymbol{\Omega}_L = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_1 &= (x_{11} \quad x_{12} \quad \dots \quad x_{1n}) \\ \boldsymbol{\omega}_2 &= (x_{21} \quad x_{22} \quad \dots \quad x_{2n}) \\ &\vdots \\ \boldsymbol{\omega}_n &= (x_{n1} \quad x_{n2} \quad \dots \quad x_{nn}) \end{aligned}$$

квадратная матрица $N \times N$
с собственными **векторами-строками**

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{\Omega}_L^{-1} \Lambda \mathbf{\Omega}_L \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x} = \mathbf{f} \quad \cdot \mathbf{\Omega}_L$$

$$\mathbf{\Omega}_L \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \Lambda \mathbf{\Omega}_L \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x} = \mathbf{\Omega}_L \mathbf{f} \qquad \frac{\partial \mathbf{\Omega}_L \mathbf{U}}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial \mathbf{\Omega}_L \mathbf{U}}{\partial x} = \mathbf{\Omega}_L \mathbf{f}$$

$\mathbf{Z} = \mathbf{\Omega}_L \mathbf{U}$ - Инварианты Римана

$\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x} = \mathbf{G}$ - Независимые друг от друга уравнения, которые могут решаться автономно

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \mathbf{A} \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial x} = \mathbf{f}$$

\mathbf{U} – вектор неизвестных $1 \times N$
 \mathbf{A} – квадратная матрица $N \times N$
 \mathbf{f} – вектор правой части $1 \times N$

Спектральное разложение

$$\mathbf{A} = \mathbf{\Omega}_L^{-1} \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Omega}_L$$

$$\mathbf{\Omega}_L = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_1 &= (x_{11} \quad x_{12} \quad \dots \quad x_{1n}) \\ \boldsymbol{\omega}_2 &= (x_{21} \quad x_{22} \quad \dots \quad x_{2n}) \\ &\vdots \\ \boldsymbol{\omega}_n &= (x_{n1} \quad x_{n2} \quad \dots \quad x_{nn}) \end{aligned}$$

квадратная матрица $N \times N$
с собственными **векторами-строками**

Нахождение собственных векторов-строк

$$\omega_i \mathbf{A} = \omega_i \lambda$$

собственное значение

ЗАМЕТИМ (!): $(\omega_i \mathbf{A})^T = \mathbf{A}^T \omega_i^T = \omega_i^T \lambda$

$$\lambda_{A^T} = \lambda_A$$

собственные **векторы-столбцы**

$$\mathbf{A} = \mathbf{\Omega}_{\Pi}^{T^{-1}} \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Omega}_{\Pi}^T$$

$$\mathbf{\Omega}_{\Pi}^T = \mathbf{\Omega}_{\Pi} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

квадратная матрица $N \times N$
с собственными **векторами-столбцами**,
которая транспонируется

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 4 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9$$

ЛЕВЫЕ собственные векторы-строки

$$\lambda_1 = 3 \quad \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{1\text{л}} = (2 \quad 1)$$

$$\mathbf{\Omega}_{\text{л}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{\Omega}_{\text{л}}^T$$

$$\lambda_2 = -3 \quad \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{2\text{л}} = (1 \quad -1)$$

$$\mathbf{\Omega}_{\text{л}}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{\Omega}_{\text{л}}} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{\Omega}_{\text{л}}^{-1} \mathbf{\Omega}_{\text{л}} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{\Omega}_{\text{л}}^{-1} \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Omega}_{\text{л}} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ -12 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 2 \\ 4 & -1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 9$$

ПРАВЫЕ собственные векторы-СТОЛБЦЫ

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 3 \quad & \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} & \omega_{1\Pi} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} & \Omega_{\Pi} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} & \Omega_{\Pi}^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ \lambda_2 = -3 \quad & \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} & \omega_{2\Pi} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} & \Omega_{\Pi}^{-1} = \frac{1}{\det \Omega_{\Pi}} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\omega_{1Л} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{2Л} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Omega_{\Pi}^{T^{-1}} \Lambda \Omega_{\Pi}^T = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ -12 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial \mathbf{Z}}{\partial x} = \mathbf{0}$$



$$\frac{\partial z}{\partial t} + \lambda_i \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$



Вдоль характеристик $\lambda_i = \frac{dx}{dt}$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} = \frac{dz}{dt} = 0$$

Корректная постановка граничных условий: на каждой границе (левой или правой) задаваемые граничные условия в совокупности с теми граничными условиями, которые приносятся по характеристикам на эту границу должны давать невырожденную систему по определению тех инвариантов, которые с этой границы уходят.

Пример:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial x} = f(x, t) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial x} = g(x, t) \end{cases}$$

Начальные условия

$$u(0, x) = \varphi_0(x)$$

$$v(0, x) = \varphi_1(x)$$

Какие граничные условия поставлены корректно

$$1) u(t, 0) = \psi_0(t)$$

$$u(t, 1) = \psi_1(x)$$

$$2) u(t, 0) = \psi_0(t)$$

$$v(t, 1) = \psi_1(x)$$

$$3) u(t, 0) = \psi_0(t)$$

$$v(t, 0) = \psi_1(x)$$

$$4) u(t, 0) = \psi_0(t)$$

$$-2u(t, 0) + v(t, 0) = \psi_1(x)$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda = 1 \quad e_1 = (0, \quad 1)$$

$$\lambda = -1 \quad e_1 = (1, \quad 2)$$

$$z_1 = v$$

$$z_2 = -2u + v$$

$$G = \begin{cases} f \\ -2f + g \end{cases}$$

Уравнения для инвариантов Римана

$$\frac{\partial z_1}{\partial t} + \frac{\partial z_1}{\partial x} = G_1$$


$$\frac{\partial z_2}{\partial t} - \frac{\partial z_2}{\partial x} = G_2$$

$$\frac{\partial z_1}{\partial t} + \frac{\partial z_1}{\partial x} = G_1$$

$$z_1 = v$$

$$\frac{\partial z_2}{\partial t} - \frac{\partial z_2}{\partial x} = G_2$$

$$z_2 = -2u + v$$



$$1) u(t, 0) = \psi_0(t)$$

$$u(t, 1) = \psi_1(x)$$

$$2) u(t, 0) = \psi_0(t)$$

$$v(t, 1) = \psi_1(x)$$

$$3) u(t, 0) = \psi_0(t)$$

$$v(t, 0) = \psi_1(x)$$

$$4) u(t, 0) = \psi_0(t)$$


$$-2u(t, 0) + v(t, 0) = \psi_1(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{Характеристический вид}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u^2/2}{\partial x} = 0 \quad \text{Дивергентный вид (следствие законов сохранения)}$$

Рассмотрим следующие начальные условия


- 1) $u(0, x)$ – монотонно возрастает >0
 $u(t, 0)$ – монотонно убывает >0



2)

$$u(0, x) = \begin{cases} a, & x \leq x_0 - \varepsilon \\ x \frac{b-a}{2\varepsilon} + \frac{a(x_0 + \varepsilon) + b(\varepsilon - x_0)}{2\varepsilon}, & x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon \\ b > a, & x > x_0 + \varepsilon \end{cases}$$

$$u(t, 0) = a$$



$$3) \ u(0, x) = \begin{cases} a, & x \leq x_0 - \varepsilon \\ b < a, & x > x_0 + \varepsilon \end{cases}$$


$$u(t, 0) = a$$

Реализуется решение с разрывом

Проинтегрируем наше уравнение в прямоугольнике, содержащем разрыв

$$\iint \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u^2/2}{\partial x} \right) dx dt = 0$$


$$D = \frac{a + b}{2} \quad \text{Скорость разрыва}$$




4) $u(0,x)$ монотонно возрастает

Аппроксимация уравнений Хопфа в характеристическом виде иногда ведет к неправильной скорости разрыва


Для корректного описания разрывов нужно исходить из дивергентного вида.





начальное состояние (крайний левый симметричный профиль) и 20 последовательных профилей снятых через равные промежутки времени

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) = 0 \\ \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(P + \rho u^2) = 0 \\ \frac{\partial \rho e}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u e) + P \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ P = (\gamma - 1)\rho e \end{array} \right.$$




$$\begin{array}{l} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) = 0 \\ \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}((\gamma - 1)\rho e + \rho u^2) = 0 \\ \frac{\partial \rho e}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u e) + (\gamma - 1)\rho e \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{array}$$

В качестве
независимых
переменных
выделяем $\rho, \rho u, \rho e$

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} ((\gamma - 1)\rho e + \rho u^2) = 0$$

В качестве независимых переменных выделяем $\rho, \rho u, \rho e$

$$\frac{\partial \rho u^2}{\partial x} = u \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \rho u \frac{\partial u}{\partial x}$$



$$u \frac{\partial \rho u}{\partial x} = \rho u \frac{\partial u}{\partial x} + u^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}$$


$$\rho u \frac{\partial u}{\partial x} = u \frac{\partial \rho u}{\partial x} - u^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \rho u^2}{\partial x} = u \rho \frac{\partial u}{\partial x} + \rho u \frac{\partial u}{\partial x} + u^2 \frac{\partial \rho}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} - u^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} + 2u \frac{\partial \rho u}{\partial x} + (\gamma - 1) \frac{\partial \rho e}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \rho e}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u e) + (\gamma - 1) \rho e \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$e \frac{\partial \rho u}{\partial x} = e \rho \frac{\partial u}{\partial x} + e u \frac{\partial \rho}{\partial x}$$




$$e \rho \frac{\partial u}{\partial x} = e \frac{\partial \rho u}{\partial x} - e u \frac{\partial \rho}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\rho u e) = u e \frac{\partial \rho}{\partial x} + \cancel{u \rho \frac{\partial e}{\partial x}} + \cancel{\rho e \frac{\partial u}{\partial x}}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\rho u e) = e \frac{\partial \rho u}{\partial x} + \cancel{u \rho \frac{\partial e}{\partial x}}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (\rho u e) = \cancel{\rho e \frac{\partial u}{\partial x}} + u \frac{\partial \rho e}{\partial x}$$



$$\frac{\partial}{\partial x} (\rho u e) = e \frac{\partial \rho u}{\partial x} + u \frac{\partial \rho e}{\partial x} - u e \frac{\partial \rho}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \rho e}{\partial t} + \left(e \frac{\partial \rho u}{\partial x} + u \frac{\partial \rho e}{\partial x} - u e \frac{\partial \rho}{\partial x} + (\gamma - 1) \left(e \frac{\partial \rho u}{\partial x} - e u \frac{\partial \rho}{\partial x} \right) \right) = 0$$


$$\frac{\partial \rho e}{\partial t} - \gamma u e \frac{\partial \rho}{\partial x} + \gamma e \frac{\partial \rho u}{\partial x} + u \frac{\partial \rho e}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) = 0$$

В качестве независимых переменных выделяем $\rho, \rho u, \rho e$

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} - u^2 \frac{\partial \rho}{\partial x} + 2u \frac{\partial \rho u}{\partial x} + (\gamma - 1) \frac{\partial \rho e}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \rho e}{\partial t} - \gamma u e \frac{\partial \rho}{\partial x} + \gamma e \frac{\partial \rho u}{\partial x} + u \frac{\partial \rho e}{\partial x} = 0$$



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -u^2 & 2u & (\gamma - 1) \\ -ue\gamma & \gamma e & u \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -u^2 & 2u - \lambda & (\gamma - 1) \\ -ue\gamma & \gamma e & u - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda \begin{vmatrix} 2u - \lambda & \gamma - 1 \\ \gamma e & u - \lambda \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -u^2 & \gamma - 1 \\ -ue\gamma & u - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$-\lambda(2u - \lambda)(u - \lambda) + \lambda\gamma e(\gamma - 1) + u^2(u - \lambda) - ue\gamma(\gamma - 1) = (u - \lambda)(-2u\lambda + \lambda^2 + u^2) + \gamma e(\gamma - 1)(\lambda - u)$$

$$= (u - \lambda)[-2u\lambda + \lambda^2 + u^2 - c^2] = (u - \lambda)(u - \lambda - c)(u - \lambda + c) = 0$$



$$\lambda_1 = u + c$$

$$\lambda_2 = u$$

$$\lambda_3 = u - c$$

$$\lambda_1 = u + c \quad \Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} \boxed{-u - c} & 1 & \boxed{0} \\ \boxed{-u^2} & u - c & \boxed{(\gamma - 1)} \\ \boxed{-ue\gamma} & \gamma e & \boxed{-c} \end{pmatrix}$$

Ищем собственные векторы-строки (!)

$$(-u - c)x_1 - u^2x_2 - ue\gamma x_3 = 0$$

$$(\gamma - 1)x_2 - cx_3 = 0$$

$$\omega_1 = (-uc, c, \gamma - 1)$$

$$\lambda_2 = u \quad \Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} -u & \boxed{1} & \boxed{0} \\ -u^2 & \boxed{u} & \boxed{(\gamma - 1)} \\ -ue\gamma & \boxed{\gamma e} & \boxed{0} \end{pmatrix}$$

$$(\gamma - 1)x_2 = 0$$

$$x_1 + \gamma ex_3 = 0 \quad \cdot (\gamma - 1)$$

$$\omega_2 = (-c^2, 0, \gamma - 1)$$

$$\lambda_3 = u - c \quad \Rightarrow \quad A = \begin{pmatrix} -u + c & \boxed{1} & \boxed{0} \\ -u^2 & \boxed{u + c} & \boxed{(\gamma - 1)} \\ -ue\gamma & \boxed{\gamma e} & \boxed{c} \end{pmatrix}$$

$$\omega_3 = (uc, -c, \gamma - 1)$$

$$\omega_1 = (-uc, c, \gamma - 1)$$

$$\omega_2 = (-c^2, 0, \gamma - 1) \quad \Rightarrow \quad \Omega = \begin{pmatrix} -uc & c & \gamma - 1 \\ -c^2 & 0 & \gamma - 1 \\ uc & -c & \gamma - 1 \end{pmatrix}$$

$$\omega_3 = (uc, -c, \gamma - 1)$$

Инварианты Римана

$$Z = \Omega \mathbf{U} = \begin{pmatrix} -uc & c & \gamma - 1 \\ -c^2 & 0 & \gamma - 1 \\ uc & -c & \gamma - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho(-uc + uc + e(\gamma - 1)) \\ -\rho(c^2 + e(\gamma - 1)) \\ \rho(uc - uc + e(\gamma - 1)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho e(\gamma - 1) \\ -\rho(c^2 + e(\gamma - 1)) \\ \rho e(\gamma - 1) \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial z_1}{\partial t} + \lambda_1 \frac{\partial z_1}{\partial x} = 0 \quad \lambda_1 = u + c$$

$$\frac{\partial z_2}{\partial t} + \lambda_2 \frac{\partial z_2}{\partial x} = 0 \quad \lambda_2 = u$$

$$\frac{\partial z_3}{\partial t} + \lambda_3 \frac{\partial z_3}{\partial x} = 0 \quad \lambda_3 = u - c$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \lambda_2 \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \quad \lambda_2 = u$$

Знак λ_2 ?





Схема Куранта-Изаксона-Риса (КИР)

$$\frac{u + |u|}{2} = \begin{cases} 0, & u < 0 \\ u, & u \geq 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\lambda_2 + |\lambda_2|}{2} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\lambda_2 - |\lambda_2|}{2} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{u - |u|}{2} = \begin{cases} 0, & u \geq 0 \\ u, & u < 0 \end{cases}$$

$$\frac{z_m^{n+1} - z_m^n}{\tau} + \frac{\lambda_2 + |\lambda_2|}{2} \frac{z_m^n - z_{m-1}^n}{h} + \frac{\lambda_2 - |\lambda_2|}{2} \frac{z_{m+1}^n - z_m^n}{h} = 0$$

Оригинал 1928 г. на немецком языке. Существует английский текст.




Courant, R., K. Friedrichs, H. Lewy, (March 1967) [1928]: On the partial difference equations of mathematical physics. *IBM Journal of Research and Development*, **11** (2), pp. 215-234, [doi:10.1147/rd.112.0215](https://doi.org/10.1147/rd.112.0215)

$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} + u \cdot \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} = 0$$

$$q_i^{n+1} = (1 - \alpha) \cdot q_i^n + \alpha \cdot q_{i-1}^n$$

где $\alpha = \frac{u \cdot \Delta t}{\Delta x}$ число Куранта

если оба коэффициента, $(1 - \alpha)$ и α , неотрицательны и не превышают 1 то схема устойчива.



область зависимости для точки (i, n) разностной схемы уголок

Если $\alpha > 1$ или $\alpha < 0$ то прямой подстановкой можно убедиться что для начального условия $q_i^{n=0} = \lambda_0(-1)^i$ будет рост амплитуды.