

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2
«Численные методы решения нелинейных уравнений»

Выполнил:

студент 3 курса 13 группы кафедры
ТП.

Петров Андрей Александрович

Вариант 3.

Задание №1: построить многочлен, удовлетворяющий условию $P_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$, где $P(-1) = 7$, $P(0) = 1$, $P(2) = -5$, $P(3) = -17$.

Ход работы:

$$\begin{cases} a_0 + 0a_1 + 0a_2 + 0a_3 = 1 \\ a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 7 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = -5 \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = -17 \end{cases} \quad a_0=1$$

$$\begin{cases} -a_1 + a_2 - a_3 = 6 \\ 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 = -6 \\ 3a_1 + 9a_2 + 27a_3 = -18 \end{cases}$$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & -6 \\ 3 & 9 & 27 & -18 \end{array} \right| \sim \left| \begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 6 \\ 2 & 4 & 8 & -6 \\ 0 & 12 & 24 & 0 \end{array} \right| \sim \left| \begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 6 \\ 0 & 6 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 12 & -12 \end{array} \right| \sim \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right|$$

$$\begin{cases} a_1 = -6 + a_2 - a_3 \\ a_2 = 1 - a_3 \\ a_3 = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = -3 \\ a_2 = 2 \\ a_3 = -1 \end{cases}$$

Ответ: $P_3(x) = 1 - 3x + 2x^2 - x^3$

Задание №2: с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа второй степени, построенного по значениям функции $f(x)$ в данных узлах x_0, x_1, x_2 , найти ее приближенное значение в указанной точке x и оценить погрешность приближения $f(x) = \ln 2x$, $x_0 = 2$, $x_1 = 2,5$, $x_2 = 3$; $x = 2,25$;

Ход работы:

$$\begin{cases} f(x_0) = \ln 4 = 1,3863 \\ f(x_1) = \ln 5 = 1,6094 \\ f(x_2) = \ln 6 = 1,7918 \end{cases}$$

$$1) \begin{pmatrix} null & x - x_1 & x - x_2 \\ x - x_0 & null & x - x_2 \\ x - x_0 & x - x_1 & null \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} null & -0,25 & -0,75 \\ 0,25 & null & -0,75 \\ 0,25 & -0,25 & null \end{pmatrix}$$

$$\frac{\omega(x)}{x - x_0} = -0,25 * (-0,75) = 0,1875$$

$$\frac{\omega(x)}{x - x_1} = 0,25 * (-0,75) = -0,1875$$

$$\frac{\omega(x)}{x - x_2} = 0,25 * (-0,25) = -0,0625$$

$$2) \begin{pmatrix} null & x_0 - x_1 & x_0 - x_2 \\ x_1 - x_0 & null & x_1 - x_2 \\ x_2 - x_0 & x_2 - x_1 & null \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} null & -0,5 & -1 \\ 0,5 & null & -0,5 \\ 1 & 0,5 & null \end{pmatrix}$$

$$\omega'(x_0) = 0,5$$

$$\omega'(x_1) = -0,25$$

$$\omega'(x_2) = 0,5$$

3)

$$\Lambda_0 = \frac{\omega(x)}{x - x_0} / \omega'(x_0) = 0,1875 / 0,5 = 0,375$$

$$\Lambda_1 = \frac{\omega(x)}{x - x_1} / \omega'(x_1) = -0,1875 / -0,25 = 0,75$$

$$\Lambda_2 = \frac{\omega(x)}{x - x_2} / \omega'(x_2) = -0,0625 / 0,5 = -0,125$$

Найдем приближенное значение в точке $x = 2,25$:

$$P(2,25) = f(x_0) * \Lambda_0 + f(x_1) * \Lambda_1 + f(x_2) * \Lambda_2 = 1,3863 * 0,375 + 1,6094 * 0,75 + 1,7918 * (-0,125) = 1,5029375$$

А также с помощью Wolfram Alpha:

$$P(2,25) \approx 1,504077$$

Реальная погрешность составила $\approx 0,0011395$

Найдем теоретическую погрешность:

$$f'''(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$r_n = \frac{\|(x-2)(x-0,25)(x-3)\|}{3!} * \left\| \frac{2}{x^3} \right\|$$

$$r_n \leq \frac{1*0,5*1}{6} * \frac{1}{4} \approx 0,020833333$$

Теоретическая погрешность составила $\approx 0,020833333$

Вывод, реальная погрешность меньше теоретической.