

Código de cores para nível de alerta local

Para uma resposta efetiva ao surto, as Zonas Verde, Amarelo, Laranja e Vermelha devem ser constantemente identificadas e revistas para auxiliar no monitoramento da situação, para aumentar os esforços de resposta quando necessário, e para liberar áreas de suas restrições quando possível. O nível de detalhe da divisão das áreas em Zonas Amarela, Laranja e Vermelha deve ser a máxima possível (a nível de vizinhança, área urbana, condados e distritos, e estados).

Tipos de Zonas

Zonas Verdes: Regiões sem casos confirmados ou com alguns viajantes infectados que chegam de outras regiões

Zonas Amarelas: Regiões com alguns casos de transmissão local, mas sem focos locais de transmissão entre pessoas da comunidade

Zonas Laranjas: regiões adjacentes às zonas vermelhas ou com pequenos focos regionais da epidemia

Zonas Vermelhas: Regiões que já apresentam transmissão entre pessoas da comunidade

Protocolo de resposta	Verde	Amarelo	Laranja	Vermelho
Aumentar a conscientização do público, incluindo mecanismos de transmissão de doenças e prevenção (distanciamento social, lavagem das mãos, máscaras)	✓	✓	✓	✓
Desenvolver um processo de resposta rápida para testar os cidadãos locais quanto a sintomas relacionados	✓	✓	✓	✓
Realizar testes diagnósticos rápidos nas fronteiras em indivíduos que chegam de viagem das Zonas Amarela ou Laranja, para identificar os indivíduos com sintomas (febre, tosse). Todos os passageiros que estão no mesmo veículo (avião, trem, ônibus, carro) devem ser retidos para o resultado. Se positivo, impor quarentena de 14 dias do caso confirmado e de outros passageiros e tripulantes (individualmente ou em pequenos grupos)	✓	✓	✓	✓
Impor quarentena de 14 dias para indivíduos que provavelmente tiveram contato com indivíduos infectados, incluindo todos os viajantes que vieram das Zonas Vermelhas	✓	✓	✓	✓
Identificar as pessoas que tiveram contato com portadores de casos confirmados (rastreamento de contatos) e testá-los, monitorá-los e/ou isolá-los		✓	✓	✓
Reforçar hábitos de proteção pessoal, incluindo distanciamento social, lavagem das mãos, e formas corretas de conter espirros		✓	✓	✓
Monitorar com frequência o estado de saúde de grupos de pessoas cuja profissão exige contato social frequente (por exemplo, caixas de supermercado, recepcionistas, etc.), especialmente dentro da área onde já foram detectados casos de transmissão local, para detecção precoce de casos e surtos		✓	✓	✓
Convocar os cidadãos a evitarem reuniões não-essenciais, especialmente em espaços fechados		✓	✓	✓
Fornecer proteção máxima para equipes médicas		✓	✓	✓
Promover proteção pessoal, incluindo máscaras faciais			✓	✓
Ordenar o adiamento/cancelamento de reuniões e eventos não-essenciais			✓	✓
Desinfetar lugares públicos			✓	✓
Testar ativamente todos com sintomas			✓	✓
Aumentar capacidade e velocidade em que são feitos os testes diagnósticos			✓	✓
Suspender escolas, locais de culto e empresas				✓
Restringir viagens apenas para fins essenciais				✓
Bloquear comunidades infectadas em quarentena, mantendo as pessoas em suas casas e fornecendo suprimentos sem contato direto com os membros da casa				✓
Pôr em quarentena todas as pessoas que entraram em contato com casos confirmados				✓
Alocar recursos nacionais (médicos, logísticos) para áreas em quarentena				✓
Separar instalações para casos de infecção de instalações para outros serviços de saúde				✓
Criar setores diferentes em hospitais para separar e tratar casos com níveis de gravidade diferentes				✓