Anastomotic Leak Rate According to Anastomotic Technique

Study	Events/Total	AL rate [95% CI]
Circular-stapled		
Pollman L,2025	12/70	17.1% [10.1, 27.6]
Babic B, 2022	6/76	7.9% [3.7, 16.2]
Osterkamp JTF, 2025	3/70	4.3% [1.5, 11.9]
Chon SH, 2022	21/157	13.4% [8.9, 19.6]
Fortich S, 2026	1/6	16.7% [3.0, 56.4]
Pooled Circular-stapled I^2 = 41.7%; τ^2 = 0.140		**11.29% [5.86, 20.64]**
Linear-stapled		
Zeyara A ,2025	14/350	4.0% [2.4, 6.6]
Giuliani G, 2025	4/68	5.9% [2.3, 14.2]
Angehrn F V, 2022 (2)	2/21	9.5% [2.7, 28.9]
Fujita T, 2023	3/42	7.1% [2.5, 19.0]
Pooled Linear-stapled I^2 = 0.0%; τ^2 = 0.000		**4.96% [2.86, 8.48]**
Hand-sewn–stapled		
Bourgeois A, 2025 (1)	9/32	28.1% [15.6, 45.4]
Angehrn F V, 2022 (1)	3/32	9.4% [3.2, 24.2]
de Groot. EM, 2022	14/63	22.2% [13.7, 33.9]
Bongiolatti S, 2016	2/8	25.0% [7.1, 59.1]
Pooled Hand-sewn–stapled I^2 = 13.6%; τ^2 = 0.000		**21.83% [11.79, 36.84]**

Test for subgroup differences: $F_{(2, 10)}$ **= 9.90; P = 0.0043**