

#4 - AULA DE EXERCÍCIOS

NEEMIAS MARTINS

1. Determine os valores máximos e mínimos locais e pontos de sela da função

$$f(x, y) = 9 - 2x + 4y - x^2 - 4y^2.$$

As derivadas parciais de primeira ordem são dadas por:

$$f_x = -2 - 2x$$

$$f_y = 4 - 8y.$$

Para encontrarmos os pontos críticos, devemos resolver as equações

$$\begin{cases} -2 - 2x = 0 & (1) \\ 4 - 8y = 0 & (2) \end{cases}$$

Da Equação (1), temos $2x = -2 \Rightarrow x = -1$. Da Equação (2), $8y = 4 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$. Então o único ponto crítico é $(-1, \frac{1}{2})$.

Agora vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem e $D(x, y)$:

$$f_{xx} = -2 \quad f_{xy} = 0 \quad f_{yy} = -8$$

$$D(x, y) = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{vmatrix} = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-8) - 0^2 = 16.$$

Como $D(-1, \frac{1}{2}) = 16 > 0$ e $f_{xx}(-1, \frac{1}{2}) = -2 < 0$, então pelo Teste da Segunda Derivada $f(-1, \frac{1}{2}) = 11$ é um máximo local.

2. Utilize os multiplicadores de Lagrange para determinar os valores máximo e mínimo da função $f(x, y) = y^2 - x^2$ sujeita à restrição $\frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$.

Vamos determinar os extremos de f sujeita à restrição $g(x, y) = \frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$. Usando os multiplicadores de Lagrange, resolveremos as equações $\nabla f = \lambda \nabla g$ e $g(x, y) = 1$, que podem ser escritas como

$$(-2x, 2y) = \lambda \left(\frac{2x}{4}, \frac{2y}{4} \right) \text{ e } g(x, y) = 1,$$

ou

$$\begin{cases} -2x = \frac{\lambda}{2}x & (1) \\ 2y = \frac{\lambda}{2}y & (2) \\ \frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1 & (3) \end{cases}$$

Da Equação (1),

$$\begin{aligned} -2x - \frac{\lambda}{2}x &= 0 \\ \Rightarrow x(-2 - \frac{\lambda}{2}) &= 0 \\ \Rightarrow x = 0 \text{ ou } \frac{\lambda}{2} = -2 &\Rightarrow \lambda = -4. \end{aligned}$$

Se $x = 0$, pela Equação (3),

$$y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1.$$

Se $\lambda = -4$, pela Equação (2),

$$\begin{aligned} 2y &= \frac{-4}{2}y = -2y \\ \Rightarrow y &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{4}x^2 &= 1, \text{ pela Equação (4)} \\ \Rightarrow x^2 &= 4 \\ \Rightarrow x &= \pm 2. \end{aligned}$$

(De modo análogo, a Equação (2) nos dá $y = 0$ ou $\lambda = 4$. Quando $y = 0$, obtemos $x = \pm 2$. Quando $\lambda = 4$, obteríamos $x = 0$ e assim $y = \pm 1$.) Os pontos críticos de f são $(0, 1), (0, -1), (2, 0), (-2, 0)$. Calculando f nesses pontos, achamos

$$f(0, 1) = f(0, -1) = 1 \text{ e } f(2, 0) = f(-2, 0) = -4.$$

Portanto o valor máximo de f é $f(0, \pm 1) = 1$ e o valor mínimo é $f(\pm 2, 0) = -4$.

3. Usando multiplicadores de Lagrange, determine as dimensões de uma caixa retangular de volume máximo tal que a soma dos comprimentos de suas 12 arestas seja uma constante c .

Queremos maximizar a função $f(x, y, z) = xyz$ sujeita à restrição $g(x, y, z) = 4x + 4y + 4z = c$. Logo, resolveremos as equações $\nabla f = \lambda \nabla g$ e $g(x, y, z) = c$:

$$(yz, xz, xy) = \lambda(4, 4, 4) \text{ e } g(x, y, z) = c$$

i.e

$$\begin{cases} yz = 4\lambda & (1) \\ xz = 4\lambda & (2) \\ xy = 4\lambda & (3) \\ 4(x + y + z) = c & (4) \end{cases}$$

Das Equações (1), (2) e (3) temos

$$\begin{aligned} 4\lambda &= yz = xz = yz \\ \Rightarrow y &= x = z \end{aligned}$$

visto que $x, y, z > 0$ pela natureza do problema. Das igualdades acima e a Equação (4), temos

$$\begin{aligned} 4(x + x + x) &= c \\ \Rightarrow 12x &= c \\ \Rightarrow x &= \frac{c}{12} \\ \Rightarrow x = y = z &= \frac{c}{12} \end{aligned}$$

Portanto as dimensões da caixa de volume máximo são $x = y = z = \frac{c}{12}$.

4. Resolva o exercício anterior sem usar multiplicadores de Lagrange.

Queremos maximizar o volume $V = xyz$ dado que $4x + 4y + 4z = c$. Isolando z na equação,

$$\begin{aligned} 4x + 4y + 4z &= c \\ \Rightarrow z &= \frac{c - 4x - 4y}{4} \\ \Rightarrow z &= \frac{c}{4} - x - y. \end{aligned}$$

Seja $V(x, y) = xyz = xy\left(\frac{c}{4} - x - y\right) = \frac{c}{4}xy - x^2y - xy^2$, $x > 0, y > 0$. Calculando as derivadas parciais de primeira ordem:

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{c}{4}y - 2xy - y^2 \\ V_y &= \frac{c}{4}x - x^2 - 2xy \end{aligned}$$

Queremos encontrar os pontos críticos de V , então fazemos

$$\begin{cases} \frac{c}{4}y - 2xy - y^2 = 0 & (1) \\ \frac{c}{4}x - x^2 - 2xy = 0 & (2) \end{cases}$$

Da Equação (1),

$$\begin{aligned} \frac{c}{4}y - 2xy - y^2 &= 0 \\ \Rightarrow y\left(\frac{c}{4} - 2x - y\right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{c}{4} - 2x - y &= 0, \text{ pois } y > 0 \\ \Rightarrow 2x + y &= \frac{c}{4} & (3) \end{aligned}$$

Da Equação (2),

$$\begin{aligned} \frac{c}{4}x - x^2 - 2xy &= 0 \\ \Rightarrow x\left(\frac{c}{4} - x - 2y\right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{c}{4} - x - 2y &= 0, \text{ pois } x > 0 \\ \Rightarrow x + 2y &= \frac{c}{4} & (4) \end{aligned}$$

Igualando as expressões (4) e (5):

$$\begin{aligned} 2x + y &= x + 2y \\ \Rightarrow x &= y. \end{aligned}$$

Substituindo $x = y$ na expressão (3):

$$\begin{aligned} 3x &= \frac{c}{4} \\ \Rightarrow x &= \frac{c}{12} = y. \end{aligned}$$

Ainda,

$$z = \frac{c}{4} - x - y = \frac{c}{4} - \frac{c}{12} - \frac{c}{12} = \frac{c}{12}.$$

Pela natureza do problema, o ponto crítico nos fornece um valor máximo absoluto. A caixa é um cubo de arestas de comprimento $\frac{c}{12}$.