

$$Q1) T(n) = 3T(n/2) + n^2$$

$$\rightarrow T(n) = aT(n/b) + f(n^2)$$

$$\rightarrow a > 1, b > 1$$

On comparing

$$a=3, b=2, f(n)=n^2$$

$$\text{Now, } C = \log_b a = \log_2 3 = 1.584$$

$$n^c = n^{1.584} < n^2$$

$$\therefore f(n) > n^c$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^2)$$

$$Q2) T(n) = 4T(n/2) + n^2$$

$$\rightarrow a > 1, b > 1$$

$$a=4, b=2, f(n)=n^2$$

$$C = \log_2 4 = 2$$

$$n^c = n^2 = f(n) = n^2$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^2 \log_2 n)$$

$$Q3) T(n) = T(n/2) + 2^n$$

$$\rightarrow a=1$$

$$b=2$$

$$f(n) = 2^n$$

$$C = \log_b a = \log_2 1 = 0$$

$$n^c = n^0 = 1$$

$$f(n) > n^c$$

$$T(n) = \theta(2^n)$$

$$Q4) T(n) = 2^n T(n/2) + n^n$$

$$\rightarrow a=2^n$$

$$b=2, f(n)=n^n$$

$$C = \log_b a = \log_2 2^n = n$$

$$n^c = n^n$$

$$f(n) = n^n$$

$$T(n) = \theta(n^2 \log_2 n)$$

$$Q5) T(n) = 16T(n/4) + n$$

$$\rightarrow a=16, b=4$$

$$f(n) = n$$

$$C = \log_4 16 = \log_4 (4^2) = 2 \log_4 4 = 2$$

$$n^c = n^2$$

$$f(n) < n^c$$

$$\therefore T(n) = \theta(n^2)$$

$$Q6) T(n) = 2T(n/2) + n \log n$$

$$\rightarrow a=2, b=2$$

$$f(n) = n \log n$$

$$C = \log_2 2 = 1$$

$$n^c = n^1 = n$$

$$n \log n > n$$

$$f(n) > n^c$$

$$T(n) = \theta(n \log n)$$

Ans

$$\begin{aligned}
 Q7) T(n) &= 2T(n/2) + n/\log n \\
 \rightarrow a &= 2, b = 2, f(n) = n/\log n \\
 c &= \log_2 2 = 1 \\
 n^c &= n^1 = n \\
 \therefore \frac{n}{\log n} &< n \\
 \therefore f(n) &< n^c \\
 \therefore T(n) &= \theta(n)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q8) T(n) &= 2T(n/4) + n^{0.51} \\
 \rightarrow a &= 2, b = 4, f(n) = n^{0.51} \\
 c &= \log_4 2 = 0.5 \\
 n^c &= n^{0.5} \\
 \therefore n^{0.5} &< n^{0.51} \\
 f(n) &> n^c \\
 \therefore T(n) &= \theta(n^{0.51})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q9) T(n) &= 0.5T(n/2) + 1/n \\
 \rightarrow a &= 0.5, b = 2 \\
 a &> 1 \text{ but here } a \text{ is } 0.5 \\
 \text{so we cannot apply Master's} \\
 \text{Theorem.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q10) T(n) &= 16T(n/4) + n! \\
 \rightarrow a &= 16, b = 4, f(n) = n! \\
 \therefore c &= \log_4 16 = 2 \\
 n^c &= n^2 \\
 \text{As } n! &> n^2 \\
 \therefore T(n) &= \theta(n!)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q11) 4T(n/2) + \log n \quad (2) \\
 \rightarrow a &= 4, b = 2, f(n) = \log n \\
 c &= \log_2 4 = 2 \\
 n^c &= n^2 \\
 f(n) &= \log n \\
 \therefore \log n &< n^2 \\
 f(n) &< n^c \\
 T(n) &= \theta(n^c) \\
 &= \theta(n^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q12) T(n) &= \sqrt{n}T(n/2) + \log n \\
 \rightarrow a &= \sqrt{n}, b = 2 \\
 c &= \log_2 \sqrt{n} = \frac{1}{2} \log_2 n \\
 \therefore \frac{1}{2} \log_2 n &< \log(n)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore f(n) &> n^c \\
 T(n) &= \theta(f(n)) \\
 &= \theta(\log(n))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q13) T(n) &= 3T(n/2) + n \\
 \rightarrow a &= 3; b = 2; f(n) = n \\
 c &= \log_2 3 = 1.5849 \\
 n^c &= n^{1.5849} \\
 n &< n^{1.5849} \\
 \Rightarrow f(n) &< n^c \\
 T(n) &= \theta(n^{1.5849})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Q14) T(n) &= 3T(n/3) + \sqrt{n} \\
 \rightarrow a &= 3, b = 3 \\
 c &= \log_3 3 = 1 \\
 n^c &= n^1 = n \\
 \text{As } \sqrt{n} &< n \\
 f(n) &< n^c \\
 T(n) &= \theta(n)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q15)} T(n) &= 4T(n/2) + n \\ \rightarrow a &= 4, b = 2 \\ c &= \log_b a = \log_2 4 = 2 \\ n^c &= n^2 \\ n &< n^2 \text{ (for any constant)} \\ f(n) &< n^c \\ T(n) &= \Theta(n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q16)} T(n) &= 3T(n/4) + n \log n \\ \rightarrow a &= 3, b = 4, f(n) = n \log n \\ c &= \log_b a = \log_4 3 = 0.792 \\ n^c &= n^{0.792} \\ n^{0.792} &< n \log n \\ T(n) &= \Theta(n \log n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q17)} T(n) &= 3T(n/3) + n/2 \\ \rightarrow a &= 3; b = 3 \\ c &= \log_b a = \log_3 3 = 1 \\ f(n) &= n/2 \\ \therefore n^c &= n^1 = n \\ \text{As } n/2 &< n \\ f(n) &< n^c \\ \therefore T(n) &= \Theta(n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q18)} T(n) &= 6T(n/3) + n^2 \log n \\ \rightarrow a &= 6; b = 3 \\ c &= \log_b a = \log_3 6 = 1.6309 \\ n^c &= n^{1.6309} \\ \text{As } n^{1.6309} &< n^2 \log n \\ \therefore T(n) &= \Theta(n^2 \log n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q19)} T(n) &= 4T(n/2) + n/\log n \\ \rightarrow a &= 4, b = 2, f(n) = \frac{n}{\log n} \\ c &= \log_b a = \log_2 4 = 2 \\ n^c &= n^2 \\ \frac{n}{\log n} &< n^2 \\ T(n) &= \Theta(n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q20)} T(n) &= 64T(n/8) - n^2 \log n \\ \rightarrow a &= 64, b = 8 \\ c &= \log_b a = \log_8 64 = \log_8 (8^2) \\ c &= 2 \\ n^c &= n^2 \\ \therefore n^2 \log n &> n^2 \\ T(n) &= \Theta(n^2 \log n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q21)} T(n) &= 7T(n/3) + n^2 \\ \rightarrow a &= 7; b = 3; f(n) = n^2 \\ c &= \log_b a = \log_3 7 = 1.7712 \\ n^c &= n^{1.7712} \\ n^{1.7712} &< n^2 \\ T(n) &= \Theta(n^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Q22)} T(n) &= T(n/2) + n(2 - \cos n) \\ \rightarrow a &= 1, b = 2 \\ c &= \log_b a = \log_2 1 = 0 \\ n^c &= n^0 = 1 \\ n(2 - \cos n) &> n^c \\ T(n) &= \Theta(n(2 - \cos n)) \end{aligned}$$

Don