

Agent and interpretive criterion
k (events/isolates)
Mean, % (95% CI)
Non-wild-type by ECV
Amphotericin B, CLSI ECV
96 (34/10,505)
1.1 (0.3–2.3)
Amphotericin B, EUCAST ECV
5 (0/168)
—
Fluconazole, CLSI ECV
11 (1090/3746)
20.7 (7.1–36.9)
Fluconazole, EUCAST ECV
5 (38/281)
14.9 (3.9–31.1)
Flucytosine, CLSI ECV
22 (42/2004)
4.2 (1.5–8.3)
Itraconazole, CLSI ECV
65 (1412/9247)
18.2 (13.1–23.5)
Micafungin, CLSI ECV
6 (14/1395)
0.9 (0.4–1.9)
Micafungin, EUCAST ECV
8 (6/394)
1.5 (0.5–2.9)
Posaconazole, CLSI ECV
44 (2616/5220)
36.0 (26.6–45.8)
Voriconazole, CLSI ECV
13 (1170/3578)
27.0 (13.3–42.9)
Resistant by clinical breakpoint
Amphotericin B, EUCAST
57 (33/1412)
2.7 (0.8–5.1)
Anidulafungin, CLSI SS
122 (83/9214)
2.4 (1.2–3.8)
Anidulafungin, EUCAST
35 (49/946)
11.3 (5.9–18.1)
Caspofungin, CLSI SS
188 (161/10,164)
2.2 (1.5–3.1)
Fluconazole, CLSI SS or EUCAST
408 (4241/27,155)
17.5 (15.5–19.8)
Fluconazole, CLSI pre-2012
406 (1469/11,117)
18.0 (15.4–20.5)
Flucytosine, CLSI pre-2012
93 (204/2868)
7.0 (4.4–9.8)
Itraconazole, CLSI pre-2012
156 (661/4362)
18.7 (14.8–22.5)
Itraconazole, EUCAST
16 (125/298)
34.0 (21.1–48.1)
Micafungin, CLSI SS
155 (111/10,328)
1.9 (1.2–2.9)
Posaconazole, EUCAST
21 (299/1053)
39.7 (25.3–54.8)
Voriconazole, CLSI SS
273 (2873/21,507)
13.7 (11.2–16.2)
Voriconazole, CLSI pre-2012
121 (355/3602)
17.8 (13.0–22.3)
Voriconazole, EUCAST
39 (167/1631)
13.2 (8.0–19.8)
0
25
50
75
100
Proportion of isolates, %
Antifungal class
echinocandin
polyene
pyrimidine analogue
triazole
Isolates tested
10
100
1000