



伯汀®

(布克汀)

Butin®

(Bromocriptine)

錠 2.5毫克

Tablets 2.5mg



【成分】每錠中含：
Bromocriptine Mesylate.....2.87mg (eq. to Bromocriptine 2.5mg)

【賦形劑】
Lactose、Microcrystalline Cellulose、Calcium Phosphate Dibasic 2H₂O、Hydroxypropyl cellulose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate、Colloidal Silicon Dioxide。

【適應症】
經閉、原發性腫瘤及藥物引起之乳漏症、女性不孕症、限用於因不得已之醫學理由須預防或抑制產後生理性泌乳之情形，例如：死胎、新生兒死亡或HIV感染之母親...等。本品不建議用於常規性抑制泌乳或緩解產後乳房疼痛及腫脹之症狀，此類症狀以非藥物方式（例如：支撐乳房、冰敷）及/或簡單之止痛藥即可充分緩解。
巴金森氏症、月經前乳房症候群、催乳激素過高所引起之男性性腺機能不足、精子過少、肢端肥大症。

【用法、用量】
通常成人每次一錠，一天一次，漸增至一天2~3次，於飯後服用之。抗巴金森氏症時，則由每次半錠或一錠，每日一次開始治療，然後依每隔1~2週增加一錠的日用量至一日量6~9錠的維持劑量為止，每天2~3次於飯中分別服用之。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】
1. 對Bromocriptine或其他麥角鹼過敏者。於懷孕前、分娩後或產褥期具血壓偏高狀態者。
2. 本品禁用於未控制之高血壓、懷孕前期高血壓（包括：子癇-Eclampsia、妊娠毒血症-Pre-eclampsia、妊娠高血壓-pregnancy-induced hypertension）、分娩後及產褥期高血壓患者。
3. 具冠狀動脈疾病或其他嚴重心血管疾病史者，或具嚴重精神疾病之症狀或病史者，禁用本品於抑制泌乳或其他非危及生命之適應症。

【注意事項】
使用含Bromocriptine成分藥品抑制泌乳之產後婦女中，曾有罕見之通報案例發生嚴重不良事件，包括：高血壓、心肌梗塞、癲癇發作、中風或精神疾病。有些病患於癲癇發作或中風發生前會有嚴重之頭痛及/或短暫之視覺障礙。服藥期間須小心監測患者之血壓，特別是開始治療時之最初幾天。若病人出現高血壓、胸痛、嚴重、惡化或無法緩解之頭痛（不論是否伴隨視覺障礙）或中樞神經系統中毒之症狀，應立即停藥並評估病人之狀況。

【一般注意】
1. 本藥自少量開始投與以至於增量到維持劑量，均宜慎重做血壓、血液學檢查等的觀察。
2. 對乳漏症或血液激素過高性排卵障礙，於投與開始前應做蝶鞍(Sella Turcica)的檢查。
3. 於產褥性乳汁分泌抑制投與時，可併用冰裹法(Ice pack)補助之。
4. 對下列患者宜慎重投與之：
(1) 腦下腺腫瘍及蝶鞍外，且有顯著視力障礙之患者。
(2) 孕婦及可能懷孕的婦女。
(3) 肝障礙或曾有該病歷之患者。
(4) 消化性潰瘍或曾有該病歷之患者。
(5) 雷諾氏病之患者。
(6) 精神病或曾有該病歷之患者。
5. 本藥於婦女長期連用時，可能引起婦科方面之異常，故宜定期做婦科方面的檢查。
6. 其他：
(1) 因具有血壓下降現象，故服用本藥時，開車及從事危險性機械操作均應注意之。
(2) 投與激素過高性腦下腺腫之患者時，曾有因腺腫縮小而產生髓液鼻漏之報告。
(3) 動物實驗長期大量投與時，曾有引起子宮腫瘍之報告。

【孕婦、授乳婦之投與】
孕婦投與本藥之安全性尚未確立，故孕婦及可能懷孕的婦女，宜衡量其利弊再投與之。
對於欲授乳之婦女，避免使用本藥。

【新生兒、乳兒之投與】
由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】
本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】
1. 胃腸：偶而有胃、十二指腸潰瘍惡化現象，此時宜中止投藥。另外可能亦有噁心、嘔氣、嘔吐、便秘、食慾不振、胃痛、腹痛等胃腸症狀出現。
2. 肝臟：偶而有肝機能異常出現（GOT、GPT上昇），此時宜停藥。
3. 循環器：有時會出現眩暈、站起時頭暈、心悸、血壓低下、起立性低血壓、顏面潮紅、胸部不快感、浮腫、夜間腳痙攣或因寒冷而有可逆性指趾蒼白現象。
4. 精神神經系：偶而有幻覺、妄想、興奮、不安、不眠、視覺異常、頭痛、頭重感、運動困難、耳鳴、口渴、鼻閉、氣力低下、嗜眠等現象。
5. 過敏症：偶而會出現發疹，此時宜中止投藥。
6. 其他：偶而有貧血、頭髮脫落等現象。

【保存上之注意】
1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】
2~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號