

Ritodrine 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Ritodrine HCl	Anpo Tablet	安寶錠	10 毫克/錠

作用：

預防早產或流產。

劑量與用法：

一般由注射劑型改口服時，最初 24 小時，每 2 小時服用 1 錠，此後每 4~6 小時服用 1~2 錠。

藥品使用劑量及用法會依臨床症狀及個人差異而不同，請遵照醫囑服用。

注意事項：

1. 疑似心臟病之病人須小心監測。特別是可能有心臟病危險及心臟異常者。
2. 甲狀腺亢進或未控制之甲狀腺亢進可能有嚴重的心臟副作用，包含不規則的心跳。
3. 如有糖尿病、高血壓或未控制高血壓，請告知醫師。
4. 如有偏頭痛或有偏頭痛病史、可能會使症狀惡化。
5. 並用其他藥品前應先與醫師討論，若有使用控制食慾、哮喘、感冒、咳嗽、花粉熱或鼻竇等問題之非處方藥，請告知醫師。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
視力模糊，胸部疼痛或緊張，眩暈或頭昏，嗜睡，口乾，心跳快或不規則	請立即就醫
頭痛，皮膚發紅，食慾不振，噁心，嘔吐，嗜睡，胃痛，疲倦，呼吸困難，排尿增加	請儘速就醫

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。