

Bromocriptine 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Bromocriptine (mesylate)	Parlodel Tablet	保乳調錠	2.5 毫克/錠
	Butin Tablet	伯汀錠	

作用：

臨床上可用於治療肢端肥大症、巴金森氏症、高泌乳激素引起的不孕症，也用於抑制乳汁分泌等。

劑量與用法：

本藥品劑量及用法因人及疾病的不同而異。請依照醫師指示按時服藥，勿自行增減藥量或任意停藥。

注意事項：

1. 如果您曾對此藥或其他麥角鹼（ergot alkaloid）類藥品有過敏反應，請告知醫師。
2. 請定期回診，以確定療效並及時監測可能之副作用。
3. 懷孕及授乳期間不可服用本藥，停經前之病人應避免懷孕，並採取避孕藥以外之其他避孕方式以避免懷孕。
4. 服藥期間若懷孕，請立即停藥並告知醫師。
5. 若同時使用降血壓、降血糖或其他藥品，請特別小心並告知醫師。
6. 如果您有其他疾病，如肝、腎、心血管疾病，血壓異常、癲癇、胃潰瘍或精神疾病等，請告知醫師。
7. 若有難以控制的高血壓或曾於懷孕期間有高血壓病史者，應避免使用該藥品。
8. 避免同時使用麥角鹼或多巴胺作用之藥物。
9. 剛開始服藥或增加劑量時，較容易有眩暈症狀，從坐位或臥姿起身時，請動作盡量緩慢，以避免跌倒。
10. 請在早上起床後 2 小時內服藥，並與食物或牛奶併服。
11. 服用此藥期間，請勿飲酒。
12. 此藥可能會造成頭暈、昏睡等症狀，服藥期間請避免開車或操作機械等危險工作。
13. 服藥期間不可突然停藥，應漸進停用或與醫師討論。

忘記用藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，若已接近下次服藥時間就不用補服，按原來時間服用下一次劑量，千萬不可一次服用兩倍的劑量。

本單張並未包含所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師

此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
藥物過敏反應（如皮膚疹、臉部水腫、嘴巴或咽喉水腫、胸悶或呼吸困難等）、胸痛、排尿量增加或頻尿、視力模糊、抽筋、嚴重頭痛、感覺異常、不規則心跳、呼吸短促、嚴重胃痛、食慾降低等	請立即就醫
初次使用可能引起噁心、嘔吐	睡前減半劑量可減少副作用，之後再增加劑量

藥品該如何存放？

請參考藥袋說明。