

一般臨床 一問一答ワーク（全 105 問）

番号（ ） 名前（ ） 日付（ 月 日）

※ 答えを右の「答：」の欄に書こう。答え合わせは最後の「解答・解説」で。

1. 所見・徴候（12 問）

No.	問題	答え
1	黄疸（おうだん）が最初に見つかりやすい部位は？	答：
2	皮膚や唇が青紫色になる症状を何という？	答：
3	指先が太鼓のばちのように丸くふくらむ所見は？	答：
4	すねを指で押すと、へこみがしばらく残る所見は？	答：
5	パーキンソン病で、歩き出すと止まらず前へ小走りになる歩き方は？	答：
6	クッシング症候群で顔が丸くなる特徴を何という？	答：
7	両足をそろえて立ち、目を閉じると大きくふらつく徴候は？	答：
8	足の裏の外側をこすると、足の親指が背屈（反り返る）する反射は？	答：
9	股と膝を 90 度に曲げ、膝を伸ばそうとすると痛みで伸ばせない徴候は？	答：
10	脳卒中の片麻痺で、腕は曲がり脚は伸びて固まる姿勢は？	答：
11	糖尿病性ケトアシドーシスで見られる、深くて大きい規則的な呼吸は？	答：
12	呼吸がだんだん深くなり、浅くなって止まる、をくり返す呼吸は？	答：

2. 検査・バイタル（12 問）

No.	問題	答え
13	バイタルサイン（生命徴候）の基本の 4 つは？	答：
14	聴診で血圧を測るとき、音が聞こえ始めた点は何の血圧？	答：
15	診察室で測る血圧で、高血圧とされる基準は？	答：
16	成人の安静時で、頻脈と徐脈の目安は？	答：
17	高い熱が続き、1 日の体温の上下が 1℃以内の熱型は？	答：
18	JCS で「刺激しなくても目を開けている」のは何桁？	答：
19	JCS で「普通の呼びかけで容易に開眼する」状態の点数は？	答：
20	GCS（グラスゴー・コーマ・スケール）で評価する 3 つの項目は？	答：
21	肝細胞が壊れると血液中に増える代表的な酵素は？	答：

No.	問題	答え
22	体に炎症があると上がる、血液検査の代表的な項目は？	答：
23	過去 1～2 か月の平均的な血糖の状態がわかる検査値は？	答：
24	急性心筋梗塞で心電図に現れる代表的な変化は？	答：

3. 循環器（10 問）

No.	問題	答え
25	心筋梗塞で血液中に増え、診断に使う物質は？	答：
26	狭心症と心筋梗塞で、ニトログリセリンがよく効くのはどっち？	答：
27	重い心不全で、横になると苦しく、座ると楽になる呼吸は？	答：
28	左心不全で主にうっ血（血液がたまる）する臓器は？	答：
29	右心不全で見られる代表的な症状は？	答：
30	脈が完全にバラバラになり、脳塞栓の原因となる不整脈は？	答：
31	歩くと足が痛くなり、少し休むとまた歩ける症状は？	答：
32	喫煙する若い男性に多く、手足の動脈が詰まる病気は？	答：
33	突然の激しい胸や背中の痛みが、移動していく病気は？	答：
34	チアノーゼを起こす代表的な先天性心疾患は？	答：

4. 呼吸器（10 問）

No.	問題	答え
35	COPD（慢性閉塞性肺疾患）の最大の原因は？	答：
36	肺気腫で、胸が前後に厚くふくらんだ胸の形を何という？	答：
37	肺気腫の胸を打診すると聞こえる音は？	答：
38	気管支喘息の発作で、長くなるのは吸気と呼気のどっち？	答：
39	気管支喘息の発作を止めるのに使う、気管支を広げる吸入薬は？	答：
40	胸水がたまった部分を打診すると聞こえる音は？	答：
41	肺結核は主にどうやってうつる？	答：
42	結核菌は何という種類の菌？	答：
43	やせ型の若い男性に多く、突然の胸痛と息切れで起こる病気は？	答：

No.	問題	答え
44	手術後や長く寝ていた後、動き始めに突然の胸痛と呼吸困難を起こす病気は？	答：

5. 消化器（10問）

No.	問題	答え
45	空腹時にみぞおちが痛み、食べると楽になる潰瘍は？	答：
46	胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃癌の原因になる細菌は？	答：
47	急性虫垂炎で、臍と右上前腸骨棘を結ぶ線上にある圧痛点は？	答：
48	肝硬変で食道にでき、破れると大出血する病変は？	答：
49	肝硬変で、へその周りの静脈が放射状に浮き出る所見は？	答：
50	肝性脳症で見られる、手がバタバタとふるえる症状は？	答：
51	食べ物や水から口を通してうつる（経口感染）肝炎は？	答：
52	慢性化しやすく、肝硬変や肝細胞癌へ進みやすい肝炎は？	答：
53	急性膵炎で血液中に上がる酵素は？	答：
54	潰瘍性大腸炎で多い便の症状は？	答：

6. 内分泌・代謝（10問）

No.	問題	答え
55	バセドウ病で、眼球が前に飛び出す症状を何という？	答：
56	甲状腺機能亢進症（バセドウ病）で、脈拍はどうか？	答：
57	甲状腺機能低下症の代表的な原因となる病気は？	答：
58	糖尿病の三大合併症は？	答：
59	1型糖尿病の主な原因は？	答：
60	糖尿病の診断で使う HbA1c の基準値は？	答：
61	インスリン治療中の人冷や汗・ふるえ・動悸を訴えたら、まず何を疑う？	答：
62	尿崩症（中枢性）で足りなくなるホルモンは？	答：
63	皮膚や粘膜が黒っぽくなる（色素沈着）副腎の病気は？	答：
64	痛風発作がもっとも起こりやすい部位は？	答：

7. 腎・泌尿器（10問）

No.	問題	答え
65	ネフローゼ症候群の主な所見は？	答：

No.	問題	答え
66	急性糸球体腎炎の前にかかっていることが多い感染症は？	答：
67	急性糸球体腎炎で、むくみが出やすい部位は？	答：
68	若い女性に多く、排尿痛・頻尿・残尿感はあるが熱は出ない病気は？	答：
69	高熱と、背中（肋骨脊柱角）をたたくと痛む尿路の感染症は？	答：
70	脱水で腎臓への血流が減って起こる急性腎障害は何性？	答：
71	尿路結石で最も多い結石の種類は？	答：
72	高齢の男性で、尿が出にくい・夜に何度もトイレに行く原因となる病気は？	答：
73	慢性腎不全で、血液中で低下するミネラルは？	答：
74	日本で透析を始める原因として最も多い病気は？	答：

8. 神経（10問）

No.	問題	答え
75	パーキンソン病の四大症状は？	答：
76	パーキンソン病で減る神経伝達物質は？	答：
77	夕方に悪くなるまぶたの下垂や物が二重に見える症状、使うほど力が落ちる病気は？	答：
78	下痢やかぜの1～2週後に、両足から上へ力が抜けていく病気は？	答：
79	運動神経だけが進行性に壊れ、最後は呼吸筋麻痺になる病気は？	答：
80	男の子に多く、ふくらはぎが太く見える（仮性肥大）病気は？	答：
81	心房細動のある人に突然起こる脳梗塞のタイプは？	答：
82	突然の「バットでなぐられたような」激しい頭痛で起こる病気は？	答：
83	アルツハイマー病で早くから強く障害される記憶は？	答：
84	上位運動ニューロン（錐体路）の障害で、腱反射はどうなる？	答：

9. 血液（10問）

No.	問題	答え
85	鉄欠乏性貧血の赤血球の特徴は？	答：
86	鉄欠乏性貧血で見られる爪の変形は？	答：
87	氷などを無性に食べたくなる、鉄欠乏性貧血の症状は？	答：

No.	問題	答え
88	成人男性の鉄欠乏性貧血で、まず疑う原因は？	答：
89	胃を全部とった後に起こりやすい貧血と、足りないビタミンは？	答：
90	ビタミン B12 欠乏で、貧血のほかに出る症状は？	答：
91	血友病 A で足りない凝固因子は？	答：
92	特発性血小板減少性紫斑病（ITP）の原因は？	答：
93	頭蓋骨の打ち抜き像や、背骨の圧迫骨折を起こす血液の病気は？	答：
94	慢性骨髄性白血病で見られる染色体異常は？	答：

10. 感染症・膠原病（11 問）

No.	問題	答え
95	麻疹（はしか）で、発疹の前に頬の内側に出る白い斑点は？	答：
96	体の片側に、帯のように痛みと水疱が出る病気は？	答：
97	AIDS の原因ウイルスと、進行すると起こる感染は？	答：
98	梅毒の晩期に見られる、ゴムのような硬いかたまりは？	答：
99	関節リウマチで、朝に強く出る症状は？	答：
100	手の指で、関節リウマチが起こりにくく、変形性関節症（ヘバーデン結節）が起こる関節は？	答：
101	関節リウマチの診断に役立つ血液検査は？	答：
102	若い女性に多く、頬に蝶のような赤い発疹が出る膠原病は？	答：
103	まぶたの紫色の発疹と、太もも・肩まわりの筋力低下がある膠原病は？	答：
104	口内炎（アフタ）・外陰部潰瘍・目の炎症（ぶどう膜炎）・皮膚症状が出る病気は？	答：
105	皮膚が硬くなり、レイノー現象や飲み込みにくさが出る膠原病は？	答：

解答・解説（講師用）

1. 所見・徴候（12問）

No.	答え	なぜ（解説）
1	眼球結膜（白目）	白目は白いので、ビリルビンの黄色が目立ちやすい。そのため皮膚より先に気づかれることが多い。
2	チアノーゼ	酸素と結びついていないヘモグロビン（還元 Hb）が血液中に増えると、皮膚や唇が青紫に見える。
3	ばち指	肺癌などの慢性の肺の病気や、チアノーゼのある心臓病で起こる。指先の組織が増えて丸くなる。
4	圧痕性浮腫（むくみ）	皮下に水分がたまっているので、押すと水が逃げてへこみがすぐ戻らない。心不全や腎臓病などで見られる。
5	突進歩行（突進性歩行）	姿勢反射障害のため、倒れそうな体を立て直せない。そのため前へ前へと足が出てしまう。
6	満月様顔貌（ムーンフェイス）	コルチゾールが多すぎると、脂肪が顔や体幹に集まり顔が丸くなる。ステロイド薬を長く多く使っても起こる。
7	ロンベルグ徴候（陽性）	深部感覚（脊髄後索）が障害されると、目で見てバランスを補っている。目を閉じると補えずふらつく。
8	バビンスキー反射	錐体路（上位運動ニューロン）が障害されたサイン。ただし1～2歳頃までの乳児では正常でも出る。
9	ケルニッヒ徴候	髄膜炎やくも膜下出血で髄膜が刺激されている。膝を伸ばすと神経が引っばられて痛むので伸ばせない。
10	マン・ウェルニッケ姿勢	錐体路が傷つくと、腕では曲げる筋、脚では伸ばす筋の緊張が強くなる。そのためこの形に固まる。
11	クスマウル呼吸	血液が酸性に傾くので、深い呼吸でCO ₂ をたくさん吐き出し、酸性を打ち消そうとしている。
12	チェーン・ストークス呼吸	呼吸中枢の反応がにぶり、CO ₂ の変化に遅れて反応するため周期的になる。重い心不全や脳の障害で見られる。

2. 検査・バイタル（12問）

No.	答え	なぜ（解説）
13	体温・脈拍・呼吸・血圧	体の状態をすばやく知るための基本の指標。意識状態を加えることもあるが、顔色や身長・体重は入らない。
14	収縮期血圧（最高血圧）	カフの圧が収縮期血圧より下がると血液が流れ始め、音が出る。音が消えた点が拡張期血圧。
15	140/90mmHg 以上	収縮期 140 以上、または拡張期 90 以上のどちらかで高血圧。片方だけ高くても高血圧になる。
16	頻脈＝100 回/分以上、徐脈＝60 回/分未満	安静時の正常はおよそ 60～100 回/分。スポーツ選手は 1 回に送る血液量が多いので徐脈になりやすい。
17	稽留熱（けいりゅうねつ）	高熱が続き上下が小さいのが稽留熱。1℃以上動くが平熱まで下がらないのが弛張熱。
18	1 桁（1）	JCS は開眼で分ける。自分で開眼＝1 桁、刺激すると開眼＝2 桁、刺激しても開眼しない＝3 桁。
19	10	刺激で開眼するのは 2 桁（10・20・30）。そのうち普通の呼びかけで開くのが一番軽い 10。
20	開眼（E）・言語（V）・運動（M）	3 つの点数を合計し、15 点が正常、3 点が最も重い。点が低いほど意識障害が重い。
21	AST・ALT	肝細胞の中にある酵素なので、細胞が壊れると血液へ漏れ出す。ALT は特に肝臓に多い。
22	CRP	炎症が起こると肝臓で CRP が作られ、血液中に増える。細菌感染などで特に高くなる。
23	HbA1c（ヘモグロビン A1c）	ブドウ糖がヘモグロビンにくっついた割合。赤血球は約 120 日生きるなので、最近 1～2 か月の平均を表す。

No.	答え	なぜ（解説）
24	ST 上昇（のちに異常 Q 波）	心筋が傷んだ部分で電気の流れが変わり、急性期に ST が上がる。その後、異常 Q 波が残る。

3. 循環器（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
25	トロポニン・CK（CK-MB）	心筋細胞が壊れ、中の物質が血液に漏れ出す。狭心症は心筋が壊死しないので、CK は大きく上がらない。
26	狭心症	狭心症は一時的な血流不足なので、血管を広げると治まる。心筋梗塞は血管が詰まって壊死しているので効かない。
27	起坐呼吸（きざこきゅう）	座ると血液が下半身にたまり、心臓と肺に戻る血液が減る。そのため肺のうっ血が軽くなり楽になる。
28	肺	左心室が血液を送り出せないと、手前の肺に血液がたまる。そのため呼吸困難やせきが出る。
29	下肢の浮腫・頸静脈怒張・肝腫大	右心室が弱ると、全身から戻る静脈の血液が滞る。そのため足のむくみや首の静脈のふくらみが出る。
30	心房細動	心房が細かくふるえて血液がよどみ、血栓ができる。その血栓が脳へ飛ぶと脳塞栓になる。
31	間欠性跛行（かんけつせいはこう）	閉塞性動脈硬化症などで動脈が狭くなり、歩くと筋肉の酸素が足りなくなる。腰部脊柱管狭窄症でも起こる。
32	バージャー病（閉塞性血栓血管炎）	喫煙と強く関係し、手足の細い動脈に炎症が起きて詰まる。治療の基本は禁煙。
33	急性大動脈解離	大動脈の壁が裂け、裂け目が広がるにつれて痛む場所が移る。高血圧が大きな原因。
34	ファロー四徴症	肺動脈の狭さと心室中隔の穴のため、静脈血が肺を通らず全身へ流れる。酸素の少ない血液が回る。

4. 呼吸器（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
35	喫煙	たばこの煙で肺胞が壊れ、気道の炎症が続く。治療でもまず禁煙が一番大事。
36	樽状胸（たるじょうきょう）	息を吐ききれずに肺に空気がたまり、胸がふくらんだままになるため。
37	鼓音（過共鳴音）	肺に空気がたくさんたまっているため、太鼓のように響く音になる。胸水では逆に濁音になる。
38	呼気（息を吐くほう）	気道が狭くなり、特に息を吐くときに空気が出にくくなる。ヒューヒューという音（喘鳴）も出る。
39	β2 刺激薬	β2 受容体を刺激すると気管支の筋がゆるみ、気道が広がる。β 遮断薬は逆に発作を悪くする。
40	濁音（だくおん）	空気ではなく液体があるので、音が響かずにぶい音になる。腹水がたまった部分も濁音になる。
41	空気感染（飛沫核感染）	結核菌を含むとても小さな粒が空気中にただよい、それを吸いこむことでうつる。
42	抗酸菌（こうさんきん）	菌の表面が脂質の多い壁でおおわれ、酸で色が抜けにくい。そのため抗酸菌と呼ばれる。
43	自然気胸（ききょう）	肺の表面の小さな袋（ブラ）が破れ、胸の中に空気が漏れて肺がしぼむため。
44	肺血栓塞栓症	足の深い静脈にできた血栓が、動き出したときに流れて肺動脈に詰まるため。

5. 消化器（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
45	十二指腸潰瘍	空腹時に胃酸が十二指腸を刺激して痛む。食べ物で酸が薄まると楽になる。胃潰瘍は食後に痛みやすい。
46	ヘリコバクター・ピロリ菌	胃の粘膜にすみつき、炎症を長く続けるため潰瘍や癌の原因になる。除菌すると再発が減る。
47	マックバーニ一点	虫垂のある右下腹部の位置にあたる。虫垂炎の痛みは、はじめみぞおちで始まり右下腹部へ移る。
48	食道静脈瘤	肝臓が硬くなり門脈の血液が流れにくくなる。行き場を失った血液が食道の静脈を太くする。

No.	答え	なぜ（解説）
49	メドゥーサの頭（腹壁静脈怒張）	門脈圧が上がり、血液が迂回路として腹壁の静脈へ流れる。そのため静脈が太く浮き出る。
50	羽ばたき振戦（しんせん）	肝臓でアンモニアを処理できず、脳の働きが乱れるため。手を前に伸ばすと羽ばたきようにふるえる。
51	A型肝炎（E型も）	便に出たウイルスが口から入ってうつる。B型・C型は血液や体液を通してうつる。
52	C型肝炎（B型も）	C型は感染すると慢性化しやすく、長く続く炎症で肝硬変から肝細胞癌へ進みやすい。A型は慢性化しない。
53	アミラーゼ（リパーゼ）	膵臓の消化酵素が膵臓自身をとかって傷つけ、血液中に漏れ出す。主な原因はアルコールと胆石。
54	粘血便（ねんけつべん）	大腸の粘膜に炎症と潰瘍が直腸から続けて広がるため、粘液と血が混ざった便になる。

6. 内分泌・代謝（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
55	眼球突出	自己抗体が目の奥の筋肉や脂肪にも炎症を起こし、組織がはれて眼球が前に押し出される。
56	頻脈（速くなる）	甲状腺ホルモンは代謝を高め、心臓の働きも強める。汗をかく・手がふるえる・やせるなども出る。
57	橋本病（慢性甲状腺炎）	自己免疫で甲状腺が少しずつ壊され、ホルモンが足りなくなる。むくみ・寒がり・意欲低下が出る。
58	神経障害・網膜症・腎症	高血糖が続くと細い血管が傷む（細小血管障害）。「し・め・じ」（神経・目・腎）で覚える。
59	自己免疫で膵臓のβ細胞が壊れること	インスリンを作る細胞が壊され、インスリンがほとんど出なくなる。そのためインスリン注射が必要。
60	6.5%以上	6.5%以上は、高血糖が長く続いている目安。血糖値と組み合わせて診断する。
61	低血糖（→すぐ糖分をとらせる）	インスリンが効きすぎて血糖が下がりすぎた状態。体が血糖を上げようと交感神経が働き、冷や汗や動悸が出る。
62	抗利尿ホルモン（バソプレシン）	腎臓で水を再吸収させるホルモンが足りず、薄い尿が大量に出る。のどが渇き水をたくさん飲む。
63	アジソン病	副腎皮質ホルモンが足りず、下垂体からACTHがたくさん出る。ACTHにはメラニンを増やす作用もあるため。
64	足の親指の付け根（第1中足趾節関節）	血液中の尿酸が結晶になって関節にたまり、炎症を起こす。体の末端で冷えやすい足の親指に多い。

7. 腎・泌尿器（10問）

No.	答え	なぜ（解説）
65	大量の蛋白尿・低蛋白血症・浮腫・脂質異常症	糸球体から蛋白が漏れ、血液の蛋白が減るので水が血管の外へ出てむくむ。肝臓がコレステロールを多く作る。
66	溶連菌（A群β溶血性レンサ球菌）の感染	のどの感染の1～2週間後、免疫の反応が糸球体に炎症を起こす。血尿・むくみ・高血圧が出る。
67	顔（まぶた）	まぶたは皮膚の下がゆるく、水がたまりやすい。朝の顔のむくみで気づかれることが多い。
68	急性膀胱炎	女性は尿道が短く、細菌（主に大腸菌）が膀胱に入りやすい。膀胱だけの炎症なので高熱は出にくい。
69	急性腎盂腎炎（じんうじんえん）	細菌が膀胱から腎臓までさかのぼって炎症を起こす。腎臓に近い背中をたたくと響いて痛む。
70	腎前性	腎臓そのものではなく、その手前の血液量不足が原因。尿を作る材料の血液が腎臓に届かない。
71	カルシウム結石（シュウ酸カルシウムなど）	尿の中のカルシウムがシュウ酸などと結びついて固まる。急に激しい腰や脇腹の痛みと血尿が出る。
72	前立腺肥大症	膀胱の出口を囲む前立腺が大きくなり、尿道を圧迫する。尿が出にくく、残尿が増える。

No.	答え	なぜ（解説）
73	カルシウム	腎臓でビタミンDが活性化されず、腸からカルシウムを吸収できない。リンは逆にたまって上がる。
74	糖尿病性腎症	高血糖で糸球体の細い血管が傷み、長い年月をかけて腎臓の動きが落ちていくため。

8. 神経（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
75	安静時振戦・筋固縮・無動・姿勢反射障害	中脳の黒質でドパミンが減り、体の動きの調節がうまくいなくなるため。
76	ドパミン	黒質のドパミンを作る神経細胞が減るため。治療はドパミンを補う薬（L-ドパ）が中心。
77	重症筋無力症	自己抗体が神経筋接合部のアセチルコリン受容体をじゃまし、筋肉を使うほど信号が伝わりにくくなる。
78	ギラン・バレー症候群	感染をきっかけに免疫が末梢神経を攻撃する。末梢神経の障害なので腱反射は低下・消失する。
79	筋萎縮性側索硬化症（ALS）	上位と下位の運動ニューロンが両方壊れる。感覚や目の動き、排尿・排便の機能は保たれやすい。
80	デュシェンヌ型筋ジストロフィー	伴性劣性遺伝なので男の子に出る。壊れた筋肉が脂肪などに置きかわり、太く見えるが力は弱い。
81	脳塞栓（心原性脳塞栓症）	心臓でできた血栓が脳の血管へ流れて詰まる。突然起こり、症状が一気に出そろうやすい。
82	くも膜下出血	多くは脳動脈瘤が破れ、くも膜の下に出血する。髄膜が刺激され、首が硬くなる（項部硬直）。
83	近時記憶（最近のことを覚える力）	記憶をつくる海馬から縮み始めるため、最近のことを覚えられない。昔の記憶は比較的残る。
84	亢進する（強くなる）	上からの抑えがなくなり、反射が強くなる。下位運動ニューロンの障害では低下・消失する。

9. 血液（10 問）

No.	答え	なぜ（解説）
85	小球性低色素性	鉄が足りずヘモグロビンが作れないため、赤血球が小さく色が薄くなる。
86	スプーン状爪（さじ状爪）	鉄不足で爪が薄くもろくなり、真ん中がへこんでスプーンのように反り返る。
87	異食症（氷食症）	鉄不足で起こる特徴的な症状。はっきりした仕組みは不明だが、鉄を補うと治まることが多い。
88	消化管からの出血（潰瘍・癌など）	男性は月経がないので、胃や腸から少しずつ出血していないかを疑う。黒い便（タール便）が手がかり。
89	巨赤芽球性貧血（悪性貧血）・ビタミンB12	B12の吸収には胃で作られる内因子が必要。胃がないと吸収できず、大きな未熟な赤血球になる。
90	神経障害（しびれなど）・ハンター舌炎	B12は神経を保つのに必要。脊髄の後索などが傷み、しびれやふらつきが出る。舌も赤くつるつるになる。
91	第Ⅷ因子	血友病Aは第Ⅷ因子、Bは第Ⅸ因子の不足。伴性劣性遺伝で男性に多く、関節内出血をくり返す。
92	血小板に対する自己抗体	自己抗体がついた血小板が脾臓で壊される。骨髄で血小板を作る巨核球は減らない。
93	多発性骨髄腫	腫瘍になった形質細胞が骨を溶かす。骨がもろくなり、骨の痛みや骨折が起こる。
94	フィラデルフィア染色体（9番と22番の転座）	転座でできたBCR-ABL遺伝子が、白血球を増やし続ける信号を出すため。

10. 感染症・膠原病（11 問）

No.	答え	なぜ（解説）
95	コプリック斑	麻疹の発疹が出る前の時期に現れる。早く診断するための手がかりになる。
96	帯状疱疹	水ぼうそうのウイルスが神経節にひそみ、免疫が落ちると再び暴れる。神経にそって出るので片側になる。
97	HIV・日和見感染	HIVはヘルパーT細胞（CD4）を壊す。免疫が落ちるので、ふだんは平気な弱い病原体にも感染する。

No.	答え	なぜ（解説）
98	ゴム腫	梅毒は第1期（硬性下疳）→第2期（バラ疹）→晩期と進む。晩期にゴム腫や神経の症状が出る。
99	朝のこわばり	関節の滑膜に炎症があり、寝て動かない間に関節のまわりがはれて固まる。起きてすぐは動かしにくい。
100	DIP 関節（遠位指節間関節）	関節リウマチはPIP・MCP 関節や手首に多い。指先に一番近いDIP 関節の変形は変形性関節症の特徴。
101	リウマトイド因子（抗 CCP 抗体）	どちらも関節リウマチで出る自己抗体。抗 CCP 抗体はより早い時期から、より確かに出る。
102	全身性エリテマトーデス（SLE）	自己抗体が全身の臓器を攻撃する。日光で悪くなり、腎臓の炎症（ループス腎炎）も起こる。
103	皮膚筋炎	自己免疫で皮膚と筋肉に炎症が起こる。悪性腫瘍（癌）を合併しやすいので、癌の検査も必要。
104	ベーチェット病	この4つが主な症状で、全身に炎症をくり返す。はっきりした原因はまだわかっていない。
105	強皮症（全身性硬化症）	皮膚や内臓が硬くなる（線維化）。食道が硬くなると飲み込みにくく、指の血管がけいれんして白くなる。