

脈管と神経 暗記ワーク（はじめて編）

番号（ ） 名前（ ） 日付（ 月 日）

やり方：STEP1 を声に出して 2 回読む → 表をかくして STEP2・STEP3 を解く → わからない所だけ表を見る。

ユニット① 心臓（部屋・弁・血液の流れ・刺激伝導系）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
4つの部屋	右心房（うしんぼう）・右心室・左心房・左心室	房＝入口の部屋、室＝送り出すポンプ
左心室 （さしんしつ）	全身へ血液を送る。壁が一番厚い	全身へ送るので力持ち
4つの弁	房室弁：三尖弁（さんせんべん）＝右、僧帽弁（そうぼうべん）＝左（2枚）／動脈弁：肺動脈弁・大動脈弁	右は「三」尖、左の僧帽弁は2尖
腱索・乳頭筋 （けんさく・にゅうとうきん）	房室弁（三尖弁・僧帽弁）だけにつく。弁が裏返るのを防ぐひも	動脈弁にはない
血液の流れ	全身→上・下大静脈→右心房→三尖弁→右心室→肺動脈弁→肺動脈→肺→肺静脈→左心房→僧帽弁→左心室→大動脈弁→大動脈→全身	全身の血液が最初に通る弁は三尖弁
肺動脈・肺静脈	肺動脈＝静脈血（酸素が少ない）。肺静脈＝動脈血（酸素が多い）	名前と中身が逆（よく出る）
冠状動脈 （かんじょう）	心臓の筋肉を養う動脈（右と左）。大動脈弁のすぐ上（大動脈の根もと）から出る	詰まると心筋梗塞
刺激伝導系 （しげきでんどうけい）	洞房結節（どうぼうけっせつ）→房室結節→ヒス束（そく）→右脚・左脚（きやく）→プルキンエ線維	洞房結節＝ペースメーカー（右心房にある）
卵円窩 （らんえんか）	心房中隔（右心房と左心房の壁）のくぼみ。胎児の卵円孔のあと	心「房」中隔。心室ではない

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------|------------------|
| 1. 洞房結節 ● | ● ア. 右心房と右心室の間の弁 |
| 2. 三尖弁 ● | ● イ. 全身へ血液を送る部屋 |
| 3. 僧帽弁 ● | ● ウ. 心房中隔のくぼみ |
| 4. 左心室 ● | ● エ. 心臓のペースメーカー |
| 5. 冠状動脈 ● | ● オ. 動脈血が流れる静脈 |
| 6. 肺静脈 ● | ● カ. 左心房と左心室の間の弁 |
| 7. 卵円窩 ● | ● キ. 心臓の筋肉を養う血管 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：僧帽弁 / 大動脈弁 / 肺動脈弁 / 肺動脈 / 左心房 / 大動脈 / 右心房 / 房室結節

- 右心室から出る血管は（ ）。
- 左心室から出る血管は（ ）。
- 全身から帰ってきた血液は、まず（ ）に入る。
- 腱索がつくのは、三尖弁と（ ）。
- 冠状動脈は（ ）のすぐ上から出る。
- 洞房結節 → （ ） → ヒス束 → 脚 → プルキンエ線維。

ユニット② 動脈①（大動脈弓・頭と首・腕）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
大動脈の道すじ	左心室→上行大動脈→大動脈弓→胸大動脈→（横隔膜の大動脈裂孔）→腹大動脈	名前は場所で変わる
大動脈弓の3本の枝	右から 腕頭動脈（わんとうどうみゃく）・左総頸動脈・左鎖骨下動脈	「わん・そう・さ」
腕頭動脈 （わんとう）	右だけにある。右総頸動脈と右鎖骨下動脈に分かれる	左の2本は大動脈弓から直接
総頸動脈 （そうけい）	首の横。のど仏の横で脈が触れる。内頸動脈と外頸動脈に分かれる	
内頸動脈 （ないけい）	頭の中へ入り、脳と眼（眼動脈）を養う	内＝頭の中
外頸動脈 （がいけい）	顔と頭の外側へ。顔面動脈（下あごの縁で脈）・浅側頭動脈（耳の前で脈）など	外＝顔・頭の外側
椎骨動脈 （ついこつ）	鎖骨下動脈の枝。頸椎の横突孔を上り、大後頭孔から頭の中へ→脳	深いので脈は触れない
鎖骨下動脈 （さこつか）	前斜角筋と中斜角筋の間（斜角筋隙（しゃかくきんげき））を通る→わきで腋窩動脈（えきかどうみゃく）になる	鎖骨の下→わきの下→二の腕で名前が変わる
上腕動脈 （じょうわん）	二の腕の内側。肘の前（肘窩（ちゅうか））で橈骨動脈と尺骨動脈に分かれる	血圧を測る所
橈骨動脈・尺骨動脈 （とうこつ・しゃっこつ）	橈骨動脈＝前腕の親指側、手首の親指側で脈をとる。尺骨動脈＝小指側	2本は手のひらでつながる（掌動脈弓）

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------------|------------|
| 1. 大動脈弓の右の最初の枝 ● | ● ア. 内頸動脈 |
| 2. 脳へ行く首の動脈 ● | ● イ. 浅側頭動脈 |
| 3. 横突孔を通る動脈 ● | ● ウ. 上腕動脈 |
| 4. 手首で脈をとる動脈 ● | ● エ. 腕頭動脈 |
| 5. 肘で血圧を測る動脈 ● | ● オ. 椎骨動脈 |
| 6. わきの下の動脈 ● | ● カ. 橈骨動脈 |
| 7. 耳の前で脈が触れる動脈 ● | ● キ. 腋窩動脈 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：尺骨動脈 / 左鎖骨下動脈 / 総頸動脈 / 大後頭孔 / 斜角筋隙 / 外頸動脈 / 腕頭静脈 / 大腿動脈

- 大動脈弓の枝は、腕頭動脈・左総頸動脈・（ ）の3本。
- 総頸動脈は、内頸動脈と（ ）に分かれる。
- 鎖骨下動脈は、前斜角筋と中斜角筋の間の（ ）を通る。
- 上腕動脈は肘の前で、橈骨動脈と（ ）に分かれる。
- 椎骨動脈は（ ）を通過して頭の中へ入る。
- のど仏の横で脈が触れるのは（ ）。

ユニット③ 動脈②（おなか・脚）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
腹大動脈 （ふくだい）	横隔膜の大動脈裂孔を通ったあとの大動脈。背骨の前を下る	上から腹腔→上腸間膜→腎→下腸間膜の順に枝が出る
腹腔動脈 （ふくくう）	一番上の枝。胃・肝臓・脾臓（ひぞう）・脾臓（すいぞう）の一部へ	3本に分かれる（左胃・総肝・脾動脈）
上腸間膜動脈 （じょうちょうかんまく）	小腸と大腸の前半へ	
腎動脈 （じんどうみゃく）	左右の腎臓へ。精巣（卵巣）動脈も腹大動脈から直接出る	精巣・卵巣動脈は腹大動脈の枝（よく出る）
下腸間膜動脈 （かちょうかんまく）	大腸の後半（下行結腸・S状結腸・直腸の上部）へ	一番下で出る大きな枝
総腸骨動脈 （そうちょうこつ）	腹大動脈が第4腰椎の高さで左右に分かれたもの→内腸骨動脈と外腸骨動脈	
内腸骨動脈 （ないちょうこつ）	骨盤の中（膀胱・子宮など）とおしり（上殿・下殿動脈）へ	子宮動脈は内腸骨動脈の枝
外腸骨動脈 （がいちょうこつ）	脚へ向かう。鼠径靱帯（そけいじんたい）をくぐると大腿動脈になる。枝＝下腹壁動脈	
大腿動脈 （だいたい）	太ももの付け根（大腿三角）で脈が触れる。内側から静脈・動脈・神経の順	内側から「じょう・どう・しん」
膝窩動脈 （しっかどうみゃく）	ひざの後ろ。前脛骨動脈と後脛骨動脈に分かれる	
前脛骨動脈→足背動脈 （そくはい）	すねの前→足の甲（足背動脈）。足の甲で脈が触れる	
後脛骨動脈 （こうけいこつ）	すねの後ろ。うちくるぶし（内果）の後ろで脈が触れる	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. 胃・肝臓・脾臓へ行く ● | ● ア. 膝窩動脈 |
| 2. 小腸へ行く ● | ● イ. 後脛骨動脈 |
| 3. 大腸の後半へ行く ● | ● ウ. 大腿動脈 |
| 4. 鼠径靱帯をくぐった後の名前 ● | ● エ. 下腸間膜動脈 |
| 5. ひざの後ろの動脈 ● | ● オ. 上腸間膜動脈 |
| 6. 足の甲で脈が触れる ● | ● カ. 腹腔動脈 |
| 7. 内果の後ろで脈が触れる ● | ● キ. 足背動脈 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：腹大動脈 / 大腿神経 / 大動脈裂孔 / 食道裂孔 / 総腸骨動脈 / 外腸骨動脈 / 下腹壁動脈 / 内腸骨動脈

- 腹大動脈は第4腰椎の高さで、左右の（ ）に分かれる。
- 子宮や膀胱へ行くのは（ ）の枝。
- 精巣動脈は（ ）から直接出る。
- 大腿三角では、内側から大腿静脈・大腿動脈・（ ）の順に並ぶ。
- 外腸骨動脈の枝は（ ）。
- 胸大動脈は横隔膜の（ ）を通過して腹大動脈になる。

ユニット④ 静脈・リンパ・胎児循環

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
上大静脈・下大静脈	上半身・下半身の静脈血を集めて右心房へ。肝静脈は下大静脈へ直接入る	
門脈 (もんみゃく)	胃・腸・脾臓・膵臓の血液を集めて肝臓へ運ぶ静脈（脾静脈・上腸間膜静脈などが集まる）	腸で吸収した栄養をまず肝臓へ
奇静脈 (きじょうみゃく)	胸の後ろの右側を上る静脈。肋間静脈などを集めて上大静脈へ	リンパは流れない
腕頭静脈 (わんとうじょうみゃく)	左右に1本ずつある。左右が合わさって上大静脈になる	腕頭動脈は右だけ、静脈は左右
大伏在静脈 (だいふくざいじょうみゃく)	脚の内側を上る皮静脈（ひじょうみゃく）。太ももの付け根で大腿静脈に入る	体で一番長い静脈
小伏在静脈 (しょうふくざいじょうみゃく)	ふくらはぎの後ろを上り、膝窩静脈に入る	
胸管 (きょうかん)	一番太いリンパ管。乳び槽（にゅうびそう）から始まり、左静脈角に注ぐ。右上半身のリンパは右リンパ本幹→右静脈角	静脈角＝内頸静脈と鎖骨下静脈の合流点
臍静脈 (さいじょうみゃく)	胎盤→胎児。酸素が一番多い血液（1本）	胎児では静脈に酸素が多い
臍動脈 (さいどうみゃく)	胎児→胎盤。酸素が一番少ない血液（2本）	
静脈管 (じょうみゃくかん)	臍静脈の血液の多くを、肝臓を通さずに下大静脈へ（アランチウス管）	肝臓の近道
卵円孔 (らんえんこう)	右心房→左心房の近道（肺を通らない）。生まれたあと卵円窩になる	心房の近道
動脈管 (どうみゃくかん)	肺動脈→大動脈の近道（ボタロー管）。生まれたあと動脈管索になる	動脈どうしの近道

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. 腸の血液を肝臓へ運ぶ ● | ● ア. 大伏在静脈 |
| 2. 上大静脈に注ぐ胸の後ろの静脈 ● | ● イ. 臍静脈 |
| 3. 脚の内側を上る皮静脈 ● | ● ウ. 動脈管 |
| 4. 左静脈角に注ぐリンパ管 ● | ● エ. 卵円孔 |
| 5. 胎児で肺動脈と大動脈の近道 ● | ● オ. 奇静脈 |
| 6. 胎児で右心房と左心房の近道 ● | ● カ. 門脈 |
| 7. 胎盤から胎児へ酸素を運ぶ ● | ● キ. 胸管 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：腎臓 / 大腿静脈 / 右静脈角 / 左静脈角 / 膝窩静脈 / 臍動脈 / 肝臓 / 卵円窩

- 大伏在静脈は、太ももの付け根で（ ）に入る。
- 小伏在静脈は（ ）に入る。
- 胸管は乳び槽から始まり、（ ）に注ぐ。
- 胎児の血管で、酸素が一番少ないのは（ ）。
- 卵円孔は、生まれたあと（ ）になる。
- 門脈は、胃・腸・脾臓の血液を（ ）へ運ぶ。

ユニット⑤ 中枢神経（大脳・間脳・小脳・脳幹・髄膜・脊髄）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
中枢神経 （ちゅうすうしんけい）	脳と脊髄。脳＝大脳・間脳・小脳・脳幹（中脳・橋（きょう）・延髄（えんずい））	
前頭葉 （ぜんとうよう）	おでこ側。運動野（中心前回）＝体を動かす命令。ブローカ野＝言葉を話す（運動性言語中枢）	ブローカ＝しゃべる
頭頂葉 （とうちようよう）	頭のとっぺん。感覚野（中心後回）＝皮膚などの感覚	中心溝の前が運動、後ろが感覚
側頭葉 （そくとうよう）	耳の上。聴覚野＝聞く。ウェルニッケ野＝言葉を理解する（感覚性言語中枢）	耳の近くで聞いて理解
後頭葉 （こうとうよう）	頭の後ろ。視覚野＝見る	目は前でも、見る場所は後ろ
間脳 （かんのう）	視床（ししょう）＝感覚の中継所。視床下部＝体温・食欲・ホルモン（自律神経の中枢）	
小脳 （しょうのう）	頭の後ろの下。体のバランス・運動の調整	こわれると、ふらつく
脳幹 （のうかん）	中脳・橋・延髄。延髄＝呼吸と心臓の中枢	延髄は命の中枢
髄膜 （ずいまく）	外から硬膜（こうまく）・くも膜・軟膜（なんまく）の3層。くも膜の下（くも膜下腔）を脳脊髄液が流れる	かたい→くも→やわらかい
脊髄 （せきずい）	前角（ぜんかく）＝運動の神経細胞。後角（こうかく）＝感覚の神経が入る。大人では第1～2腰椎の高さで終わる	前＝運動、後ろ＝感覚

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 運動野 ● | ● ア. 側頭葉 |
| 2. 感覚野 ● | ● イ. 後頭葉 |
| 3. 視覚野 ● | ● ウ. 頭頂葉（中心後回） |
| 4. 聴覚野 ● | ● エ. 視床下部 |
| 5. 呼吸と心臓の中枢 ● | ● オ. 前頭葉（中心前回） |
| 6. 体のバランスの調整 ● | ● カ. 延髄 |
| 7. 体温・食欲の中枢 ● | ● キ. 小脳 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：ウェルニッケ野 / 後角 / 前角 / 視床 / くも膜 / くも膜下腔 / 中脳 / ブローカ野

- 言葉を話す中枢は（ ）。
- 言葉を理解する中枢は（ ）。
- 髄膜は外から、硬膜・（ ）・軟膜の3層。
- 脳脊髄液は（ ）を流れる。
- 脊髄の（ ）には、運動の神経細胞がある。
- 感覚の中継所は、間脳の（ ）。

ユニット⑥ 脳神経 12 対

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

番号	名前 (よみ)	主なはたらき	覚え方・なぜ
I	嗅神経 (きゅうしんけい)	においを感じる	
II	視神経 (ししんけい)	見る	
III	動眼神経 (どうがんしんけい)	眼を動かす (多くの眼の筋) ・まぶたを上げる・瞳を小さくする (副交感)	副交感あり
IV	滑車神経 (かつしゃしんけい)	眼を動かす (上斜筋)	
V	三叉神経 (さんさしんけい)	顔の感覚・かむ筋 (咀嚼筋 (そしゃくきん))	眼神経・上顎神経・下顎神経の3本に分かれる
VI	外転神経 (がいてんしんけい)	眼を外に向ける (外側直筋)	
VII	顔面神経 (がんめんしんけい)	表情筋を動かす・舌の前 2/3 の味覚・涙と唾液 (副交感)	副交感あり。麻痺で顔の片側が動かない
VIII	内耳神経 (ないじしんけい)	聞く (蝸牛 (かぎゅう) 神経) ・体のバランス (前庭神経)	
IX	舌咽神経 (ぜついんしんけい)	舌の後ろ 1/3 の味覚・のど・唾液 (副交感) ・頸動脈洞と頸動脈小体	副交感あり
X	迷走神経 (めいそうしんけい)	心臓・肺・胃腸など内臓の副交感神経。枝の反回神経が声帯を動かす	副交感の主役。おなかまで広く走る
XI	副神経 (ふくしんけい)	僧帽筋・胸鎖乳突筋を動かす	
XII	舌下神経 (ぜっかしんけい)	舌を動かす	舌を動かすのは舌下、味は顔面と舌咽

★覚え方 (順番) : 「かいで・みる・うごく・くるまの・みつの・そと・かお・きく・のど・まよう・ふく・した」 副交感を含むのは III・VII・IX・X の 4 つ (3・7・9・10) 。

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. I 嗅神経 ● | ● ア. 舌を動かす |
| 2. II 視神経 ● | ● イ. 内臓の副交感神経 |
| 3. V 三叉神経 ● | ● ウ. 表情筋を動かす |
| 4. VII 顔面神経 ● | ● エ. 僧帽筋・胸鎖乳突筋 |
| 5. VIII 内耳神経 ● | ● オ. においを感じる |
| 6. X 迷走神経 ● | ● カ. 顔の感覚・かむ筋 |
| 7. XI 副神経 ● | ● キ. 見る |
| 8. XII 舌下神経 ● | ● ク. 聞く・体のバランス |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群 : 4 / 動眼神経 / 11 / 3 / 舌咽神経 / 外転神経 / 迷走神経 / 三叉神経
1. 眼を動かす神経は、動眼神経・滑車神経・ () の 3 つ。
2. 副交感神経を含む脳神経は、III・VII・IX・X の () つ。
3. 瞳を小さくする副交感神経は () に含まれる。
4. 頸動脈洞・頸動脈小体に関わるのは () 。
5. 声帯を動かす反回神経は、 () の枝。
6. 副神経は、第 () 脳神経。

ユニット⑦ 腕神経叢（腕の神経と麻痺の手）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

神経（よみ）	通る所・出る所	主な支配筋	麻痺すると	覚え方・なぜ
筋皮神経 （きんぴしんけい）	上腕の前（烏口腕筋をつらぬく）	上腕二頭筋・上腕筋・烏口腕筋	肘が曲げにくい	力こぶの神経
腋窩神経 （えきかしんけい）	上腕骨の外科頸の後ろを回る	三角筋・小円筋	腕を横に上げられない	外科頸骨折・肩の脱臼で傷つく
橈骨神経 （とうこつしんけい）	上腕骨の後ろ（橈骨神経溝）をらせん状に回る	上腕三頭筋・腕橈骨筋・前腕の伸筋	下垂手（かすいしゅ）＝手首が垂れる	伸ばす筋の担当。上腕骨の骨幹部骨折で傷つく
正中神経 （せいちゅうしんけい）	肘の前（肘窩）→手首の手根管（しゅこんかん）	前腕の屈筋の多く・円回内筋・母指球筋	猿手（さるて）＝親指のふくらみがやせる	手根管症候群
尺骨神経 （しゃっこつしんけい）	上腕骨の内側上顆の後ろ（肘をぶつけてビリッとする所）	尺側手根屈筋・手の小さい筋の多く（骨間筋・小指球筋など）	鷲手（わしで）＝薬指と小指が曲がる	肘部管（ちゅうぶかん）症候群

★腕神経叢（わんしんけいそう）＝C5～T1の前枝が集まったもの。鎖骨下動脈と一緒に斜角筋隙を通る。ほかの枝：肩甲上神経＝棘上筋・棘下筋／胸背神経＝広背筋／長胸神経＝前鋸筋（麻痺で肩甲骨が浮く＝翼状肩甲（よくじょうけんこう））。

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 筋皮神経 ● | ● ア. 上腕三頭筋 |
| 2. 腋窩神経 ● | ● イ. 上腕二頭筋 |
| 3. 橈骨神経 ● | ● ウ. 前鋸筋 |
| 4. 正中神経 ● | ● エ. 広背筋 |
| 5. 尺骨神経 ● | ● オ. 母指球筋 |
| 6. 長胸神経 ● | ● カ. 骨間筋 |
| 7. 胸背神経 ● | ● キ. 三角筋 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：下垂手 ／ T1 ／ 鷲手 ／ 下垂足 ／ 外側上顆 ／ 内側上顆 ／ 手根管 ／ 猿手

- 腕神経叢は、C5～（ ）の前枝でできる。
- 橈骨神経が麻痺すると（ ）になる。
- 正中神経が麻痺すると（ ）になる。
- 尺骨神経が麻痺すると（ ）になる。
- 尺骨神経は、上腕骨の（ ）の後ろを通る。
- 正中神経は、手首で（ ）を通る。

ユニット⑧ 腰神経叢・仙骨神経叢・自律神経

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

神経（よみ）	通る所・出る所	主な支配筋	麻痺すると	覚え方・なぜ
大腿神経 （だいたいしんけい）	腰神経叢（L2～L4）。鼠径靱帯の下	大腿四頭筋・縫工筋・腸骨筋	膝が伸ばせない	
閉鎖神経 （へいさしんけい）	腰神経叢（L2～L4）。閉鎖孔	内転筋群	脚が閉じにくい	閉じる筋＝閉鎖神経
上殿・下殿神経 （じょうでん・かでん）	仙骨神経叢。梨状筋の上（上殿）・下（下殿）	上殿＝中殿筋・小殿筋／下殿＝大殿筋	上殿：トレンデレンブルグ徴候	片足立ちで反対の骨盤が下がる
坐骨神経 （ざこつしんけい）	仙骨神経叢（L4～S3）。梨状筋の下→太ももの後ろ	ハムストリングス	膝が曲げにくい	一番太い神経。膝の上で2本に
脛骨神経 （けいこつしんけい）	膝窩→ふくらはぎ→内果の後ろ（足根管）	下腿三頭筋・足の裏の筋	つま先立ちができない	
総腓骨神経 （そうひこつしんけい）	腓骨頭の下を回る（浅く傷つきやすい）	深・浅腓骨神経に分かれる	下垂足（かすいそく）＝尖足の形	足組みで圧迫。鶏歩（けいほ）
深腓骨神経 （しんひこつしんけい）	すねの前（前脛骨動脈と一緒に）	前脛骨筋など（つま先を上げる）	下垂足	
浅腓骨神経 （せんひこつしんけい）	すねの外側	長腓骨筋・短腓骨筋	足の外反ができない	
横隔神経 （おうかくしんけい）	頸神経叢（C3～C5、主にC4）	横隔膜	息が吸いにくい	C3・4・5で横隔膜

自律神経	交感神経（こうかんしんけい）	副交感神経（ふくこうかんしんけい）
出る所	胸髄・腰髄（胸腰部）	脳幹（Ⅲ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ）と仙髄（頭仙部）。仙髄からは骨盤内臓神経
ひとことで	戦う・逃げるモード	休む・食べるモード
心臓	速く・強く	ゆっくり
瞳・気管支	瞳を大きく・気管支を広げる	瞳を小さく・気管支を狭める
胃腸	動きを弱める	動きを強める
神経節の例	交感神経幹・腹腔神経節	翼口蓋神経節など（臓器の近く）

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 大腿神経 ● | ● ア. 前脛骨筋 |
| 2. 閉鎖神経 ● | ● イ. 横隔膜 |
| 3. 下殿神経 ● | ● ウ. 長・短腓骨筋 |
| 4. 脛骨神経 ● | ● エ. 内転筋群 |
| 5. 深腓骨神経 ● | ● オ. 大殿筋 |
| 6. 浅腓骨神経 ● | ● カ. 下腿三頭筋 |
| 7. 横隔神経 ● | ● キ. 大腿四頭筋 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：副交感神経 / 鷲手 / 仙髄 / 下垂足 / 総腓骨神経 / 交感神経 / 胸髄 / 頸髄

- 総腓骨神経が麻痺すると、つま先が垂れる（ ）になる。
- 坐骨神経は、膝の上で脛骨神経と（ ）に分かれる。
- 交感神経は、（ ）と腰髄から出る。
- 副交感神経は、脳幹と（ ）から出る。
- 心臓の動きを速くするのは（ ）。
- 胃腸の動きを強めるのは（ ）。

ユニット⑨ よく出るまとめ（脈管と神経）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

A. 右と左で違うもの

項目	右	左
反回神経がくぐる所	右鎖骨下動脈	大動脈弓（だから左の反回神経のほうが長い）
リンパの行き先	右リンパ本幹→右静脈角（右上半身だけ）	胸管→左静脈角（それ以外ぜんぶ）
腕頭動脈	ある	ない（左総頸・左鎖骨下は大動脈弓から直接）
腕頭静脈	ある	ある（左右に1本ずつ）
房室弁	三尖弁	僧帽弁（2尖）
精巣（卵巣）静脈の行き先	下大静脈	左腎静脈

B. 脈が触れる場所

動脈	触れる場所	動脈	触れる場所
浅側頭動脈	耳の前	上腕動脈	肘の内側（肘窩）
顔面動脈	下あごの縁	橈骨動脈	手首の親指側
総頸動脈	のど仏の横	大腿動脈	太ももの付け根
腋窩動脈	わきの下	膝窩動脈	ひざの後ろ
足背動脈	足の甲	後脛骨動脈	内果の後ろ
触れない	椎骨動脈・閉鎖動脈（深い所を通る）		

C. 神経の麻痺と手足の形

神経	麻痺すると	神経	麻痺すると
橈骨神経	下垂手（手首が垂れる）	総腓骨神経	下垂足（つま先が垂れる）
正中神経	猿手（親指のふくらみがやせる）	上殿神経	トレンデレンブルグ徴候
尺骨神経	鷲手（薬指・小指が曲がる）	長胸神経	翼状肩甲（肩甲骨が浮く）
腋窩神経	腕を横に上げられない	顔面神経	顔の片側が動かない

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 左の反回神経がくぐる ● | ● ア. 左静脈角 |
| 2. 右の反回神経がくぐる ● | ● イ. 左腎静脈 |
| 3. 胸管が注ぐ ● | ● ウ. 右鎖骨下動脈 |
| 4. 左の精巣静脈が注ぐ ● | ● エ. 椎骨動脈 |
| 5. 長胸神経の麻痺 ● | ● オ. 後脛骨動脈 |
| 6. 内果の後ろで触れる脈 ● | ● カ. 翼状肩甲 |
| 7. 体表から脈が触れない ● | ● キ. 大動脈弓 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：右リンパ本幹 / 尺骨神経 / 総腓骨神経 / 正中神経 / 左 / 腋窩神経 / 橈骨神経 / 右

- 腕頭動脈は（ ）側だけにある。
- 下垂手は（ ）の麻痺。
- 猿手は（ ）の麻痺。
- 鷲手は（ ）の麻痺。
- 下垂足は（ ）の麻痺。
- 右上半身のリンパは（ ）を通過して右静脈角へ。

解答（講師用）

ユニット	STEP2（線結び）	STEP3（語群）
① 心臓（部屋・弁・血液の流れ・刺激伝導系）	1-エ 2-ア 3-カ 4-イ 5-キ 6-オ 7-ウ	1) 肺動脈 2) 大動脈 3) 右心房 4) 僧帽弁 5) 大動脈弁 6) 房室結節
② 動脈①（大動脈弓・頭と首・腕）	1-エ 2-ア 3-オ 4-カ 5-ウ 6-キ 7-イ	1) 左鎖骨下動脈 2) 外頸動脈 3) 斜角筋隙 4) 尺骨動脈 5) 大後頭孔 6) 総頸動脈
③ 動脈②（おなか・脚）	1-カ 2-オ 3-エ 4-ウ 5-ア 6-キ 7-イ	1) 総腸骨動脈 2) 内腸骨動脈 3) 腹大動脈 4) 大腿神経 5) 下腹壁動脈 6) 大動脈裂孔
④ 静脈・リンパ・胎児循環	1-カ 2-オ 3-ア 4-キ 5-ウ 6-エ 7-イ	1) 大腿静脈 2) 膝窩静脈 3) 左静脈角 4) 臍動脈 5) 卵円窩 6) 肝臓
⑤ 中枢神経（大脳・間脳・小脳・脳幹・髄膜・脊髄）	1-オ 2-ウ 3-イ 4-ア 5-カ 6-キ 7-エ	1) ブローカ野 2) ウェルニッケ野 3) くも膜 4) くも膜下腔 5) 前角 6) 視床
⑥ 脳神経 12 対	1-オ 2-キ 3-カ 4-ウ 5-ク 6-イ 7-エ 8-ア	1) 外転神経 2) 4 3) 動眼神経 4) 舌咽神経 5) 迷走神経 6) 11
⑦ 腕神経叢（腕の神経と麻痺の手）	1-イ 2-キ 3-ア 4-オ 5-カ 6-ウ 7-エ	1) T1 2) 下垂手 3) 猿手 4) 鷲手 5) 内側上顆 6) 手根管
⑧ 腰神経叢・仙骨神経叢・自律神経	1-キ 2-エ 3-オ 4-カ 5-ア 6-ウ 7-イ	1) 下垂足 2) 総腓骨神経 3) 胸髄 4) 仙髄 5) 交感神経 6) 副交感神経
⑨ よく出るまとめ（脈管と神経）	1-キ 2-ウ 3-ア 4-イ 5-カ 6-オ 7-エ	1) 右 2) 橈骨神経 3) 正中神経 4) 尺骨神経 5) 総腓骨神経 6) 右リンパ本幹