

Coordonnées cartésiennes	1
Mouvement rectiligne	1
EC 1 : Accélération à 1 dimension (♦♦♦)	1
Exercice 1 : Balle sur plan incliné (♦♦♦)	3
EC 2 : Représentations d'un mouvement rectiligne (♦♦♦)	3
Exercice 2 : Analyse d'un graphe de vitesse (♦♦♦)	4
EC 3 : Analyse d'un graphe d'accélération (♦♦♦)	4
Exercice 3 : Mouvement rectiligne : équations horaires (♦♦♦)	4
EC 4 : Freinage d'une voiture (♦♦♦)	5
Exercice 4 : Distance de sécurité (♦♦♦)	5
Exercice 5 : Monte-charge (♦♦♦)	5
Mouvement parabolique	5
Exercice 6 : Propriété géométrique de la vitesse et l'accélération (♦♦♦)	5
EC 5 : Equations horaires d'une chute libre (♦♦♦)	6
Mouvement circulaire	6
EC 6 : Equations horaires d'un mouvement circulaire (♦♦♦)	6
Coordonnées polaires (2D) et cylindriques (3D)	6
EC 7 : Passage polaires cartésiennes (♦♦♦)	6
Vitesse et vitesse angulaire	7
EC 8 : Course circulaire (♦♦♦)	7
EC 9 : Rotation de la Terre (♦♦♦)	7
Exercice 7 : Scie circulaire (♦♦♦)	7
Accélération et accélération angulaire	7
Exercice 8 : Dragster (♦♦♦)	7
Exercice 9 : Entraînement des cosmonautes (♦♦♦)	8
EC 10 : Virage dangereux (♦♦♦)	8
Coordonnées polaires	9
EC 11 : Fourmi sur manège (♦♦♦)	9
EC 12 : Enfant sur manège (♦♦♦)	9
Coordonnées cylindriques	9
EC 13 : Introductions aux coordonnées cylindriques (♦♦♦)	9
Exercice 10 : Mouvement hélicoïdal (♦♦♦)	9
EC 14 : Mouvement sur un cône (♦♦♦)	10
Problèmes de cinématiques	10
Problèmes guidés	10
EC 15 : Lancer franc (♦♦♦)	10
Exercice 11 : Ouverture d'une porte de garage (♦♦♦)	10
Exercice 12 : Alice et la noix (♦♦♦)	11
EC 16 : Etude cinétique d'une grue (♦♦♦)	11
Exercice 13 : Petits chats (♦♦♦)	12
EC 17 : Poursuite de 4 chiens (♦♦♦)	13
Exercice 14 : Lancer franc suite (♦♦♦)	13
Problèmes non guidés	15
Exercice 15 : Sprint du 100 m (♦♦♦)	15
Exercice 16 : Sécurité routière (♦♦♦)	15
Exercice 17 : Mesure de la profondeur d'un puit 1 (♦♦♦)	15
Exercice 18 : Mesure de la profondeur d'un puit 2 (♦♦♦)	15
EC 18 : Saut à moto (♦♦♦)	16
Exercices d'annales	16

Coordonnées cartésiennes

Mouvement rectiligne

EC 1 : Accélération à 1 dimension (♦♦♦)



Dans cet exercice, un véhicule se déplace de plusieurs façons avec une trajectoire rectiligne. Pour chacun des mouvements, 5 représentations différentes sont données :

- Un diagramme stroboscopique (photos prises à intervalle de temps réguliers)
- Une courbe de la vitesse en fonction du temps



- Une description du mouvement
- Les vecteurs vitesses
- Les sens des vecteurs vitesses et accélération

En s'inspirant du premier cas, trouver les 4 représentations des 3 cas de mouvement restants.

1. Cas exemple.


Donnée : vecteurs vitesse. v_1 → v_2 → v_3 → v_4 →			
Courbe $v(t)$: 	Diagramme stroboscopique : 	Description : Déplacement dans le sens positif et accélération.	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: → $\vec{v}$ → $\vec{a}$

2. Cas à traiter 1


Donnée : Description : Le véhicule se déplace dans le sens négatif à vitesse constante.			
Courbe $v(t)$: 	Diagramme stroboscopique : 	Vecteurs vitesse : v_1 v_2 v_3 v_4	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$: → $\vec{v}$ → $\vec{a}$

3. Cas à traiter 2

Donnée : Diagramme stroboscopique 			
Courbe $v(t)$:	Description :	Vecteurs vitesse :	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$:



		v_1 v_2 v_3 v_4	$\vec{v}$ $\vec{a}$
---	--	----------------------------------	----------------------------

4. Cas à traiter 3

 Donnée : Courbe de $v(t)$:			
Description :	Diagramme stroboscopique.	Vecteurs vitesse :	Sens de $\vec{v}$ et $\vec{a}$:
		v_1 v_2 v_3 v_4	$\vec{v}$ $\vec{a}$

Exercice 1 : Balle sur plan incliné (♦♦♦)



Une balle monte puis descend sur un plan incliné, la figure ci-dessous montre un diagramme stroboscopique. Les instants sont identiques à la montée et à la descente.

	
Figure 1 - Montée	Figure 2 - Descente

Représenter pour les 8 cas le vecteur accélération de la balle selon l’axe O_x .

EC 2 : Représentations d’un mouvement rectiligne (♦♦♦)


On considère une balle qui monte puis descend le long d’un plan incliné. Dans le premier cas l’axe est dirigé vers le haut du plan incliné et dans le 2^{ème} cas il est dirigé vers le bas.

	
--	--

Dans chaque cas, tracer le graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération (supposée constante) en fonction du temps.

Exercice 2 : Analyse d'un graphe de vitesse (♦♦♦)

Lors d'un match de basket on enregistre la vitesse d'un joueur qui se déplace sur une trajectoire rectiligne.




1. Décrire le mouvement du joueur sur cet intervalle de temps.
2. Calculez la distance parcourue lors de cette séquence et à quelle distance il se trouve de son point d'origine après 7 s.

Rappel : La distance parcourue entre un instant t_a et t_b est donnée par $D = \int_{t_a}^{t_b} |v(t)| dt$

3. Que pouvez-vous dire dans ce graph aux points angulaires ?

EC 3 : Analyse d'un graphe d'accélération (♦♦♦)

On donne ci-dessous le graphe de l'accélération d'une balle le long d'une ligne droite. La balle est initialement au repos.



1. À quel instant la vitesse est-elle la plus grande ?
2. Comment reformuler de manière plus correcte la question précédente.
3. Donner une valeur à la vitesse de la question précédente.

Exercice 3 : Mouvement rectiligne : équations horaires (♦♦♦)

On s'intéresse à un mobile qui se déplace sur une trajectoire rectiligne. On se place en coordonnées cartésiennes, le mouvement se fait selon l'axe O_x donc seule la coordonnée x intervient.

1. Donner un exemple de mouvement rectiligne uniforme, puis proposer une équation horaire pour décrire un tel mouvement.
2. Donner un exemple de mouvement rectiligne uniformément accéléré, puis proposer une équation horaire pour décrire un tel mouvement.

3. Les équations horaires suivantes décrivent le mouvement d'un point M . Caractériser le mouvement (dire s'il est rectiligne ou non, uniforme ou non, donner ses vecteurs vitesse et accélération).

$$x(t) = 3t \quad ; \quad y(t) = -2t + 1$$

EC 4 : Freinage d'une voiture (♦♦♦)

Une voiture roule en ligne droite à 50 km/h . Elle freine brusquement jusqu'à l'arrêt total sur une distance $d = 15 \text{ m}$.

Question unique : Calculer l'accélération a supposée constante, puis tracer le graphique de la position en fonction du temps.

Aide :

1. Quelles sont les conditions initiales ?
2. Sachant que l'accélération est constante, déduire les expressions de $v(t)$ et de $x(t)$.
3. Déduire de l'expression de la vitesse, l'instant t_{stop} auquel la vitesse s'annule.
4. Exprimer puis calculer l'accélération à t_{stop} à partir de l'expression de la position.
5. Tracer le graphique de la position en fonction du temps.

Exercice 4 : Distance de sécurité (♦♦♦)

Sur route sèche on considère que le freinage d'urgence correspond à une accélération constante (négative)

$$a_0 = -10 \text{ m/s}^2$$

1. Après avoir indiqué les conditions initiales, exprimer la distance de freinage x_F et le temps de freinage t_F en fonction de la vitesse au moment du freinage notée v_0 .
2. Comparer les distances x_F et les temps t_F de freinage à 30 et 50 km/h en ville, et à 90 , 110 et 130 km/h sur autoroute.
3. En pratique on a un temps de réaction t_{reac} d'environ une seconde. En prenant cela en compte ajouter au tableau une colonne indiquant la distance totale parcourue D_{tot} .

Exercice 5 : Monte-charge (♦♦♦)

1. Un monte-charge à l'arrêt met $3,0 \text{ s}$ pour atteindre une vitesse $v_{\text{max}} = 1,2 \text{ m/s}$ avec un mouvement uniformément accéléré. Calculer l'accélération a de ce monte-charge ?
2. Quelle distance d parcourt-il pendant cette durée ? L'origine du repère étant le sol.
3. On suppose que sa vitesse est constante quand il a atteint $v_{\text{max}} = 1,2 \text{ m/s}$. Sachant qu'il ralentit avec l'accélération $-a$, à partir de quelle distance h (depuis le sol) doit-il entamer sa phase de décélération pour atteindre le 2^e étage situé à une hauteur $h_2 = 15,0 \text{ m}$. [Aidez-vous d'un schéma clair montrant l'évolution de v dans le temps]
4. Quelle elle est la durée de la montée des deux étages.
5. Avec les mêmes paramètres du mouvement, quelle serait la durée pour monter au 1^{er} étage situé à $h_1 = 7,50 \text{ m}$?
6. Quelle est l'équation horaire du mouvement $z(t)$ de la phase d'accélération de la descente si le monte-charge part du 2^e étage.


Mouvement parabolique

Exercice 6 : Propriété géométrique de la vitesse et l'accélération (♦♦♦)

Les coordonnées cartésiennes d'un point M sont :

$$x(t) = 20t \quad ; \quad y(t) = -4,9t^2 + 32t + 20$$

1. Laquelle des 3 trajectoires présentées ci-dessous correspond à celle du point M ? Justifier.



2. Quelles sont les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération pour $t = 0$?
3. Représentez ces vecteurs sur le graphique.
4. Qu'est-ce qui est remarquable pour ces vecteurs ?
5. Dans l'expression des coordonnées cartésiennes, le nombre 20 apparaît 2 fois, quelles sont la dimension et l'unité associées ?

EC 5 : Equations horaires d'une chute libre (♦♦♦)

On suppose un mobile dont l'accélération est donnée par le vecteur :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix}$$

On suppose qu'on connaît la position du point M au temps $t = 1$ s :

$$\overrightarrow{OM}(1\text{ s}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} ; \quad \vec{v}(1\text{ s}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1. Trouver les équations horaires. Les tracer sur un graphique en fonction du temps t .
2. En déduire l'équation de la trajectoire. La tracer sur un graphique.
3. Décrire le mouvement et la trajectoire.

Mouvement circulaire

EC 6 : Equations horaires d'un mouvement circulaire (♦♦♦)

Les équations horaires d'un point M sont $x(t) = 3\sin(2t)$; $y(t) = 3\cos(2t)$.

1. En quelles unités sont exprimés les nombres 3 et 2 ?
2. Montrer que $x^2(t) + y^2(t)$ est une constante que l'on déterminera. Quelle est son unité ?
3. En déduire la trajectoire suivie par M .
4. Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse et représenter ce dernier pour $t = 0$ (sans souci d'échelle)
5. Exprimer les coordonnées du vecteur accélération et représenter ce dernier pour $t = 0$ (sans souci d'échelle)
6. Que constate-t-on pour les propriétés géométriques des vecteurs vitesse et accélération ?

Coordonnées polaires (2D) et cylindriques (3D)

EC 7 : Passage polaires cartésiennes (♦♦♦)

On suppose qu'un point M est repéré par ses coordonnées polaires r, θ et cartésiennes x, y .

1. Exprimer les vecteurs de la base polaire dans la base cartésienne.
2. Que vaut le vecteur position en coordonnées polaires ? Et en coordonnées cartésienne ? En déduire une expression de x et y en fonction de r, θ grâce à la question précédente.
3. Retrouver l'expression du vecteur vitesse en coordonnées polaires.
4. En déduire l'expression de $\dot{x}$ et $\dot{y}$ en fonction de $r, \dot{r}, \theta, \dot{\theta}$.

Vitesse et vitesse angulaire

EC 8 : Course circulaire (♦♦♦)

Un enfant court à $7,2 \text{ km/h}$.

1. Combien fait-il de m/s ?
2. Il court sur une piste circulaire de rayon $r = 10 \text{ m}$. Calculer sa vitesse angulaire avec la relation $v = \theta r$.
3. Calculer la vitesse angulaire en passant par le périmètre et par le temps mis pour faire un tour. Comparer avec Q2 ?
4. Si $r = 20 \text{ m}$ quelle est la vitesse angulaire ? Commentez.

EC 9 : Rotation de la Terre (♦♦♦)

Le rayon de la Terre est $R_T = 6371 \text{ km}$.

1. Quelle distance (en m) parcourt un point de l'équateur en une journée ?
2. A quelle vitesse angulaire θ cela correspond-il ?
3. Par rapport à l'enfant qui court sur le cercle (exo « course circulaire »), c'est rapide ou c'est lent ?
4. Quelle est la vitesse v (en m/s) du point à l'équateur ?
5. Par rapport à l'enfant qui court sur le cercle (exo « course circulaire »), c'est rapide ou c'est lent ?
6. Y a-t-il contradiction entre les questions 3 et 5 ?

Exercice 7 : Scie circulaire (♦♦♦)

Une scie circulaire possède les caractéristiques suivantes :

- Diamètre 180 mm (du centre au bout des dents)
- Vitesse de rotation à vide : 3800 tours/min

1. Quelle est la vitesse angulaire ω à vide ?
2. Quelle est la vitesse d'une dent de la scie par rapport à la planche que l'on découpe ?
3. Combien de temps met la dent pour faire un tour ?

Accélération et accélération angulaire

Exercice 8 : Dragster (♦♦♦)

Un dragster est un véhicule de compétition dont l'objectif est de réaliser la plus grande accélération possible. L'épreuve de *Top fuel* est la plus prisée, il s'agit de parcourir le plus rapidement possible $1/4$ de mile (soit 402 m) départ arrêté. Les plus rapides mettent moins de $4,5 \text{ s}$. On va faire des calculs pour le record qui est de $3,58 \text{ s}$!

➔ Calculer l'accélération supposée constante pendant toute la course et la vitesse du dragster à l'arrivée.



Essayez de répondre à cette question sans plus d'information puis répondez à la question 5 ci-dessous. Si vous n'y parvenez pas à trouver l'accélération, suivez le raisonnement suivant.

1. Rappeler la définition de l'accélération en coordonnées cartésiennes.
2. On suppose que le mouvement est uniformément accéléré (cela signifie que l'accélération est constante). Intégrer deux fois la relation précédente pour en déduire l'équation horaire du mouvement.

- Déterminer la valeur numérique de l'accélération nécessaire pour atteindre les 402 m en 3,58 s. Comparer cette valeur à l'accélération de la pesanteur.
- En déduire la vitesse sur la ligne d'arrivée. Est-ce beaucoup ?
- Le record absolu sur le 1/4 de mile a été réalisé en juillet 1984 par l'Américain Sammy Miller avec un temps de 3,58 s et une vitesse de passage à 621 km/h. Comparer cette mesure au calcul précédent et apporter une réflexion critique.

Exercice 9 : Entraînement des cosmonautes (♦♦♦)

Pour habituer les cosmonautes aux accélérations subies au décollage des fusées, on soumet progressivement leur corps à une accélération obtenue par une centrifugeuse. C'est ce qu'on appelle le High-G training.

Un individu en bonne santé, mais non entraîné, perd connaissance à partir de 4 à 6 g (1 g = l'accélération de la pesanteur). Après entraînement, les cosmonautes parviennent à supporter 9 g pendant 1 min. Les manèges à sensations fortes (type montagnes russes) n'ont pas le droit de dépasser 3 g .

Remarque : la sensibilité du corps aux g dépend de l'orientation de l'accélération

([https://fr.wikipedia.org/wiki/G_\(acc%C3%A9l%C3%A9ration\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/G_(acc%C3%A9l%C3%A9ration))).



Centrifugeuse $R = 6,5 \text{ m}$

- Quelle doit être la vitesse angulaire (en tours par seconde) de la centrifugeuse en photo pour que le cosmonaute placé dans la cabine de test soit soumis à une accélération de 9,0 g ?
Si vous ne parvenez pas à répondre à la question, suivez le raisonnement ci-dessous.
 - Retrouver l'expression de l'accélération en coordonnées polaires si le rayon $r = R$ est constant.
 - On suppose que la centrifugeuse tourne à vitesse constante, répondre à la question.
- Combien de tours fait le cosmonaute pendant 1 min. Quelle est sa vitesse ?
- Lors d'une séance d'entraînement, le cosmonaute s'installe dans la centrifugeuse. Celle-ci démarre et la vitesse angulaire augmente jusqu'à atteindre la valeur calculée à la question précédente en une durée de 1 min 40 s. Que vaut l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ si on la suppose constante.

EC 10 : Virage dangereux (♦♦♦)

Avec un enfant à bord, les accélérations en voiture doivent être limitées. On considère que l'accélération maximale raisonnable est celle qui permet de passer de 0 à 100 $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$ en 10 s. On considère aussi que cette accélération est une valeur limite à ne pas dépasser latéralement (en virage).

- Quelle est la valeur de cette accélération ?

2. Quelle est la vitesse maximale d'une voiture qui emprunte un virage de rayon de courbure $R = 200 \text{ m}$ sur autoroute et 20 m en ville, à vitesse constante v_0 ?

Coordonnées polaires

EC 11 : Fourmi sur manège (♦♦♦)

Cet exercice considère le mouvement d'un point M d'un manège (une fourmi au repos sur un manège en mouvement par exemple). On suppose que ce point est à $R_0 = 5,0 \text{ m}$ de l'axe de rotation du manège.

1. Donner l'équation de la trajectoire du point M en coordonnées cartésiennes puis polaires.
 2. Choisir un système de coordonnées adapté au problème et justifier.
 3. On considère que le manège tourne à 3,0 tours par minute. Quelle est la vitesse angulaire $\dot{\theta}_0$?
 4. Retrouver l'expression générale de la vitesse en coordonnées polaires. Que devient cette expression dans ce cas ? Quelle est la valeur de la vitesse du point M ?
 5. Dédurre de la question précédente l'expression de l'accélération du point M . Donner sa valeur et sa direction.
 6. Pourquoi l'accélération n'est-elle pas nulle alors que la valeur de la vitesse est constante ?
- A la fin du tour de manège, l'opérateur ralentit la rotation jusqu'à l'arrêt final. Ce ralentissement est considéré comme uniforme et le manège met 40 s pour s'arrêter. On considère $t = 0$ quand le manège commence à ralentir.
7. Exprimer $\theta(t)$ et en déduire combien de tours le manège met-il pour s'arrêter.
 8. Donner l'expression de l'accélération du point M pendant la phase de décélération.
 9. Quelle est la valeur de l'accélération tangentielle ? A quoi correspond cette composante de l'accélération qui n'était pas présente pendant la phase uniforme du mouvement ?

EC 12 : Enfant sur manège (♦♦♦)

Un enfant se déplace sur un manège en rotation. Vu d'hélicoptère en position stationnaire dans le référentiel terrestre, la position de l'enfant est donnée en coordonnées polaires par : $r(t) = v_0 t$ et $\theta(t) = \omega_0 t$ où v_0 et ω_0 sont des constantes positives (on les appelle paramètres du mouvement).

1. Donner les unités de v_0 et ω_0 dans le système international.
2. Exprimer $\dot{\theta}$ en fonction des paramètres du mouvements.
3. Quelle est l'allure de la trajectoire dans le référentiel terrestre (vue de l'hélicoptère) ?
4. Exprimer la vitesse de l'enfant (en coordonnées polaires) en fonction de v_0 , ω_0 et du temps.
5. Exprimer l'accélération de l'enfant en coordonnées polaires.
6. Représenter cette accélération sur un schéma avec la trajectoire.
7. Quelle est la trajectoire de l'enfant dans le référentiel du manège si celui-ci tourne à la vitesse angulaire ω_0 .

Coordonnées cylindriques

EC 13 : Introductions aux coordonnées cylindriques (♦♦♦)

1. Quelle est l'expression du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base locale cylindrique ?
2. Exprimer les vecteurs de cette base locale dans la base fixe.
3. Exprimer la vitesse en coordonnées cylindriques.
4. En déduire l'expression de l'accélération.

Exercice 10 : Mouvement hélicoïdal (♦♦♦)

Un point M se déplace sur une courbe définie par $r(t) = R$; $\theta(t) = \omega t$; $z(t) = v_0 t$ où R, ω, v_0 sont des constantes.

1. Donner l'expression du vecteur position dans la base locale des coordonnées cylindriques.
2. Donner l'expression du vecteur vitesse. Calculer sa norme et commenter.
3. De même pour le vecteur accélération. Commenter.
4. Au vu des paramètres, quelle est la trajectoire selon vous ?

EC 14 : Mouvement sur un cône (♦♦♦)

Un point M se déplace sur une courbe définie par $r(t) = v_0 t$; $\theta(t) = \omega t$; $z(t) = v_0 t$ où ω, v_0 sont des constantes.

1. Donner l'expression du vecteur position dans la base locale des coordonnées cylindriques.
2. Donner l'expression du vecteur vitesse. Calculer sa norme et commenter.
3. De même pour le vecteur accélération. Commenter.
4. Au vu des paramètres, quelle est la trajectoire selon vous ?
- 5.

Problèmes de cinématiques

► Exercices plus complets pour vous aider à réviser les interros, les DS et les partiels. Ce sont ces exercices qu'il faut savoir traiter.

Problèmes guidés


EC 15 : Lancer franc (♦♦♦)

Au basket, le lancer franc se fait à 15 *pieds* du panier, lui-même à 10 *pieds* de haut. (1 *pied* = 30,5 cm). Le joueur doit viser droit et trouver le bon angle en fonction de la vitesse de son lancer.

On considère que le ballon est initialement tenu à $h = 2m20$ de haut.


On considère que le ballon est soumis en permanence à une accélération de $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ vers le bas.

1. Exprimer l'angle de lancer α en fonction de la vitesse initiale v_0 pour réussir un swish (lancer réussi sans toucher la planche).
2. Quelle est la vitesse initiale pour un tir à 30° ? Application numérique.



Exercice 11 : Ouverture d'une porte de garage (♦♦♦)

On considère une porte de garage qui s'ouvre en maintenant sa longueur fixe. De plus le point A reste en $x_A = 0$ et le point B reste en $y_B = H$. Les points A et B avancent à vitesses constantes v_A et v_B .



1. Quelle est la longueur AB ?
2. Exprimez la coordonnée y_A en fonction de H et x_B
3. Exprimer les quantités $\frac{dy_A}{dx_B}$ et $\frac{dx_B}{dt}$. Vérifier par analyse dimensionnelle que l'expression trouvée pour $\frac{dy_A}{dx_B}$ est homogène.

4. Calculez $v_A = \frac{dy_A}{dt}$. Aide : $\frac{dy_A}{dt} = \frac{dy_A}{dx_B} \times \frac{dx_B}{dt}$ c'est la dérivée de la fonction composée $y_A(x_B(t))$.
5. Exprimer $x_B(t)$.
6. En déduire $y_A(t)$ et $v_A(t)$.
7. Combien de temps met la porte pour s'ouvrir ?

Exercice 12 : Alice et la noix (♦♦♦)

Alice marche sur une route rectiligne à vitesse constante $v_A = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Elle passe par le point de coordonnée $x = 0$ au temps $t_0 = 0$. Un corbeau posé sur un fil lâche une noix au temps t_1 d'une hauteur H à la position $x = D$, sans vitesse initiale. On suppose que la noix est soumise à une accélération dirigée vers le bas de norme $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1. Faire un schéma de la situation à t_0 qui pose les notations. On notera $\vec{U}_x$ et $\vec{U}_y$ les vecteurs de la base du repère.
2. Exprimer la position $x_A(t)$ d'Alice en fonction du temps.
3. Quelle est la position $x_N(t)$ de la noix ? Écrire les équations horaires $x_N(t)$ et $y_N(t)$ de la noix. (Attention aux constantes d'intégrations !)
4. On suppose que Alice attrape la noix en levant la main à une hauteur h .
 - (a) Écrire les conditions sur y_N et x_A pour que Alice attrape la noix.
 - (b) En déduire le temps t_A auquel Alice remplit sa condition et le temps t_N auquel la noix remplit sa condition.
 - (c) En déduire le temps t_1 auquel la noix doit être lâchée pour que Alice puisse l'attraper.
5. Quelle doit être la distance D pour que $t_1 = t_0 = 0$?

Alice ne veut pas attraper la noix, mais lancer une balle pour la pousser. Quand elle arrive à $D/2$ elle lance une balle d'une hauteur h' avec la vitesse $\vec{v}_B$ formant un angle α avec l'horizontale. La balle n'est soumise qu'à une accélération verticale vers le bas de norme g .

6. Faire un schéma. Écrire les équations horaires de la balle $x_B(t)$ et $y_B(t)$. (Attention la balle ne part pas à $t = 0$!)
7. Écrire les conditions pour que la balle touche la noix. En déduire le temps t_{impact} où l'impact a lieu.

EC 16 : Etude cinétique d'une grue (♦♦♦)

Une grue possède trois moteurs :


- Le moteur M_1 permet de soulever ou de redescendre des charges.
- Le moteur M_2 permet de rapprocher ou d'éloigner les charges.
- Le moteur M_3 permet de faire tourner les charges.
- Les moteurs tournent à vitesse constante (modes avant/arrière/stop)
- La flèche fait $R = 10 \text{ m}$ de long.

1. Faire un schéma, on prendra le 0 de l'axe O_z au niveau du sol.
2. Quel système de coordonnées permet de décrire le déplacement de la charge quand les différents moteurs sont en marche. Justifier la réponse.
3. Le grutier fait marcher M_1 uniquement pendant 15 s ce qui fait monter la charge de 30 m. Décrire le mouvement de cette charge considérée comme ponctuelle. (Décrire le mouvement, c'est donner l'équation horaire, la vitesse et l'accélération et nommer sa trajectoire).
4. La charge est à 10 m du sol, au bout de la flèche. Le grutier active le moteur M_2 pendant 5 s. La charge se déplace de 8 m. Décrire le mouvement.

5. Le moteur M_3 est maintenant activé, M_1 et M_2 étant à l'arrêt. La grue fait alors $1/4$ de tour en 6 secondes. Décrire ce mouvement.
6. Une charge est au sol à la verticale de la flèche de la grue. Le grutier veut rapprocher cette charge au pied de la grue (sans la faire tourner). Soit un déplacement de 10 m .
 - a. Quels moteurs faire fonctionner ?
 - b. Est-il possible d'effectuer ce déplacement en faisant fonctionner deux moteurs en permanence pendant le mouvement ?
 - c. Quelle sera la trajectoire du mobile si les deux moteurs fonctionnent en même temps ? (Donner les équations horaires et la trajectoire)
 - d. En combien de temps ce déplacement est-il effectué ?
 - e. Quelle est la vitesse de la charge pendant ce déplacement ?
7. La charge est à nouveau au sol à la verticale de la flèche. Le grutier fait fonctionner en même temps les 3 moteurs.
 - a. Donner les équations horaires du mouvement dans le référentiel terrestre.
 - b. Quelle est l'expression du vecteur vitesse en coordonnées cylindriques ?
 - c. Quelle est la vitesse de la charge au bout de 1 s .
 - d. Quelle est l'expression du vecteur accélération en coordonnées cylindriques ?
 - e. Au bout de 1 s , quelle est la valeur de l'accélération, et comment est-elle orientée.

Exercice 13 : Petits chats (♦♦♦)

Deux chats se déplacent à vitesse constantes v_1 et v_2 sur des axes orthogonaux O_x et O_y sécants en O . À l'instant initial le premier chat se trouve en $-x_0$ et se dirige vers le point O où se situe le second chat.



1. Déterminer l'instant t_{min} où la distance D entre les deux chats est minimale. Que vaut cette distance D_{min} ?
- On suppose maintenant que le chat se déplaçant sur l'axe O_y décélère uniformément avec une accélération constante a_2 (il freine puis repart dans l'autre direction).
2. Établir l'expression de la distance entre les chats en fonction du temps.
 3. On suppose que les chats se rencontrent à l'instant t_R . Trouver une condition liant v_1, v_2, a_2, x_0 pour que cette rencontre soit possible.

EC 17 : Poursuite de 4 chiens (♦♦♦)


Une courbe de poursuite est la trajectoire suivie par un 1^{er} point (appelé poursuivant) qui se dirige à vitesse constante vers un 2^e point (appelé poursuivi). Le point poursuivi est lui-même en mouvement. La courbe de poursuite étudiée ici est figurée par 4 chiens, initialement au sommet d'un carré, chacun se déplaçant vers un autre chien. Chaque chien est donc poursuivant et poursuivi.



1. Reproduire la figure ci-dessus en remplaçant les chiens par des points.
2. On s'intéresse au chien qui est en haut à droite. Représenter :
 - r et θ .
 - La base locale
 - Le vecteur vitesse $\vec{v}$ du chien.
3. Quel est l'angle β entre $\vec{U}_\theta$ et $\vec{v}$?
4. En déduire la décomposition de $\vec{v}$ dans la base locale (attention aux signes).
5. Identifier cette décomposition de $\vec{v}$ avec l'expression générale de la vitesse en coordonnées polaires pour en déduire les équations différentielles du mouvement.
6. Intégrer celle qui exprime $\dot{r}$ et en déduire l'équation horaire suivant r . (Déduire la constante d'intégration des conditions initiales choisies ; on pose R_0 la valeur initiale de r).
7. Reporter cette équation horaire dans la 2^e équation différentielle et en déduire une nouvelle équation différentielle avec seulement θ et le temps. L'intégrer. Déterminer la constante d'intégration pour le chien dont $\theta_0 = 0$ et en déduire que son équation du mouvement est
$$\theta = -\ln\left(1 - \frac{v_0 t}{R_0 \sqrt{2}}\right)$$
8. En déduire les équations horaires des 3 autres chiens.
9. Utiliser l'une ou l'autre des 2 équations horaires, pour trouver la durée de la poursuite, notée t_{max} .
10. Pour trouver le nombre de tours que fait un chien, chercher la limite de θ quand t tend vers t_{max} .
11. Pour trouver distance parcourue par un chien, utiliser le fait qu'elle se fait à vitesse constante et qu'on connaît t_{max} .
12. Tracer la trajectoire des chiens à l'aide d'un tableur. Voir le TP numérique si besoin.

Exercice 14 : Lancer franc suite (♦♦♦)

On se place dans le cadre de l'exercice « Lancer franc », il faut donc l'avoir fait avant de traiter celui-ci. On rappelle ci-dessous le schéma de cet exercice.




On suppose qu'on est arrivé à trouver l'équation de la trajectoire dans le cas où le ballon passe par le centre du panier : $H = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} d^2 + \tan(\alpha) d + h$.

1. On veut savoir s'il y a un angle de lancer limite.
 - a. Sans faire de calcul, quel est l'angle limite supérieur, peu importe la vitesse v_0 ?
 - b. Toujours sans calcul, quel est l'angle limite inférieur ? (Supposez que $v_0 = \infty$, quelle est la trajectoire ? On suppose que le panier ne gêne pas le tir, il est ponctuel.)
 - c. On appelle θ cet angle limite inférieur. Avec un peu de géométrie, exprimer $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$, $\tan(\theta)$ en fonction de d, H, h . On pourra poser $R = \sqrt{d^2 + (H - h)^2}$.
 - d. On rappelle que $2 \cos^2(x) = \cos(2x) + 1$ et $2 \cos(x) \sin(x) = \sin(2x)$. Montrer que l'équation de la trajectoire se met sous la forme $v_0^2 R \left[\frac{d}{R} \sin(2\alpha) - \frac{(H-h)}{R} \cos(2\alpha) - \frac{H-h}{R} \right] = gd^2$.
 - e. Utiliser vos résultats aux questions précédentes et le fait que $\sin(a - b) = \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a)$ pour mettre l'équation précédente sous la forme :

$$v_0^2 R [\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta)] = gd^2$$
 - f. En déduire un angle critique α_c . Est-ce que cette condition est réaliste ?
 - g. Faire l'application numérique. (Rappel : $d = 4,58 \text{ m}$, $H = 3,05 \text{ m}$, $h = 2,20 \text{ m}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$).
2. On veut maintenant savoir s'il y a un angle optimum, c'est-à-dire qui minimise la vitesse à donner au ballon.
 - a. Montrer qu'on peut écrire :

$$v_0(\alpha) = \sqrt{\frac{gd^2/R}{\sin(2\alpha - \theta) - \sin(\theta)}}$$

- b. Pour quelle valeur de α (appelons la α_{min}) la fonction $v_0(\alpha)$ admet-elle un minimum ? (Seule α est la variable, quand-est-ce que $\sin(2\alpha - \theta)$ est maximum) ?
 - c. Faire l'application numérique pour α_{min} .
 - d. Faire l'application numérique pour $v_{0,min}$.
3. On veut modéliser le fait que le ballon ne soit pas un point. On considère que le ballon a un diamètre $D = 20 \text{ cm}$ et l'arceau un diamètre $D_a = 45 \text{ cm}$.
 - a. Exprimer le vecteur vitesse à l'instant t_P où il rentre dans le panier.
 - b. On appelle β l'angle que fait le vecteur vitesse $\vec{v}(t_P)$ avec l'horizontale. Exprimer $\tan(\beta)$ en fonction de v_x et v_y les projections de $\vec{v}(t_P)$ sur les axes O_x et O_y .
 - c. En déduire une expression de β en fonction de v_0, α, d, g . Faire l'application numérique pour $\alpha = \alpha_{min}$ et $v_0 = v_{0,min}$.
 - d. Aidez-vous du schéma ci-contre pour montrer que $\beta \geq \arcsin(D/D_a)$. Faire l'application numérique.



Le ballon arrive dans l'arceau avec le vecteur vitesse $\vec{v}(t_P)$. Ce vecteur fait un angle β avec l'horizontale, qu'on peut retrouver au niveau de l'arceau avec le théorème des droites alternes internes.

4. D'après les questions précédentes, un tir à la vitesse minimum $v_{0,min}$ permet-il de réussir un swish si on ne considère pas le ballon comme un point ?

Problèmes non guidés

Exercice 15 : Sprint du 100 m (♦♦♦)

Deux athlètes courent le 100 m en 10 s. L'un pense que sa vitesse est constante et l'autre que son accélération est constante. Lequel se surestime ?

Exercice 16 : Sécurité routière (♦♦♦)

Vous êtes responsable de la sécurité routière d'une grande ville dans laquelle passe une autoroute ($v = 130 \text{ km.h}^{-1}$), une nationale $v = 90 \text{ km.h}^{-1}$ et des routes de villes ($v = 50 \text{ km.h}^{-1}$).


Quelles distances de sécurité préconisez-vous entre deux véhicules sur ces différentes routes sachant que la décélération moyenne d'une voiture est de 6 m.s^{-2} et que le temps de réaction est de 1 s ?

On prendra les deux cas pour la distance de sécurité :

1. Si la voiture de devant freine subitement
2. Si la voiture de devant s'arrête instantanément car elle percute un obstacle.

Il vaut donc mieux prévoir une distance de sécurité de d_{tot} dans les deux cas. C'est cohérent avec les recommandations de sécurité routière :

Respectez les distances de sécurité



Exercice 17 : Mesure de la profondeur d'un puit 1 (♦♦♦)

On lâche un caillou dans un puits au moment où l'on déclenche un chronomètre. On arrête le chronomètre quand on entend « plouf ».

On suppose que le son se propage à vitesse infinie (on néglige sa propagation).

Le mouvement du caillou est rectiligne et son accélération est vers le bas, de norme $g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$.

Déduire du temps mesuré la profondeur du puits. Sachant que le « plouf » est entendu 2,5 s après le lâché.

Exercice 18 : Mesure de la profondeur d'un puit 2 (♦♦♦)

Même énoncé mais on ne néglige pas la propagation du son : $V = 340 \text{ m/s}$.

Aide : Exprimer le temps donné par le chronomètre comme la somme du temps que met le caillou pour descendre additionné du temps que met le son pour remonter.

EC 18 : Saut à moto (♦♦♦)

Un motard réalise le saut ci-dessous et retombe à 23 m de l'extrémité du tremplin sur une bosse qui fait la même hauteur que le tremplin.



Saut à moto, le motard retombe sur une bosse qui fait la hauteur du tremplin. On peut estimer à partir des images que l'angle du tremplin est $\alpha = 30^\circ$

Le mouvement possède une accélération verticale vers le bas de norme $g = 9,81 \text{ ms}^{-2}$. Déterminer la durée du saut, sa hauteur et la vitesse que doit atteindre le motard en sorti de tremplin.

Exercices d'annales

► Aller voir les annales sur Moodle pour vous entraîner !