

CURSO: 1º FAR PRIMEROS AUXILIOS: 3ª EVALUACIÓN-PARTE TEÓRICA

INSTRUCCIONES:

El examen constará de una parte teórica y otra práctica.

Sólo se corregirá la parte práctica a los que aprueben la teórica.

El tiempo estará ajustado al examen

El examen no se podrá imprimir.

Se elaborará en un folio en blanco la hoja de respuestas **a mano**, con letra clara, legible y con bolígrafo azul o negro. En dicha hoja deberá constar:

APELLIDOS Y NOMBRE

GRUPO-MODULO-EVALUACIÓN-PARTE (TEÓRICA O PRÁCTICA)

RESPUESTAS

FECHA Y FIRMA (al final, debajo de las respuestas)

La hoja de respuestas se escaneará o se fotografiará y se enviará a nuestro correo habitual, dentro del plazo horario marcado.

En el archivo se deberá poner (por este orden): **nombre-moduloexamen** teórico (o práctico, según corresponda)

NO SE ADMITIRÁN EXÁMENES FUERA DE HORA.

El examen estará suspenso si:

No se obtiene puntuación suficiente para aprobar (nº de respuestas correctas insuficiente o demasiadas respuestas incorrectas que resten puntos)

La hoja de respuestas no es claramente legible no se envía o se envía pasada la hora establecida

El archivo o la propia hoja de respuestas carecen de los datos requeridos (nombre, módulo, etc)

Se ha copiado de un compañero

No se envía dentro del horario estipulado

FORMA DE CALIFICAR

- ❖ **EN LAS PREGUNTAS TEST EXISTE UNA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA. VALEN 1 PUNTO SI ESTÁN BIEN CONTESTADAS Y DESCUENTAN 0.25 PUNTOS SI ESTÁN MAL CONTESTADAS. EN BLANCO NO PUNTÚAN NI DESCUENTAN.**
- ❖ **LAS PREGUNTAS DE RESPUESTA ABIERTA VALEN 1,5 PUNTOS SI ESTÁN BIEN CONTESTADAS Y DESCUENTAN 0,3 PUNTOS POR CADA ERROR.**
- ❖ **PARA APROBAR ES NECESARIO OBTENER UN MÍNIMO DE 10 PUNTOS**
- ❖ **PARA APROBAR LA EVALUACIÓN ES NECESARIO APROBAR TANTO LA PARTE TEÓRICA COMO LA PARTE PRÁCTICA**

PREGUNTAS

1. Señala la respuesta correcta. Las lesiones más graves por una corriente eléctrica se producen cuando esta circula desde la:
 - a. Mano a la cabeza.
 - b. Mano izquierda al pie derecho
 - c. Mano derecha al pie derecho
 - d. Mano izquierda al pie izquierdo
2. Ante un cuadro de deshidratación se debe dar de beber a la víctima
 - a. Inmediatamente para que se rehidrate
 - b. Sólo si está consciente y orientada
 - c. Nunca se le debe dar de beber a un accidentado
 - d. Sólo después de que coma algo para reponerse
3. Según la regla de Wallace, una persona con la parte delantera de la pierna derecha quemada tendrá una superficie corporal afectada equivalente al:
 - a. 36 %
 - b. 18 %
 - c. 9 %
 - d. 4,5 %
4. Una quemadura de 3º grado que afecten al 2% de la SC se considera
 - a. Leve
 - b. Moderada
 - c. Grave
 - d. Muy grave
5. No se incluyen dentro de las lesiones producidas por una exposición al calor:
 - a. Insolación
 - b. Golpe de calor
 - c. Deshidratación
 - d. Hidrocución
6. Cuando la temperatura de una persona desciende por debajo de los 35°C y los mecanismos que tiene el cuerpo para evitar la pérdida de calor comienzan a fallar hablamos de
 - a. Síncope
 - b. IAM
 - c. Hipotermia
 - d. Electrocutación
7. En una quemadura de tercer grado, no se debe nunca:
 - a. Cubrir la zona quemada.
 - b. Mojar a la víctima
 - c. Tapar a la víctima
 - d. Controlar las constantes vitales
8. En la atención de una crisis epiléptica se debe
 - a. Sujetar al que la sufre para que no se golpee
 - b. Introducirle algo en la boca para que no se trague la lengua
 - c. Colocar al enfermo en PLS cuando finalice la crisis
 - d. Todas son correctas
9. . Pueden ser signos y síntomas del ACV:
 - a. Debilidad o pérdida del movimiento de algún miembro o de la cara
 - b. Confusión y cefalea aguda y violenta
 - c. Son ciertas a. y b.
 - d. Todas son incorrectas
10. Un paciente con dolor en la zona precordial, que remite con el reposo, podría tener:
 - a. Angina de pecho
 - b. Infarto de miocardio
 - c. Lipotimia
 - d. Ninguna de las patologías anteriores
11. Ante una persona que haya sufrido una lipotimia debemos
 - a. Aflojarle la ropa y todo lo que le pueda oprimir.
 - b. Colocarla en decúbito supino con las piernas elevadas
 - c. Si está inconsciente, colocarla en PLS
 - d. Todas las anteriores
12. Ante una persona que está sufriendo un IAM pero está consciente debemos
 - a. Iniciar RCP
 - b. Sentarla con la espalda apoyada y las piernas flexionadas
 - c. Colocarla en decúbito supino con las piernas elevadas
 - d. Darle algo de beber

13. ¿En qué caso se coloca al accidentado con los pies más bajos que la cabeza?
 - a. Infarto de miocardio
 - b. Shock.
 - c. Lipotimia.
 - d. Síncope
14. A pesar de que hayan transcurrido más de diez minutos tras haberse dado una PCR como consecuencia de una intoxicación por fármacos, se recomienda iniciar RCP, en el caso de:
 - a. Ibuprofeno
 - b. Benzodiacepinas
 - c. Barbitúricos
 - d. Antidepresivos
15. Según el protocolo de actuación, en un síncope, ¿en qué posición debemos colocar a la persona afectada?
16. Explica brevemente la diferencia entre una congelación local y una hipotermia
17. Enumera cuatro síntomas/signos que nos hagan sospechar que alguien está sufriendo un ACV
18. Con respecto al parto, ¿qué es la “presentación”? (pon un ejemplo) y ¿qué significa que un parto es distócico?