

¿Como funciona etanercept?

Actúa reduciendo la inflamación asociada a la artritis reumatoide y otras enfermedades

¿Qué dosis debo tomar?

- La dosis habitual es:
 - 25 mg dos veces a la semana
 - 50 mg administrados una vez a la semana
- Su medico puede recetar una dosis y frecuencia diferentes.

¿Qué efectos adversos puedo tener? Muy frecuentes (más de 1 de cada 10 personas)

- Infecciones (incluyendo resfriado, sinusitis, bronquitis, infecciones del tracto urinario e infecciones de la piel);
- Reacciones en el lugar de inyección (incluyendo hemorragia, hematoma, enrojecimiento, picor, dolor e hinchazón)
- Dolor de cabeza.

Frecuentes (hasta 1 de cada 10 personas):

- Fiebre
- Erupción
- Picores

¿Cómo debo conservar etanercept?

Etanercept debe conservarse en nevera, entre 2°C y 8°C, y no se debe congelar

HOSPITAL VILLAVERDE

**C. de la Alianza, 20
28041 Madrid
917 23 91 81**

**SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITALARIA
VILLAVERDE**

ETANERCEPT



**MEDICAMENTO PARA
LA ARTRITIS
REUMATOIDE**

¿Qué hago si olvido una dosis?

Si se le olvida una dosis, deberá inyectarla tan pronto como lo recuerde, a no ser que la próxima dosis esté programada para el día siguiente, en cuyo caso deberá omitir la dosis olvidada.

A continuación, continúe inyectando el medicamento en el(los) día(s) habitual(es).

Si no lo recuerda hasta el día en que debe administrarse la dosis siguiente, no se inyecte una dosis doble (dos dosis en el mismo día) para compensar la dosis olvidada.

¿Si interrumpe el tratamiento con Enbrel?

Sus síntomas pueden volver tras la interrupción del tratamiento.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso comuníquelo a su médico, farmacéutico o en el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es.

¿Cómo debería tomar etanercept?

Enbrel se administra mediante una inyección bajo la piel (mediante inyección subcutánea).

1 Paso 1: Prepararse para una inyección

1. Seleccione una superficie de trabajo plana, limpia y bien iluminada.
2. Saque el envase de Etanercept de la nevera y colóquelo en la superficie.
3. Saque del envase una jeringa y una toallita con alcohol.
4. Espere a que la jeringa alcance la temperatura ambiente (15-30 min.).
5. Lávese las manos con jabón y agua caliente.
6. Compruebe el estado del medicamento: debe ser transparente o ligeramente opaca, incolora o de un color amarillo pálido o marrón pálido, y puede contener pequeñas partículas blancas o casi transparentes.

2 Paso 2: Elegir un lugar de inyección

Se recomienda inyectar Etanercept en (Figura 1):

1. Parte delantera de los muslos
2. Estómago, excepto en un área de 5 cm alrededor del ombligo
3. Parte exterior superior del brazo.
4. Debe utilizarse un lugar diferente para cada nueva inyección.

3 Paso 3: Inyectar la solución de Etanercept

1. Limpie el lugar de inyección con la toallita con alcohol. NO vuelva a tocar esta área.
2. Tome la jeringa precargada. Retire el capuchón de la aguja (Figura 2).
3. Cuando el área de piel limpiada se haya secado, pellízquela y sujétela firmemente con una mano.
4. Con la otra mano, sujete la jeringa como un lápiz.

5. Con un movimiento, rápido y corto, empuje la aguja hasta el final, penetrando la piel con un ángulo entre 45° y 90° (Figura 3).
6. Cuando la aguja esté completamente insertada dentro de la piel, suelte la piel que está sujetando.
7. Con la mano libre, sujete la aguja cerca de su base para estabilizarla.
8. Empuje el émbolo para inyectar toda la solución a una velocidad lenta y mantenida (ver Figura 4).
9. Cuando la jeringa esté vacía, extraiga la aguja de la piel manteniendo el mismo ángulo con el que la insertó.
10. Puede producirse un ligero sangrado en el lugar de inyección. Usted puede presionar con un algodón o con una gasa sobre el lugar de inyección durante 10 segundos. No friccione el lugar de inyección. Si fuera necesario, puede cubrir el lugar de inyección con un vendaje.

4 Paso 4: Eliminación de los materiales

La aguja NUNCA debe reutilizarse. NUNCA cubra de nuevo una aguja. Elimine la aguja y la jeringa siguiendo las instrucciones que le hayan dado.

