Buổi 4 (SAI LỆCH & TÁC ĐỘNG): Phiếu bài tập

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *#ClearDataClearImpact* · Tuần 4 · Thứ Bảy 21/11/2026 · trực tuyến, 19:30–22:30

Họ và tên: _____ **Khoa/Phòng:** _____

Gõ câu trả lời vào tệp Word, hoặc in bản PDF. Chuẩn bị sẵn bút, giấy và máy tính bỏ túi (hoặc điện thoại). Chỉ cần phép chia đơn giản.

Phần	Nhiệm vụ	Khi nào
A	Gọi tên sai lệch chính trong 4 tình huống, và một cách để giảm	Cuối phần 4.1
B	Nhiễu hay thay đổi tác động? (3 tình huống)	Ở nhà (không bắt buộc)
C	Hai phép tính bảng 2x2	Sau giờ nghỉ
D	PPV ở hai bối cảnh	Ở nhà (không bắt buộc)
E	Đọc biểu đồ rừng và chọn công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch	Cuối phần 4.3
F	Xây dựng đề cương 4: viết nháp mục 2.4 đến 2.6 của đề cương	Trên lớp, cuối buổi. Phần còn lại: ở nhà

Phần C và E còn có **thực hành thêm** (tự học) cho sau buổi.

Câu hỏi xuyên suốt: ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, chiến lược hạn chế dịch, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm tử vong 28 ngày không?

Chữ viết tắt: ICU = khoa hồi sức tích cực, KTC = khoảng tin cậy (CI), RCT = thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, RR = nguy cơ tương đối, RD = hiệu số nguy cơ, NNT = số người cần điều trị, OR = tỷ số chênh, PPV và NPV = giá trị tiên đoán dương và âm.

Phần A: Phát hiện sai lệch

Nhiệm vụ. Với mỗi tình huống, ghi sai lệch chính (chọn trong danh sách) và một cách thực tế để giảm sai lệch đó. Bạn sẽ bình chọn sai lệch trong buổi học, nên hãy chuẩn bị sẵn câu trả lời.

> **Chọn trong:** sai lệch chọn lựa · sai lệch nhớ lại · sai lệch người quan sát · nhiễu

#	Tình huống	Sai lệch chính	Một cách để giảm
1	Trong một nghiên cứu bệnh–chứng, gia đình của người bệnh tử vong do sepsis nhớ những ngày trước khi vào ICU chi tiết hơn gia đình của người sống sót.		
2	Trong một thử nghiệm không làm mù về hạn chế dịch, bác sĩ biết người bệnh thuộc nhóm nào là người quyết định khi nào người bệnh "đủ điều kiện ra khỏi ICU".		
3	Một nghiên cứu về cân bằng dịch và tử vong chỉ đưa vào những người bệnh nằm ICU từ 3 ngày trở lên.		
4	Trong một sổ đăng ký, người bệnh có lactate cao hơn được truyền nhiều dịch hơn và cũng tử vong nhiều hơn. Tác giả kết luận rằng dịch truyền làm tăng tử vong.		

Phần B: Nhiễu hay thay đổi tác động? (bài về nhà, không bắt buộc)

Nhiệm vụ. Mỗi nghiên cứu chia kết quả theo một yếu tố thứ ba. So sánh các tầng **với nhau** và **với kết quả chung (thô)**. Ghi câu trả lời của bạn và điều tác giả nên báo cáo.

> **Chọn trong:** nhiễu · thay đổi tác động (tương tác) · không phải cả hai
>
> Quy tắc nhanh: các tầng giống nhau nhưng khác kết quả thô là nhiễu. Các tầng khác nhau là thay đổi tác động.

#	Nghiên cứu (giả định)	RR chung	Tầng 1	Tầng 2	Câu trả lời	Nên báo cáo gì
1	Thuốc vận mạch X so với Y trong sốc nhiễm khuẩn và tử vong trước ngày 28. Bác sĩ chọn X chủ yếu cho người bệnh có lactate cao.	1.80	lactate dưới 4: RR 1.00	lactate từ 4 trở lên: RR 1.00		
2	Hạn chế dịch so với thường quy và tử vong trước ngày 28	0.70	dưới 65 tuổi: RR 0.50	từ 65 tuổi trở lên: RR 0.95		
3	Quy trình ghi chép do điều dưỡng thực hiện và phiếu theo dõi dịch không đầy đủ	0.80	ca ngày: RR 0.80	ca đêm: RR 0.79		

Phần C: Hai phép tính bảng 2x2

Nhiệm vụ. Tự làm cả hai phép tính. Với mỗi phép tính, điền bảng 2x2, trả lời các câu hỏi và viết kết quả bằng **một câu** mà một đồng nghiệp chưa học nghiên cứu cũng hiểu. Chuẩn bị chia sẻ câu trả lời khi giảng viên mời.

- Vẽ bảng theo cách này: phơi nhiễm (hoặc điều trị) theo **hàng**, nhóm phơi nhiễm hoặc được điều trị ở trên. Kết cục theo **cột**, "có kết cục" ở bên trái.
- Làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Nhắc lại

Chỉ số	Công thức (từ bảng a, b, c, d)
Nguy cơ ở nhóm phơi nhiễm hoặc điều trị	a / (a + b)
Nguy cơ ở nhóm không phơi nhiễm hoặc nhóm chứng	c / (c + d)
Nguy cơ tương đối (RR)	nguy cơ nhóm phơi nhiễm ÷ nguy cơ nhóm chứng
Hiệu số nguy cơ (RD)	nguy cơ nhóm phơi nhiễm trừ nguy cơ nhóm chứng
Số người cần điều trị (NNT)	1 ÷ |RD| (RD viết dưới dạng tỷ lệ, ví dụ 0.05)
Tỷ số chênh (OR)	(a × d) ÷ (b × c)

Phép tính 1: một thử nghiệm về dịch truyền

Một thử nghiệm giả định phân bổ ngẫu nhiên 400 người lớn bị sốc nhiễm khuẩn vào chiến lược hạn chế dịch (200 người bệnh) hoặc chăm sóc thường quy (200 người bệnh). Đến ngày 28, **20** người bệnh đã tử vong ở nhóm hạn chế dịch và **30** ở nhóm chăm sóc thường quy.

	Tử vong trước ngày 28: CÓ	Tử vong trước ngày 28: KHÔNG	Tổng
Hạn chế dịch	a =	b =	
Chăm sóc thường quy	c =	d =	

1. Nguy cơ với hạn chế dịch = _____ Nguy cơ với chăm sóc thường quy = _____
2. RR = _____ 3. RD = _____ 4. NNT = _____ 5. OR = _____
6. Ví dụ mẫu trên slide có cùng RR (20/100 so với 30/100). Vì sao NNT ở đây lại khác? _____
7. Một câu cho đồng nghiệp: _____

Phép tính 2: một nghiên cứu bệnh–chứng về dịch truyền

Các nhà nghiên cứu chọn **40** người bệnh sepsis tại ICU cần lọc máu mới (nhóm bệnh) và **80** người bệnh sepsis tại cùng các đơn vị không cần lọc máu (nhóm chứng). Họ xem lại cân bằng dịch ngày 3 của từng người bệnh. Trong nhóm bệnh, **24** người có cân bằng dịch dương và 16 người không. Trong nhóm chứng, **16** người có cân bằng dịch dương và 64 người không.

	Nhóm bệnh (lọc máu mới)	Nhóm chứng (không lọc máu)
Cân bằng dịch dương ngày 3	a =	b =
Cân bằng dịch bằng 0 hoặc âm	c =	d =

1. OR = _____
2. Vì sao bạn **không** thể tính nguy cơ lọc máu, RR hay NNT từ nghiên cứu này?
   _____
3. Mũi tên có thể đi theo chiều ngược lại ở đây không (quan hệ nhân quả ngược)? Vì sao?
   _____
4. Một câu cho đồng nghiệp: _____

Lưu ý: trong nghiên cứu bệnh–chứng, các cột là nhóm bệnh và nhóm chứng. Công thức OR (a × d) ÷ (b × c) vẫn giữ nguyên.

Thực hành thêm (tự học): một chủ đề khác

Một thử nghiệm phân bổ ngẫu nhiên 400 người lớn tại khoa nội vào nhóm nằm đệm chống loét mới (200 người bệnh) hoặc đệm thường (200 người bệnh). Tổn thương do tì đè mới xuất hiện ở **10** người bệnh nằm đệm mới và **20** người nằm đệm thường. Vẽ bảng và tính hai nguy cơ, RR, RD, NNT và OR. Ở đây OR có gần với RR không? Vì sao?

Phần D: PPV ở hai bối cảnh (bài về nhà, không bắt buộc)

Nhiệm vụ. Cùng một xét nghiệm có **độ nhạy 90%** và **độ đặc hiệu 80%**. Hoàn thành từng bảng cho 500 người, rồi tính PPV và NPV và trả lời các câu hỏi.

> Số người mắc bệnh = tỷ lệ hiện mắc × 500. Dương tính thật (TP) = độ nhạy × số người mắc bệnh. Âm tính thật (TN) = độ đặc hiệu × số người không mắc bệnh. FP = dương tính giả, FN = âm tính giả.

Bối cảnh 1: ICU, tỷ lệ hiện mắc 20%

	Có bệnh	Không có bệnh	Tổng
Xét nghiệm dương tính	TP =	FP =	
Xét nghiệm âm tính	FN =	TN =	
Tổng			500

PPV = TP / (TP + FP) = _____ NPV = TN / (TN + FN) = _____

Bối cảnh 2: sàng lọc, tỷ lệ hiện mắc 2%


	Có bệnh	Không có bệnh	Tổng
Xét nghiệm dương tính	TP =	FP =	
Xét nghiệm âm tính	FN =	TN =	
Tổng			500

PPV = _____ NPV = _____

1. Vì sao PPV khác nhau nhiều như vậy khi xét nghiệm vẫn là một?
   _____
2. Tính tỷ số khả dĩ dương, LR+ = độ nhạy / (1 − độ đặc hiệu) = _____. LR+ có thay đổi giữa hai bối cảnh không? _____
3. Không bắt buộc: làm lại với tỷ lệ hiện mắc 50%.

Phần E: Đọc biểu đồ rừng và chọn công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch

Nhiệm vụ. Tự làm. Trả lời câu 1 đến 3 về biểu đồ rừng, rồi chọn công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch cho nghiên cứu a đến c. Chuẩn bị chia sẻ câu trả lời khi giảng viên mời. Đây là biểu đồ trong phần 4.3: sáu thử nghiệm giả định về hạn chế dịch so với thường quy, kết cục tử vong, gộp theo mô hình ảnh hưởng cố định.



Thử nghiệm	Hạn chế dịch: tử vong / tổng	Chăm sóc thường quy: tử vong / tổng
Thử nghiệm 1	12 / 60	15 / 60
Thử nghiệm 2	30 / 150	36 / 150
Thử nghiệm 3	8 / 40	7 / 40
Thử nghiệm 4	45 / 250	58 / 250
Thử nghiệm 5	20 / 100	27 / 100
Thử nghiệm 6	5 / 30	8 / 30

Đọc biểu đồ

1. Thử nghiệm nào có trọng số lớn nhất? Vì sao? _____
2. Có thử nghiệm đơn lẻ nào cho thấy tác động rõ ràng (KTC 95% không cắt qua 1) không? _____
3. Hình thoi gộp có cắt qua RR = 1 không? Viết kết quả gộp bằng một câu đơn giản. _____
4. (Tự học) Thử nghiệm 3 chỉ theo hướng ngược lại (RR 1.14). Điều đó có đáng lo không? Vì sao? _____

Chọn công cụ. Ghi một công cụ cho mỗi nghiên cứu.

> **Chọn trong: RoB 2** (công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch của Cochrane cho thử nghiệm ngẫu nhiên) · **ROBINS-I** (nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên) · **thang Newcastle-Ottawa (hoặc ROBINS-E)** (nghiên cứu thuần tập hoặc bệnh–chứng về phơi nhiễm) · **QUADAS-2** (nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán) · **AMSTAR 2** (tổng quan hệ thống)

#	Nghiên cứu	Công cụ
a	Bài báo 1, Boulet 2024: thử nghiệm ngẫu nhiên về hạn chế dịch so với thường quy	
b	Bài báo 2, Hyun 2023: thuần tập từ sổ đăng ký, cân bằng dịch dương so với âm	
c	Tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm hạn chế dịch	
d	(Tự học) Nghiên cứu trước–sau về một quy trình truyền dịch tại một khoa	
e	(Tự học) Lactate tại giường so với xét nghiệm tham chiếu của phòng xét nghiệm	
f	(Tự học) Thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm về quy trình ghi chép dịch (12 ICU)	

Phần F: Xây dựng đề cương 4 (phơi nhiễm, kết cục và sai lệch)

Nhiệm vụ. Viết nháp mục 2.4 đến 2.6 của đề cương cho câu hỏi của bạn. Trước tiên xem giảng viên điền các mục này cho ví dụ xuyên suốt, rồi tự viết trên lớp (khoảng 16 phút). Nếu chưa xong, làm

tiếp ở nhà. Sau đó chép câu trả lời vào Phần 2 của mẫu đề cương (`Research_Proposal_Template_VN.docx`). Mục 2.1 đến 2.3 (thiết kế, bối cảnh, đối tượng) đã viết nháp ở Buổi 3. Với mỗi kết cục, ghi rõ **cái gì**, **đo thế nào** và **khi nào**.

Câu hỏi nghiên cứu của tôi: _____

Mục	Cần viết gì	Câu trả lời của tôi
2.4 Can thiệp hoặc phơi nhiễm, và nhóm so sánh	Chính xác phơi nhiễm hoặc can thiệp là gì, và được định nghĩa hoặc đo như thế nào? Nhóm so sánh là ai?	
2.5 Kết cục	**MỘT kết cục chính**: là gì, đo thế nào và khi nào. **2–3 kết cục phụ.**	
2.6 Các nguy cơ sai lệch chính và cách hạn chế	Nêu ít nhất **hai** mối đe dọa (chọn lựa, thông tin, nhiễu) và bước nào trong thiết kế giúp giảm từng mối đe dọa.	

Khẳng định cuối cùng của tôi sẽ là: ☐ "gây ra" (thiết kế ngẫu nhiên) ☐ "có liên quan với" (thiết kế quan sát), vì _____

Tự kiểm tra trước khi hoàn thành

- ☐ Có nhóm so sánh, hoặc tôi giải thích vì sao nghiên cứu của tôi là nghiên cứu mô tả.
- ☐ Chỉ có MỘT kết cục chính, kèm phương pháp đo và thời điểm đo.
- ☐ Nếu thiết kế là quan sát, tôi đã nêu các yếu tố gây nhiễu chính (nghĩ đến nhiễu do chỉ định).
- ☐ Mỗi sai lệch có một bước giảm thiểu cụ thể ("chúng tôi sẽ cẩn thận" không phải là bước giảm thiểu).
- ☐ Phần 2 đã hoàn chỉnh: mục 2.1 đến 2.3 (Buổi 3) và 2.4 đến 2.6 (hôm nay).