Buổi 8 (CÔNG BỐ): Đáp án và ghi chú hướng dẫn

Đáp án cho `Course/Practicals/s8_exercises_VN.md` (phiếu bài tập Buổi 8), Phần A–C. Đáp án mẫu cho phần thẩm định (Phần D) nằm trong `Course/Resources/appraisal_instructor_guide.md`. Số liệu trong Phần B lấy từ `Course/Data/key_results.md` (dữ liệu MÔ PHỎNG).

Phần A: Bài tập viết

A1. Sửa spin (bản viết lại mẫu)

#	Bản viết lại mẫu	Vì sao
a	"Ước lượng điểm nghiêng về chiến lược hạn chế dịch, nhưng KTC 95% rộng (−15.2 đến 41.6 ml/kg) và có chứa giá trị không khác biệt; cần một thử nghiệm lớn hơn để phát hiện một tác động nhỏ hơn."	p = 0.42 không phải là xu hướng; báo cáo ước lượng và độ không chắc chắn của nó (chú giải #41).
b	"Cân bằng dịch dương trong ngày ICU đầu tiên không liên quan với tử vong 28 ngày (HR 1.17, KTC 95% 0.85 đến 1.60)."	"Impact" (tác động) hàm ý nhân quả; nghiên cứu thuần tập chỉ cho thấy mối liên quan (#27).
c	"Positive cumulative fluid balance during the first three ICU days and 28-day mortality in sepsis: a propensity score-matched cohort study" (Cân bằng dịch tích lũy dương trong ba ngày ICU đầu tiên và tử vong 28 ngày trong sepsis: nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng)	Tiêu đề phải tương xứng với thiết kế quan sát (#1).
d	"Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là một trong những mức cân bằng dịch ngày 5 thấp nhất được báo cáo trong các thử nghiệm về sốc nhiễm khuẩn [tài liệu tham khảo]", hoặc bỏ câu này.	So sánh bậc nhất cần có từ rào đón và trích dẫn (#40).

A2. Bậc thang động từ

a: **được ghi nhận ở** (loạt ca bệnh) · b: **có liên quan với** (thuần tập) · c: **không làm giảm** (một RCT; thêm "trong nghiên cứu thí điểm này" vì cỡ mẫu nhỏ) · d: **làm giảm / gây ra** (các RCT lớn nhất quán và phân tích gộp) · e: **được ghi nhận / chiếm … %** (nghiên cứu mô tả cắt ngang).

A3. Câu kết quả

1. "Trong thuần tập ghép cặp ngày 3, cân bằng dịch tích lũy dương có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn (HR 1.56, KTC 95% 1.10 đến 2.22; P = 0.012)."
2. "Đến ngày 28, mỗi nhóm có 6 trên 24 người bệnh tử vong (nguy cơ tương đối 1.0, KTC 95% 0.38 đến 2.66)." Trong phần Bàn luận: "thử nghiệm quá nhỏ để đánh giá tử vong".

3. "Trong thuần tập ngày 1, cân bằng dịch dương không liên quan với tử vong 28 ngày (HR 1.17, KTC 95% 0.85 đến 1.60; P = 0.354)." Không viết "không có tác động".

A4. Tên đề tài từ PICO (ví dụ xuyên suốt)

"Restrictive vs usual fluids and 28-day mortality in septic shock: a randomised controlled trial" (14 từ). Hoặc, cho đề cương quan sát: "Cumulative fluid balance and 28-day mortality in adults with septic shock: a retrospective cohort study". Kiểm tra: 10–16 từ, nêu thiết kế, không dùng "impact", thiết kế quan sát dùng "and" / "association between".

Phần B: Thực hành bản thảo 2: hoàn thiện phần Kết quả, và mẫu cho các phần khác

Hoàn thiện phần Kết quả Q1 của lớp (phần 1 của buổi thực hành)

Kiểm tra	Cách sửa điển hình trong bản nháp của lớp
Mọi con số khớp với gói kết quả Q1	Sửa theo gói kết quả, ví dụ 134/373 (35.9%)
Tỷ lệ phần trăm có mẫu số	"35.9%" thành "134 trên 373 (35.9%)"
Có cả ước lượng thô và đã hiệu chỉnh	OR thô 2.49 (1.70 đến 3.70), hiệu chỉnh 1.62 (1.02 đến 2.59), n = 527
Bảng tự đọc hiểu được	Tên bảng nêu ai và khi nào, n mỗi cột, đơn vị, chú thích SOFA và IQR
Không diễn giải	Xóa "vì người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn"
Tên bài dự kiến	"Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày ở người bệnh sepsis: một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm"

Các mẫu dưới đây dành cho phần Đặt vấn đề, Bàn luận và Tóm tắt đã học ở 8.1. Các phần này không bắt buộc nộp. Dùng để định hướng, không dán nguyên văn. Học viên chọn Q2–Q5 theo cùng cấu trúc với gói kết quả của mình.

Mọi con số lấy từ `Course/Data/key_results.md` và gói kết quả Q1 (**DỮ LIỆU MÔ PHỎNG**). Tài liệu tham khảo để dạng giữ chỗ [n]; học viên dùng các tài liệu tham khảo từ Buổi 1–2 và Bài báo 1–2.

Tiêu đề và từ khóa mẫu

Positive fluid balance by day 3 and 28-day mortality in sepsis: a multicentre cohort study (Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày trong sepsis: nghiên cứu thuần tập đa trung tâm) (15 từ tiếng Anh; nêu thiết kế; từ ngữ chừng mực).

Từ khóa: Fluid Therapy; Water-Electrolyte Balance; Critical Care; Mortality; Cohort Studies.

Đặt vấn đề mẫu (~300 từ, ba đoạn)

1. *Điều đã biết.* Dịch truyền tĩnh mạch là nền tảng trong điều trị sớm sepsis, nhưng dịch truyền vượt quá giai đoạn hồi sức sẽ tích lũy. Cân bằng dịch tích lũy dương có liên quan với tử vong cao hơn trong nhiều nghiên cứu quan sát, trong đó có một nghiên cứu thuần tập lớn ghép cặp theo điểm xu hướng cho thấy cân bằng dịch dương ở ngày ICU thứ 2 liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn (HR 2.13) [Bài báo 2].

2. *Điều chưa biết.* Vì người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn, vẫn chưa rõ bao nhiêu phần của mối liên quan này phản ánh mức độ nặng của bệnh (nhiễu do chỉ định) chứ không phải do chính dịch truyền [tài liệu tham khảo]. Các thử nghiệm ngẫu nhiên về chiến lược hạn chế dịch, như một nghiên cứu thí điểm gần đây nhắm vào dịch không nhằm hồi sức [Bài báo 1], đều nhỏ và chưa đưa ra kết luận.

3. *Mục tiêu.* Vì vậy chúng tôi xem xét liệu cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan với tử vong 28 ngày ở người lớn bị sepsis hay không, trước và sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng.

Bàn luận mẫu (~500 từ, sáu bước)

1. **Trả lời.** Trong nghiên cứu thuần tập đa trung tâm này, cân bằng dịch dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng (OR hiệu chỉnh 1.62, KTC 95% 1.02 đến 2.59).

2. **So sánh.** Chiều hướng phù hợp với Bài báo 2 (HR ngày 2 là 2.13, KTC 95% 1.48 đến 3.06), dù ước lượng hiệu chỉnh của chúng tôi nhỏ hơn; khác biệt về đặc điểm người bệnh, thời điểm tính cân bằng dịch và bộ biến hiệu chỉnh có thể giải thích điều này.

3. **Giải thích.** Phần lớn mối liên quan thô (OR 2.49) biến mất sau hiệu chỉnh, phù hợp với nhiễu do chỉ định: người bệnh có cân bằng dịch dương nặng hơn (trung vị SOFA 8 so với 6; thuốc vận mạch 55.0% so với 24.9%). Tích lũy dịch có thể góp phần gây phù cơ quan, nhưng dữ liệu của chúng tôi không chứng minh được điều này.

4. **Hạn chế.** Nhiễu tồn dư do mức độ nặng chưa được đo là rất có thể và sẽ phóng đại mối liên quan; quan hệ nhân quả ngược (người bệnh diễn tiến xấu tích lũy dịch) cũng tác động theo cùng chiều. Người bệnh tử vong trước ngày 3 có ít thời gian tích lũy dịch hơn. HR Cox hiệu chỉnh (1.46, KTC 95% 1.00 đến 2.13) có giới hạn dưới bằng 1. Lactate bị thiếu ở 15%, nhưng quy gán đa bội cho ước lượng tương tự (OR 1.70). Mối liên quan có vẻ mạnh hơn ở người suy tim (OR hiệu chỉnh 4.39 so với 1.29; p tương tác 0.031) nhưng chỉ dựa trên 90 người bệnh và nên được xem là một giả thuyết. Dữ liệu là dữ liệu mô phỏng.

5. **Ý nghĩa.** Các phát hiện này không đủ căn cứ để hạn chế dịch trong thực hành lâm sàng; cần một thử nghiệm ngẫu nhiên về chiến lược truyền dịch sau giai đoạn hồi sức.

6. **Kết luận.** Cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan ở mức vừa phải với tử vong 28 ngày cao hơn; phần lớn mối liên quan thô phản ánh mức độ nặng của bệnh.

Tóm tắt mẫu (≈190 từ)

Đặt vấn đề: Cân bằng dịch dương có liên quan với tử vong trong sepsis, nhưng người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn. Chúng tôi xem xét mối liên quan này sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng.

Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm (dữ liệu giảng dạy mô phỏng) trên 620 người lớn bị sepsis tại bốn ICU, 2023–2024. Phơi nhiễm: cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3. Kết cục: tử vong 28 ngày. Hồi quy logistic và Cox hiệu chỉnh theo tuổi, SOFA, lactate, thuốc vận mạch, thở máy và bệnh thận mạn; quy gán đa bội cho lactate bị thiếu.

Kết quả: Trong 618 người bệnh được phân tích, 373 người (60.4%) có cân bằng dịch dương; 134/373 (35.9%) so với 45/245 (18.4%) tử vong. OR thô là 2.49 (KTC 95% 1.70 đến 3.70) và OR hiệu chỉnh là 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59); với quy gán là 1.70 (1.09 đến 2.64). HR hiệu chỉnh là 1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13).

Kết luận: Cân bằng dịch dương đến ngày 3 có liên quan ở mức vừa phải với tử vong 28 ngày; phần lớn mối liên quan thô phản ánh mức độ nặng của bệnh. Cần một thử nghiệm ngẫu nhiên trước khi thay đổi chiến lược truyền dịch.

Các điểm bàn luận riêng cho từng câu hỏi (từ các gói kết quả)

Câu hỏi	Câu trả lời (số liệu từ key_results.md)	Hạn chế chính
Q2 AKI	OR hiệu chỉnh 1.27 mỗi 10 ml/kg (KTC 95% 1.16 đến 1.40)	Quan hệ nhân quả ngược: AKI thiểu niệu gây tích lũy dịch
Q3 VFD	Hiệu chỉnh −0.61 ngày mỗi 10 ml/kg (KTC 95% −1.00 đến −0.21)	Số ngày không thở máy gộp cả tử vong và thở máy; kết cục có phân phối lệch
Q4 Lactate	OR hiệu chỉnh mỗi mmol/L 1.39 (CC, n = 527) so với 1.45 (MI, n = 620)	Không loại trừ được thiếu không ngẫu nhiên; MAR là hợp lý (thiếu ở người bệnh nhẹ hơn)
Q5 Thời gian nằm ICU	Tỷ số trung bình nhân hiệu chỉnh 1.24 (KTC 95% 1.10 đến 1.39), người sống sót (n = 366 trong mô hình hiệu chỉnh)	Chỉ người sống sót (điều kiện hóa theo sống còn); kết cục có phân phối lệch

Phần C: Công bố

C1. Nhận diện tạp chí săn mồi

1. Các dấu hiệu cảnh báo trong thư mời (ít nhất 8):

1. Lời chào chung chung, tâng bốc ("Respected Professor/Doctor"), email gửi hàng loạt không được yêu cầu.
2. Địa chỉ email miễn phí, không phải tên miền của nhà xuất bản.
3. Lời khẳng định mơ hồ đã đọc "your excellent article" (không nêu tên bài).
4. Phạm vi rộng một cách vô lý (y khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, quản lý; "all areas of science").
5. Chỉ số giả ("International Universal Index" impact factor). Chỉ Clarivate cấp Journal Impact Factor.
6. Cam kết bình duyệt trong 48 giờ và xuất bản trong 5 ngày.
7. Phí được giấu đến sau khi chấp nhận bài.
8. Chiến thuật gây áp lực ("this week only"), nhiều dấu chấm than, ngữ pháp bất thường.
9. Nộp bài bằng cách trả lời email thay vì qua hệ thống biên tập.

2. Hồ sơ tạp chí:

Tạp chí	Nhận định	Lý do
J1	**Tin cậy**	Việc chỉ mục được xác minh tại nguồn, phí và thời gian minh bạch, biên tập viên kiểm chứng được, dùng bảng kiểm báo cáo.
J2	**Tránh**	Google Scholar / Index Copernicus không phải là chỉ mục chất lượng; chấp nhận trong 72 giờ; phí bị giấu; ban biên tập không kiểm chứng được.

Tạp chí	Nhận định	Lý do
J3	**Tin cậy / kiểm tra thêm**	Có trong DOAJ và chính sách rõ ràng là dấu hiệu tốt; chưa có hệ số ảnh hưởng là bình thường với tạp chí mới hoặc nhỏ. Kiểm tra xem tạp chí có đăng các nghiên cứu giống của bạn không.
J4	**Tránh**	Tạp chí "bị đánh cắp" (hijacked) hoặc giả danh. Luôn vào tạp chí thật qua website của nhà xuất bản hoặc NLM Catalog, không qua đường dẫn trong email.

C2. Phản hồi ý kiến phản biện (các dòng mẫu)

#	Phản hồi mẫu	Thay đổi
R1.1	"Xin cảm ơn. Chúng tôi đồng ý rằng thiết kế của chúng tôi chỉ ủng hộ mối liên quan, không phải quan hệ nhân quả. Chúng tôi đã đổi tiêu đề thành '… và …: nghiên cứu thuần tập' và thay 'cải thiện' bằng 'có liên quan với' trong toàn bài."	Tiêu đề tr.1; tóm tắt; Bàn luận tr.x
R1.2	"Xin cảm ơn. Kết quả chính nay được báo cáo là RR 0.78 (KTC 95% 0.61 đến 0.99) trong phần tóm tắt, Kết quả và Bảng 2."	Tóm tắt; Kết quả tr.x
R1.3	"Cảm ơn người phản biện đã phát hiện điều này. 212 người bệnh được đưa vào và 4 người bị loại khỏi mô hình hiệu chỉnh vì thiếu lactate; sơ đồ dòng và văn bản nay thể hiện 212 người được đưa vào và 208 người được phân tích, kèm lý do."	Hình 1; Kết quả tr.x
R2.1	(phản bác lịch sự) "Chúng tôi đồng ý tử vong 1 năm là quan trọng. Đề cương của chúng tôi, đã được hội đồng đạo đức chấp thuận, chỉ theo dõi người bệnh đến ngày 28, nên dữ liệu này không được thu thập. Chúng tôi nay nêu điều này như một hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu sau."	Hạn chế tr.x

Các điểm chấm: trả lời mọi nhận xét; cảm ơn mà không khúm núm; nêu vị trí cụ thể của mọi thay đổi; không bịa thêm dữ liệu mới; phản bác có lý do (đề cương, chấp thuận của hội đồng đạo đức).