Gói kết quả Q4: Lactat lúc nhập ICU, tử vong 28 ngày và dữ liệu thiếu

FLUID-ICU là bộ dữ liệu MÔ PHỎNG được tạo ra để giảng dạy. Không có người bệnh thật. Neudata | Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng

DỮ LIỆU MÔ PHỎNG: KHÔNG PHẢI NGƯỜI BỆNH THẬT. FLUID-ICU được tạo bằng máy tính cho khóa học này. Hãy viết bản thảo như một bài tập huấn luyện và ghi rõ rằng dữ liệu là mô phỏng.

1. Câu hỏi

Ở người lớn bị sepsis điều trị tại ICU, lactat lúc nhập ICU có liên quan với tử vong 28 ngày không, và câu trả lời có thay đổi không khi các giá trị lactat bị thiếu được xử lý bằng quy gán đa bội?

2. Thiết kế và dữ liệu

- Thiết kế: nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm (quan sát); câu hỏi về yếu tố tiên lượng.
- Bối cảnh: 4 ICU (ICU A-D), người lớn bị sepsis được tuyển liên tiếp, thời gian tuyển từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2024.
- Phơi nhiễm: lactat lúc nhập ICU tính bằng mmol/L, theo mỗi 1 mmol/L (liên tục); và theo các nhóm < 2, 2 đến 4, > 4 mmol/L.
- Kết cục: tử vong do mọi nguyên nhân trong vòng 28 ngày (died_28d).
- Mẫu phân tích: tất cả 620 người bệnh; thiếu lactat ở 93/620 (15.0%); các mô hình trường hợp đầy đủ 527 người bệnh; quy gán đa bội 620.
- Các yếu tố gây nhiễu xác định trước (SAP): tuổi, điểm SOFA, lactat, thuốc vận mạch, thở máy, bệnh thận mạn.
- Phần mềm: R 4.6 (các gói gtsummary, survival, mice). Script: Course/Data/R/.

3. Bảng 1: đối tượng nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm ban đầu của nhóm sống và nhóm tử vong

Đặc điểm	Toàn bộ N = 620	Sống đến ngày 28 N = 441	Tử vong trong 28 ngày N = 179
Tuổi, năm	62.6 (15.2)	61.2 (14.8)	66.0 (15.7)
Thiếu	1	1	0
Giới			
Nữ	244 (39%)	179 (41%)	65 (36%)
Nam	376 (61%)	262 (59%)	114 (64%)
Cân nặng, kg	64.7 (11.9)	64.5 (11.8)	65.2 (12.1)
Thiếu	1	1	0
Đái tháo đường	158 (25%)	108 (24%)	50 (28%)
Bệnh thận mạn	64 (10%)	33 (7.5%)	31 (17%)
Suy tim	97 (16%)	60 (14%)	37 (21%)
Tăng huyết áp	282 (45%)	196 (44%)	86 (48%)
Nguồn nhiễm khuẩn			
Hô hấp	268 (43%)	192 (44%)	76 (42%)

Đặc điểm	Toàn bộ N = 620	Sống đến ngày 28 N = 441	Tử vong trong 28 ngày N = 179
Tiết niệu	126 (20%)	99 (22%)	27 (15%)
Ổ bụng	107 (17%)	72 (16%)	35 (20%)
Da/mô mềm	57 (9.2%)	36 (8.2%)	21 (12%)
Khác	62 (10%)	42 (9.5%)	20 (11%)
Điểm SOFA	7 (5, 9)	7 (5, 9)	8 (7, 10)
Điểm APACHE II	19 (15, 23)	18 (13, 22)	23 (19, 27)
Thiếu	6	5	1
Lactat, mmol/L	2.6 (1.7, 3.7)	2.3 (1.6, 3.4)	3.1 (2.2, 4.5)
Thiếu	93	75	18
Huyết áp động mạch trung bình, mmHg	73 (66, 80)	75 (68, 82)	70 (63, 76)
Thiếu	4	3	1
Thuốc vận mạch lúc nhập ICU	267 (43%)	153 (35%)	114 (64%)
Thở máy	314 (51%)	190 (43%)	124 (69%)
Cân bằng dịch tích lũy ngày 3, ml/kg	8.8 (-10.3, 26.2)	4.0 (-12.6, 22.7)	18.4 (-0.3, 35.9)
Thiếu	2	2	0


Trung bình (SD); n (%); trung vị (Q1, Q3). Thiếu = số người bệnh không có giá trị đó. Bảng 1 chỉ mô tả người bệnh lúc vào ICU. Các kết cục, như tử vong 28 ngày, nằm ở phần kết quả chính.

4. Ai bị thiếu lactat?

Bảng 2. Người bệnh có và không có lactat lúc nhập ICU

Đặc điểm	Có đo lactat	Thiếu lactat
n	527	93
SOFA, trung vị (IQR)	8 (6 đến 10)	5 (4 đến 6)
MAP, trung vị (IQR)	72 (65 đến 78)	80 (75 đến 86)
Thuốc vận mạch, n (%)	253 (48%)	14 (15%)
ICU D, n (%)	89 (17%)	29 (31%)
Tử vong trong 28 ngày, n (%)	161 (31%)	18 (19%)

Người bệnh không có lactat **ít nặng hơn** (SOFA 5 (4 đến 6) so với 8 (6 đến 10)) và tử vong ít hơn (18/93 (19.4%) so với 161/527 (30.6%)). Vì vậy lactat KHÔNG thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên; việc thiếu được giải thích bởi các biến đã quan sát (SOFA, MAP, thuốc vận mạch, ICU), nên giả định 'thiếu ngẫu nhiên' (MAR) là hợp lý.



Hình 1. Tỷ lệ người bệnh thiếu lactat theo điểm SOFA

5. Kết quả chính

- Lactat trung vị: nhóm tử vong 3.1 (2.2 đến 4.5) so với nhóm sống 2.3 (1.6 đến 3.4) mmol/L.
- Tử vong theo nhóm lactat: < 2: 19%; 2 đến 4: 31%; > 4: 50%; Thiếu: 19%.
- OR chưa hiệu chỉnh cho mỗi 1 mmol/L: trường hợp đầy đủ 1.38 (1.23 đến 1.55); quy gán đa bội 1.44 (1.28 đến 1.61).
- Hiệu chỉnh (tuổi, giới, bệnh kèm): trường hợp đầy đủ 1.39 (1.24 đến 1.57) so với **quy gán đa bội 1.45 (1.29 đến 1.64)** (phân tích chính).
- Thêm SOFA: trường hợp đầy đủ 1.21 (1.05 đến 1.39) so với quy gán đa bội 1.23 (1.07 đến 1.42).
- Lactat trung vị ở các trường hợp đầy đủ là 2.6 mmol/L so với 2.4 mmol/L sau quy gán: các trường hợp đầy đủ có nhiều người bệnh nặng hơn so với toàn bộ mẫu.


Bảng 3. Tử vong 28 ngày theo nhóm lactat lúc nhập ICU

Lactat lúc nhập ICU, mmol/L	n	Tử vong trong 28 ngày, n (%)
< 2	172	32 (19%)
2 đến 4	248	76 (31%)
> 4	107	53 (50%)
Thiếu	93	18 (19%)


Bảng 4. Lactat và tử vong 28 ngày: trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội

Mô hình	Phương pháp	n	OR mỗi 1 mmol/L (KTC 95%)	p
Chưa hiệu chỉnh	Trường hợp đầy đủ	527	1.38 (1.23 đến 1.55)	<0.001
Chưa hiệu chỉnh	Quy gán đa bội (m = 20)	620	1.44 (1.28 đến 1.61)	<0.001
Hiệu chỉnh: tuổi, giới, đái tháo đường, bệnh	Trường hợp đầy	527	1.39 (1.24 đến 1.57)	<0.001

Mô hình	Phương pháp	n	OR mỗi 1 mmol/L (KTC 95%)	p
thận mạn, suy tim (chính)	đủ			
Hiệu chỉnh: tuổi, giới, đái tháo đường, bệnh thận mạn, suy tim (chính)	Quy gán đa bội (m = 20)	620	1.45 (1.29 đến 1.64)	<0.001
Mô hình chính + điểm SOFA	Trường hợp đầy đủ	527	1.21 (1.05 đến 1.39)	0.008
Mô hình chính + điểm SOFA	Quy gán đa bội (m = 20)	620	1.23 (1.07 đến 1.42)	0.003



Hình 2. Tử vong 28 ngày theo nhóm lactat lúc nhập ICU (màu xám = không đo lactat)



Hình 3. Tỷ số chênh cho mỗi 1 mmol/L lactat: trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội

6. Ý nghĩa (bằng lời đơn giản)

• Lactat lúc nhập ICU cao hơn đi kèm tử vong 28 ngày cao hơn: mỗi 1 mmol/L tăng thêm làm số chênh tử vong tăng khoảng 40-45% (hiệu chỉnh theo tuổi, giới và bệnh kèm).
• Phần lớn mối liên quan này trùng với mức độ nặng chung: sau khi thêm SOFA, OR giảm còn khoảng 1.2. Lactat một phần là dấu hiệu cho biết người bệnh nặng đến mức nào.
• Loại bỏ 93 người bệnh không có lactat (trường hợp đầy đủ) cho OR nhỏ hơn một chút so với quy gán đa bội (dùng cả 620 người bệnh). Kết luận vẫn như nhau; độ lớn khác nhau ở mức vừa phải, vì các trường hợp đầy đủ là một nhóm nặng hơn, đã bị chọn lọc.

7. Kết quả này KHÔNG có nghĩa là gì

• Kết quả KHÔNG có nghĩa là hạ lactat sẽ cứu sống người bệnh. Lactat là một dấu hiệu, không nhất thiết là nguyên nhân.
• Quy gán đa bội KHÔNG bịa ra dữ liệu và KHÔNG 'sửa' được mọi thứ: phương pháp này chỉ hợp lệ khi việc thiếu phụ thuộc vào những yếu tố đã đo (MAR). Nếu lactat bị thiếu vì những lý do liên quan đến chính giá trị không quan sát được (MNAR), không phương pháp nào sửa được hoàn toàn.

8. Các hạn chế cần bàn luận (gợi ý)

• Thiếu 15% lactat, không ngẫu nhiên: hãy báo cáo số bị thiếu, đó là những ai, và kết quả của cả hai phân tích.
• Chỉ có một giá trị lúc nhập ICU: độ thanh thải lactat theo thời gian không được ghi nhận.
• Vấn đề đơn vị ở một ICU (mg/dL) được phát hiện khi làm sạch dữ liệu: hãy mô tả các bước kiểm tra dữ liệu.
• OR cho mỗi 1 mmol/L giả định quan hệ đường thẳng (trên thang log-odds); các nhóm trong Bảng 3 giúp người đọc kiểm tra giả định này.

Các mục STROBE mà gói này giúp bạn viết

- Mục 12c: cách xử lý dữ liệu thiếu (quy gán đa bội, m = 20, các biến trong mô hình quy gán)
- Mục 14b: số người tham gia bị thiếu dữ liệu ở từng biến (Bảng 1, Bảng 2)
- Mục 16: ước lượng chưa hiệu chỉnh và đã hiệu chỉnh kèm KTC 95%; ngưỡng của các nhóm (Bảng 3)
- Mục 17: phân tích độ nhạy (trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội, Bảng 4)
- Mục 19: hạn chế (cơ chế dữ liệu thiếu)