

Brain & Mind

B&M News

- 음주, 뇌 손상 통해 치매 위험 높일 수 있어:
과거 과음 경험도 인지 기능 저하와 연관
- 당뇨병 치료제, 알츠하이머병 위험 최대 43% 낮춰:
GLP-1 작용제 · SGLT2 억제제, 치매 예방 효과 보여
- 대상포진 백신, 치매 예방 효과...최대 20% 위험 감소:
“백신 접종이 치매 급증을 억제하는 비용 효율적 방법이 될 수도”
- 새로운 혈액 검사, 알츠하이머 조기 진단 및 진행 단계 파악에 도움:
질병의 단계에 따라 치료 전략 결정 가능성 높아져
- 깊은 수면 부족, 알츠하이머병 위험 높일 수 있어:
수면 단계와 뇌 구조 변화 간의 연관성 밝혀져
- 건강한 식단이 이명 위험 낮출 수 있어:
과일 · 섬유질 · 유제품 · 카페인 섭취가 이명 예방에 도움
- 치매 환자 32%, 청력 손실과 연관 가능성 있어

음주, 뇌 손상 통해 치매 위험 높일 수 있어: 과거 과음 경험도 인지 기능 저하와 연관

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 음주가 인체에 미치는 전체적인 영향은 아직 전문가들도 완전히 이해하지 못한 상태다.
- 한 연구에서는 현재 과음하거나 과거에 과음한 사람들에게서 히알린소동맥경화증과 신경섬유 엉킴 같은 뇌 이상 소견이 관찰되었다.
- 또한 이 연구는 알코올 섭취의 영향이 히알린소동맥경화증을 매개로 하여 인지 기능에 영향을 줄 수 있다는 가능성을 시사하고 있다.

최근 'Neurology' 저널에 발표된 연구에 따르면, 중등도 이상의 음주자뿐 아니라 과거 과음 경험이 있는 사람들도 뇌 혈관 이상과 인지 기능 저하 위험이 증가하는 것으로 나타났다.

연구진은 특히 히알린소동맥경화증(hyaline arteriolosclerosis) 및 신경섬유 엉킴(neurofibrillary tangles)과 같은 치매 관련 병리와 음주 간의 관련성을 지적했다. 히알린소동맥경화증은 노화나 특정 질환이 있는 사람들에게서 혈관이 두꺼워지고 좁아지는 현상으로, 이 병리 변화가 알코올 섭취를 통해 촉진될 수 있다는 것이 이번 연구의 핵심이다.

또한, 과거에 과음을 했던 사람들은 술을 전혀 마시지 않았던 사람들에 비해 뇌 질량 비율이 낮고 인지 능력도 저하된 것으로 나타났다. 이는 음주가 단순히 일시적인 영향에 그치지 않고 장기적인 뇌 구조와 기능에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

미국 질병통제예방센터(CDC) 역시 과도한 음주는 암, 고혈압, 심장질환, 뇌졸중 등의 위험을 높인다고 경고하고 있으며, 연구진은 이번 결과가 음주 습관 개선이 치매 예방에도 도움이 될 수 있음을 시사한다고 설명했다.

당뇨병 치료제, 알츠하이머병 위험 최대 43% 낮춰: GLP-1 작용제 · SGLT2 억제제, 치매 예방 효과 보여

Written by Tim Newman on Medical News Today

- 새로운 연구는 특정 당뇨병 치료제와 치매 간의 연관성을 조사하고 있다.
- 연구진은 2형 당뇨병을 가진 92,000명 이상의 데이터를 활용하였다.
- 그 결과, 두 가지 약물이 삶의 전반에 걸쳐 치매 발병 위험을 유의미하게 낮추는 것으로 나타났다.

미국의학협회 신경학 저널(JAMA Neurology)에 발표된 이 새로운 연구는 2형 당뇨병 환자 92,000명 이상의 데이터를 분석해, 특정 당뇨병 치료제를 복용한 환자들이 치매 위험이 낮다는 사실을 확인했다.

특히, GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RA)인 Ozempic과 Wegovy를 복용한 환자들은 치매 위험이 33% 낮았고, SGLT2 억제제(SGLT2i)인 Jardiance를 복용한 환자들은 43% 낮은 치매 발병률을 보였다. 반면, 다른 종류의 당뇨병 약물은 치매 위험에 뚜렷한 영향을 미치지 않았다.

연구진은 “GLP-1 RA와 SGLT2i 계열의 약물이 뇌에 긍정적인 영향을 미치며, 인지 기능 저하를 억제하는데 효과가 있을 가능성이 있다”고 설명했다.

이번 연구는 당뇨병 환자뿐만 아니라 인지 기능 저하 예방에 관심이 있는 고령층에서도 큰 관심을 모을 것으로 예상된다. 연구진은 향후 이 약물들이 치매 예방 치료제로 활용될 수 있을지에 대한 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

대상포진 백신, 치매 예방 효과...최대 20% 위험 감소: “백신 접종이 치매 급증을 억제하는 비용 효율적 방법이 될 수도”

Written by Katharine Lang on Medical News Today

- 치매는 현재 전 세계적으로 5,700만 명 이상에게 영향을 미치고 있으며, 향후 25년 내에 이 수치는 거의 3배로 증가할 것으로 예상된다.
- 치매 발병 위험을 높이는 요인에는 나이, 유전, 혈관질환 등이 있으며, 최근 연구에 따르면 일부 바이러스 감염도 위험요인으로 지목되고 있다.
- 그중 하나가 대상포진으로, 이는 수두 바이러스가 신경세포 내에서 재활성화되면서 발생하는 질환이다.
- 새로운 연구에 따르면 대상포진 백신 접종은 치매 위험을 20% 줄일 수 있는 것으로 나타났다.
- 이러한 연구 결과가 더 확실히 입증된다면, 대상포진 백신은 급증하는 치매 환자 수를 억제하는 비용 효율적인 방법이 될 수 있다.

대상포진 백신 접종이 치매 위험을 20%까지 낮출 수 있다는 새로운 연구 결과가 나와 주목을 받고 있다.

미국 스탠퍼드 의대 연구진은 'Nature'에 발표한 논문을 통해, 수두 바이러스(Varicella zoster virus)가 재활성화되어 발생하는 대상포진이 치매 위험 증가와 관련이 있으며, 이 대상포진을 예방하는 백신이 치매 발병률을 낮출 수 있다고 밝혔다. 기존 연구에서는 고령, 유전, 당뇨병, 고혈압과 같은 만성 질환, 그리고 신경계에 영향을 주는 바이러스 감염이 치매 위험 요인으로 알려져 왔다. 이번 연구는 바이러스 감염과 치매 간의 연관성을 뒷받침하는 또 하나의 과학적 근거를 제공한 셈이다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 치매 예방을 위해 건강한 식습관, 규칙적인 운동, 만성 질환 관리를 권고하고 있지만, 나이와 유전 등 통제할 수 없는 요인도 많다. 이 가운데 대상포진 백신 접종이라는 현실적인 방법이 추가된 것이다.

연구진은 이번 결과가 공공 보건 전략 수립에 있어 중요한 출발점이 될 수 있으며, 치매 발병률을 낮추는 비용 효율적인 수단으로써 백신 접종을 고려할 필요가 있다고 덧붙였다.

새로운 혈액 검사, 알츠하이머 조기 진단 및 진행 단계 파악에 도움: 질병의 단계에 따라 치료 전략 결정 가능성 높아져

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 현재 알츠하이머병을 진단하고 질병의 진행 단계를 파악하는데 도움이 되는 몇 가지 검사 방법이 있으며, 그 중에는 혈액 검사도 포함되어 있다.
- 미국 세인트루이스 워싱턴대학교(WashU Medicine) 연구진은 알츠하이머병을 진단하는데 도움이 될 뿐만 아니라, 질병이 얼마나 진행되었는지도 의사에게 알려줄 수 있는 새로운 혈액 검사법을 개발하였다.
- 이 연구는 알츠하이머병에서 나타나는 타우 엉킴(tau tangles)과 관련된 새로운 단백질 바이오마커에 대한 기존 연구를 기반으로 하고 있다.

전 세계적으로 5,500만 명 이상이 알츠하이머병을 앓고 있는 것으로 추정되며, 알츠하이머병은 기억력과 사고 능력에 영향을 미치는 대표적인 치매의 한 형태이다.

현재 알츠하이머병을 진단하는 데는 아밀로이드 베타와 타우 단백질을 검사하는 혈액 검사, 인지 기능 검사, 뇌 영상 촬영 등이 사용되고 있다. 하지만 많은 환자들이 질병 초기보다는 진행된 상태에서 진단을 받는 경우가 많아, 적절한 치료 시점을 놓치는 경우도 발생한다.

이런 상황에서 미국 세인트루이스 워싱턴대학교(WashU Medicine) 연구진은 알츠하이머병을 조기에 진단할 뿐만 아니라, 질병이 얼마나 진행되었는지도 파악할 수 있는 혈액 검사를 새롭게 개발했다.

이 검사법은 의사들이 환자의 질병 단계에 따라 더 적절한 치료 방법을 선택할 수 있도록 돕는 도구가 될 수 있을 것으로 기대되며, 관련 연구는 최근 'Nature Medicine'에 게재되었다.

깊은 수면 부족, 알츠하이머병 위험 높일 수 있어: 수면 단계와 뇌 구조 변화 간의 연관성 밝혀져

Written by Tim Newman on Medical News Today

- 이전 연구들에서는 수면과 알츠하이머병 사이의 연관성이 있다는 사실이 밝혀진 바 있다.
- 새로운 연구는 수면 단계, 뇌의 변화, 그리고 알츠하이머병 간의 관계를 더 구체적으로 분석하였다.
- 연구 결과에 따르면, 특정 수면 단계가 감소하면 알츠하이머병과 관련된 뇌 영역의 부피가 줄어드는 것과 관련이 있는 것으로 나타났다.

수면과 알츠하이머병 사이의 연관성은 이미 여러 연구를 통해 제기되어 왔지만, 새로운 연구에서는 수면의 질, 특히 깊은 수면 단계가 알츠하이머병과 어떤 관련이 있는지를 더욱 구체적으로 분석하였다.

‘Journal of Clinical Sleep Medicine’에 발표된 이번 연구는, 수면 구조(sleep architecture)와 알츠하이머병과 관련된 뇌 영역의 변화 간의 관계를 집중적으로 살펴보았다.

수면 구조란, 우리가 잠을 자는 동안 뇌가 거치는 여러 수면 단계(NREM, REM 등)를 의미하는데, 연구 결과에 따르면, 특정 깊은 수면 단계의 감소가 알츠하이머병과 관련된 뇌 부위의 부피 감소와 연관되어 있는 것으로 나타났다.

알츠하이머병은 아직 효과적인 치료법이 많지 않고, 유병률도 점점 증가하고 있어 위험요인을 미리 파악하고 예방할 수 있는 생활습관을 관리하는 것이 매우 중요하다. 이번 연구는 건강한 수면습관이 알츠하이머병 예방에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.

건강한 식단이 이명 위험 낮출 수 있어: 과일 · 섬유질 · 유제품 · 카페인 섭취가 이명 예방에 도움

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 전 세계적으로 약 7억 4천만 명이 이명(tinnitus)을 경험하고 있다.
- 이명은 아직 완치법이 없지만, 이전 연구들에 따르면 건강한 식습관을 포함한 생활습관 개선을 통해 발병 위험을 줄일 수 있는 방법들이 존재한다.
- 최근 발표된 새로운 연구에 따르면, 과일,식이섬유, 유제품, 그리고 카페인 섭취를 늘리는 것이 이명 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다고 보고되었다.

이명의 원인은 다양하다. 대표적으로 청력 손실, 중이염, 갑상선 이상, 그리고 메니에르병 같은 내이질환이 이명을 유발할 수 있다.

아직 이명을 완치할 수 있는 치료법은 없지만, 생활습관을 통해 위험을 줄일 수 있는 방법들이 일부 연구에서 제시되어 왔다. 기존 연구에서는, 소음 노출 줄이기(콘서트나 공구 사용 시 귀 보호), 스트레스 관리, 충분한 수면, 혈압 및 콜레스테롤 관리 등이 이명 예방에 도움된다고 보고되었다.

또한, 건강한 식단이 이명 위험을 낮출 수 있다는 연구도 점차 주목받고 있다. 2020년 2월 발표된 한 연구에서는 비타민 B12와 단백질 섭취량이 높을수록 이명 위험이 감소한다고 밝혔고, 2024년 12월 발표된 연구에서는 참치, 흰살 생선, 조개류 섭취가 여성의 지속성 이명 위험을 낮춘다는 결과도 나왔다.

그리고 최근 'BMJ Open'에 발표된 새로운 연구에서는 과일, 섬유질, 유제품, 카페인 섭취를 늘리는 것이 이명 위험을 줄이는데 도움이 될 수 있다고 보고했다.

연구진은 “식이 선택이 이명 발병에 영향을 줄 수 있으며, 식단 개선은 누구나 시도할 수 있는 비교적 간단한 예방 전략”이라고 강조했다.

치매 환자 32%, 청력 손실과 연관 가능성 있어

Written by Katharine Lang on Medical News Today

- 청력 손실은 전 세계적으로 흔하며, 그 발생률은 나이가 들수록 증가하여 60세 이상 인구의 약 3분의 1이 청력 손실을 겪고 있다.
- 여러 연구들은 청력 손실이 치매 발병 위험 증가와 관련이 있음을 보여주었다.
- 최근 고령자를 대상으로 한 연구에서는 청력 손실이 치매 위험을 거의 3분의 1까지 증가시킬 수 있다고 밝혔다.
- 연구자들은 청력 손실을 치료하면 많은 고령자들에게서 치매 발병을 지연시키거나 심지어 예방할 수도 있다고 제안한다.

미국 국립청각 및 의사소통장애 연구소(National Institutes on Deafness and Other Communication Disorders)에 따르면, 18세 이상 미국인의 약 15%가 청각에 문제를 겪고 있다고 보고하고 있다. 65~74세 인구의 22%, 75세 이상 인구의 55%는 청력 손실이 장애 수준에 해당한다.

여러 연구들은 청력 손실이 인지 저하, 인지장애 및 치매의 위험을 증가시킬 수 있음을 시사하고 있으며, 또한 인지 저하 위험이 높은 사람들의 경우, 보청기가 이러한 위험을 줄일 수 있다는 일부 근거도 있다.

존스홉킨스 블룸버그 공중보건대학(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)의 연구팀이 주도한 새로운 연구는, 중등도 청력 손실이 치매 위험을 약 17% 증가시키고, 경도 청력 손실도 16% 증가시킬 수 있다는 사실을 밝혔다. 이 연구는 학술지 'JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery'에 발표되었다.