

Brain & Mind

B&M News

- 치매 증상 시작 후 진단까지 평균 3.5년
- 치매 사례 32%가 난청과 연관될 수 있다
 - 알츠하이머병 진행을 늦추는 약물, 실제 외래에서 사용해도 안전하고 효과적
- 앉아 있는 시간을 줄이자! - 알츠하이머병 위험 감소의 핵심
- 몸이 급격히 늙기 시작하는 전환점 발견 - 50세 전후 노화 관련 단백질 발현 증가
- 하루 7,000보만 걸어도 건강에 도움

치매 증상 시작 후 진단까지 평균 3.5년

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

치매는 알츠하이머병과 같이 기억력, 사고력, 의사소통 능력에 영향을 미치는 여러 질환을 포함하는 포괄적 용어로, 세계보건기구(WHO)에 따르면, 2021년 전 세계적으로 약 5,700만 명이 치매를 앓고 있었다.

현재 치매의 원인을 확인할 수 있는 단일 검사는 존재하지 않으며, 또한 일부 환자의 경우, 초기 단계에서 증상이 매우 미묘하게 나타나기 때문에 의사가 완전한 진단을 내리기가 어렵다.

최근 몇 년 동안 연구자들은 의사가 치매를 가능한 한 조기에 발견하고 진단할 수 있도록 돕는 새로운 방법을 찾는 데 주력해 왔다.

영국 유니버시티 칼리지 런던(University College London) 뇌과학부 정신의학과 부교수 Vasiliki Orgeta 박사가 제1저자로 참여한 이번 연구는 'International Journal of Geriatric Psychiatry(<https://doi.org/10.1002/gps.70129>)'에 최근 게재되었으며, 연구 결과 치매 환자는 증상 발현 후 평균 3.5년 만에 진단받는 것으로 나타났다. 조기 발병 치매 환자의 경우에는 이 기간이 평균 4.1년으로 더 길었다.

치매 사례 32%가 난청과 연관될 수 있다

Written by Katharine Lang on on Medical News Today

미국 국립난청·의사소통장애연구소(National Institutes on Deafness and Other Communication Disorders)에 따르면, 미국 성인(18세 이상)의 약 15%가 청력 문제를 호소한다. 이 중 65~74세의 22%, 75세 이상에서는 55%가 일상에 지장을 줄 정도의 난청(중증 난청)을 겪는다.

여러 연구에서 난청이 인지 저하, 인지장애, 그리고 치매 위험을 높일 수 있다는 결과가 제시되었다. 또한 인지 저하 위험이 높은 사람의 경우, 보청기 사용이 그 위험을 줄일 수 있다는 일부 근거도 있다.

미국 존스홉킨스 블룸버그 공중보건대학 연구진이 주도한 새로운 연구에서는, 중등도 난청이 치매 위험을 약 17% 높이고, 경도 난청도 약 16% 높이는 것으로 나타났다.

이 연구는 'JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery(<https://doi.org/10.1001/jamaoto.2025.0192>)'에 발표되었다.

알츠하이머병 진행을 늦추는 약물, 실제 외래에서 사용해도 안전하고 효과적

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

현재 알츠하이머병을 완전히 치료할 수 있는 방법은 없지만, 최근 몇 년 사이 질병의 증상을 조절하고 진행 속도를 늦추는 새로운 약물들이 도입되고 있다.

그 중 하나가 레카네맵(lecanevab)이며, 상품명은 'Leqembi'로 2023년 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다.

모든 약물과 마찬가지로 레카네맵도 두통, 어지럼증, 근육통, 시야 흐림과 같은 부작용이 있을 수 있다. 또한 뇌 부종이나 출혈 등 심각한 부작용인 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)이 나타날 가능성도 있다.

최근 'JAMA Neurology(<https://doi:10.1001/jamaneurol.2025.1232>)'에 발표된 새로운 연구는, 매우 경미하거나 정도의 알츠하이머 환자를 대상으로 실제 외래 임상 진료 환경에서 레카네맵을 사용했을 때도 clarity AD의 결과와 동일하게, ARIA와 같은 심각한 이상 반응이 흔하지 않고 외래 진료에서도 이 약물을 이용해 치료하고 환자를 관리하는 것이 가능함을 재확인했다.

앉아 있는 시간을 줄이자! – 알츠하이머병 위험 감소의 핵심

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

이전 연구에 따르면, 건강한 식단 섭취, 금연, 충분한 수면, 규칙적인 운동 등 특정 생활습관요인이 알츠하이머병 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다. 현재 전 세계적으로 약 3,200만 명이 이 형태의 치매를 앓고 있다.

미국 피츠버그대학교 의과대학 신경과 조교수 Marissa A. Gogniat 박사는,

“현재 알츠하이머병을 완전히 치료할 수 있는 방법은 없습니다. 따라서 알츠하이머병을 예방할 수 있는 수정 가능한 건강 요인을 찾는 것은 매우 중요한 과제입니다.”라고 말한다.

Gogniat 박사가 주저자로 참여한 이번 연구는, 노인들이 앉아 있거나 누워 있는 등 좌식 생활에 더 많은 시간을 보낼수록, 운동량과 무관하게 인지 기능 저하 및 알츠하이머병 발병과 연관된 뇌 부위 위축 위험이 높아진다고 보고했다.

이번 연구 결과는 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association(<https://doi.org/10.1002/alz.70157>)'에 최근 게재되었다.

몸이 급격히 늙기 시작하는 전환점 발견 – 50세 전후 노화 관련 단백질 발현 증가

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

우리가 노화를 늦추기 위해 노력할 수는 있지만, 현재로서는 이를 완전히 막을 수 없다. 그러나 과거 연구들에 따르면 노화는 항상 일정한 속도로 일어나지 않는다. 대신, 특정 시기에 신체가 급격히 늙는 ‘노화 폭발기(burst of aging)’가 있을 수 있으며, 이전 연구에서는 약 44세와 60세 전후에 이런 현상이 나타날 수 있다고 보고했다. 또한, 특히 장기에 미치는 영향 등 노화 과정 전반에 대해서는 여전히 많은 부분이 미해결 상태로 남아 있다.

중국과학원 재생의학 연구자인 Guang-Hui Liu 박사는 최근 Cell 저널에 발표된 새로운 연구의 교신저자로, 이 연구에서는 신체 내 노화 관련 단백질 변화를 분석함으로써 시간이 지남에 따라 장기와 조직이 어떻게 노화하는지를 더 명확하게 파악할 수 있었고, 특히 약 50세 전후에 노화 속도가 가속화되는 현상을 발견했다. 또한, 이러한 단백질들 중 심혈관질환과 지방간질환 등과 관련된 48개의 단백질 발현이 나이가 들수록 증가하는 것으로 나타났다[Cell(<https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.047>)].

하루 7,000보만 걸어도 건강에 도움

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

지난 몇 년 동안 건강을 유지하기 위해 하루 1만 보를 걷는 것의 중요성이 강조돼 왔다.

많은 사람들이 스마트워치, 애플워치(Apple Watch) 같은 피트니스 트래커나, 구글 핏(Google Fit), 애플 헬스(Apple Health)와 같은 스마트폰 앱을 사용해 자신의 하루 걸음 수를 기록한다.

기존 연구에서는 하루 최소 1만 보를 걷는 것이 심혈관질환, 2형 당뇨병, 치매, 비만, 정신건강 문제 위험을 줄이는 것과 연관이 있다고 보고했다.

그런데 최근 ‘The Lancet Public Health 저널([https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(25\)00164-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00164-1))’에 발표된 새로운 연구는 하루 7,000보만 걸어도 심장병, 2형 당뇨병, 치매, 암, 우울증, 그리고 모든 원인 사망 위험을 줄일 수 있다고 밝혔다.

또한 하루 약 4,000보를 걷는 것만으로도 활동량이 매우 적거나 하루 약 2,000보만 걷는 사람보다 더 많은 건강 상의 이점을 얻을 수 있다는 사실도 확인됐다.

