

Brain & Mind

Q&A

외래 진료실에서 빠르게 감별하는 건망증과 초기 치매, 어떻게 접근할까?



외래 진료실에서 빠르게 감별하는 건망증과 초기 치매, 어떻게 접근할까?

Q1. 단순 노화 관련 기억 감퇴와 초기 치매를 임상적으로 구별하는 주요 감별 포인트는 무엇일까?

기억력이 점점 떨어지면서 일상 생활을 방해한다면 알츠하이머병 또는 기타 치매의 증상일 수 있다. 다음은 치매 초기 징후 10가지와 단순 노화로 인한 일반적인 변화를 비교한 것으로, 일상 생활 능력이 유지되는지 여부가 핵심적인 구별점이다.

구분	치매의 10가지 초기 징후(주의 필요)	단순 노화로 인한 일반적인 변화(정상)
1	일상 생활을 방해하는 기억력 상실: 최근 학습 정보를 잊고, 같은 질문을 반복함. 메모나 가족에게 점점 더 의존함.	가끔 이름이나 약속을 잊어버리지만, 나중에 기억해 냄.
2	계획 수립 또는 문제 해결의 어려움: 익숙한 요리법을 따르거나 월별 청구서를 관리하는 등 계획 및 문제 해결에 어려움이 있음.	가계부 관리 등 복잡한 일 처리 시 가끔 실수를 함.
3	익숙한 과제 수행의 어려움: 익숙한 곳으로 운전하기, 장보기 목록 정리, 좋아하는 게임 규칙 이해하기 등 익숙한 일을 완성하기 어려움.	전자레인지 설정이나 TV 녹화 등 가끔 도움이 필요함.
4	시간 또는 장소에 대한 혼동: 날짜, 계절, 시간의 흐름을 잃거나, 자신이 어디에 있는지/어떻게 왔는지 잊어버림.	요일 등 단기적인 혼동이 있지만, 곧 다시 알아차림.
5	시각 이미지 및 공간 관계 이해의 어려움: 거리를 판단하거나 색깔/대비를 구별하기 어려워 운전 시 문제 발생함.	백내장 등 안과적 문제가 있을 수 있음.
6	말하거나 글을 쓰는 데 새로운 문제 발생: 대화 중 단어 찾기에 어려움이 있고, 적절치 않은 단어를 사용하거나 사물을 틀린 이름으로 부름.	가끔 적절한 단어를 찾는 데 어려움을 겪음.
7	물건을 잘못 두고 되짚어 찾는 능력 상실: 물건을 엉뚱한 장소에 두고, 잃어버린 물건을 되짚어 찾을 수 없음.	물건을 어디다 두었는지 잊지만, 다시 되짚어 생각하여 찾아낼 수 있음.
8	판단력 저하 또는 감소: 재정적 판단을 잘못하거나, 개인 위생 관리에 소홀해지는 등 판단력이 저하됨.	가끔 실수를 함(예: 차의 오일 교환을 깜빡하는 등).
9	직장/사회 활동으로부터의 철화: 대화에 어려움을 느끼거나, 사회 활동이나 취미 활동 참여를 자발적으로 줄임.	가족 관련 일이나 사회 생활에 참여하는 것을 이따금 내키지 않아 함.
10	기분과 성격의 변화: 혼란, 의심, 우울, 불안 등을 보이며, 특히 편안하지 않은 장소에서 쉽게 화를 내거나 흥분함.	자신만의 정해진 규칙을 만들고, 그 일과가 흐트러지면 예민하게 반응하고 불편해 할 수 있음.

Q2. 외래 진료실에서 환자의 인지 기능을 신속하게 선별할 수 있는 대표적인 평가 도구에는 어떤 것들이 있나?

인지 저하가 의심될 때 가장 먼저 시행되는 선별 검사(screening test)는 시간과 비용 부담이 적으면서 인지 기능 전반을 평가하는 도구이다. 이 중 가장 널리 사용되는 두 가지 검사는 다음과 같다.

몬트리올인지기능 검사(MoCA) vs. 간이정신상태 검사(MMSE) 비교

구분	간이정신상태 검사(MMSE)	몬트리올인지기능 검사(MoCA)
도입 시기	1975년	2005년
주요 목적	전반적인 치매 선별(중등도 치매 진단에 더 유용)	경도인지장애(MCI) 및 초기 치매 식별을 위해 특별히 설계
민감도	상대적으로 낮음(초기 징후를 놓칠 수 있음)	매우 높음(미세한 인지 저하 감지에 유리)
문항/만점	30문항, 30점 만점	30문항, 30점 만점
검사 시간	5~10분(매우 신속함)	10~15분(MMSE보다 약간 김)
인지장애 시사 점수	24점 미만	26점 미만
주요 평가 영역	지남력, 기억 등록/회상, 주의 집중, 언어, 복잡한 다각형 그리기 등	실행 기능(시계 그리기), 주의 집중력, 작업 기억, 추상적 사고, 언어 유창성 등 더 복합적인 영역
검사 형태	펜과 종이	펜과 종이 또는 앱/온라인
저작권/교육	저작권 소유자의 공식 양식 필요	시행 전 의료 전문가의 무료 교육 권장
보조 기능	여러 언어 번역본이 있음	여러 언어 번역본과 함께, 시/청각 손상자용 버전 및 저학력자 보정 버전이 있음

Q3. MoCA의 임상적 특징점은 무엇이며, MMSE와 비교하여 차별화된 의의는 무엇인가?

****MoCA(몬트리올인지기능 검사)****는 경도인지장애나 초기 치매 증상이 있는 사람들에게 특히 유용하다. 특히 기존의 간이 검사(MMSE 등)보다 민감도가 높아 미세한 인지 기능 저하, 특히 실행 기능, 주의력, 추상적 사고와 같은 복합적인 영역의 문제를 조기에 포착하는 데 매우 효과적이다.

MoCA 검사는 다음과 같은 인지 기능 저하가 의심되거나 진단된 사람들을 대상으로 한다.

- **연령대:** 55세에서 85세 사이의 개인
- **주요 증상:**
 - 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 증상이 있는 사람
 - 초기 치매를 앓고 있는 사람

• 특정 질환:

- 경미한 치매를 앓고 있는 사람
- 파킨슨병 관련 치매를 앓고 있는 사람
- 알츠하이머병을 앓고 있는 사람

MoCA 검사의 주요 특징

1. 다양한 인지 영역 평가: 단순 기억력뿐만 아니라 시각 연합 검사(VAT), 그림 복제(시계 그리기), 계산 및 문해력 등 다양한 영역을 포함하여 종합적인 인지 기능을 약 10분 만에 평가한다.
2. 맞춤형 검사 환경 제공: 종이 검사뿐만 아니라 온라인 앱을 통해 검사가 가능하며, 시각 또는 청각 장애인용 버전이 따로 마련되어 접근성이 높다.
3. 학력 보정 및 세분화된 점수 해석: 낮은 학력 수준을 가진 사람들을 위해 점수 조절이 가능하며, 점수 범위에 따라 경도(18~25점), 중등도(10~17점), 심각(10점 미만) 인지장애로 결과를 세분화하여 해석할 수 있다.

Q4. MoCA 검사는 구체적으로 어떤 항목들로 구성되어 있으며, 중점적으로 평가하는 핵심 인지 영역은 무엇인가?

MoCA 검사는 인지 기능의 다양한 측면을 검사하기 위해 여러 섹션으로 구성되어 있다.

- 기억력 설문(A memory questionnaire): 개인적 및 비개인적 기억을 회상하는 능력을 평가한다.
- 시각 연합 검사(A visual association test, VAT):
 - 그림(예: 우산을 들고 있는 원숭이)에서 사물을 식별하고, 사물들이 어떻게 상호작용하는지 설명하는 검사이다.
 - 나중에 그림에 어떤 사물이 있었는지 회상해야 할 수도 있다.
- 그리기 검사(A drawing test): 특정 시간을 나타내는 시계 얼굴과 같은 그림을 따라 그리도록 요청하는 검사이다.
- 계산 및 문해력 검사(Calculation and literacy tests): 간단한 덧셈을 풀거나, 철자 및 읽기 테스트를 수행한다.

Q5. MoCA 점수는 어떻게 계산되며, 결과에 따른 해석은 어떻게 하나?

MoCA 검사는 최대 30점 만점이며, 점수 범위에 따라 인지 기능 상태를 평가한다. MoCA는 선별 검사이므로, 여기서 낮은 점수가 나왔다면 인지 저하의 원인과 심각도를 정확히 파악하기 위한 추가적인 진단 과정이 필요하다.

점수 범위	인지 상태 해석
26점 이상	정상으로 간주
25점 이하	어느 정도의 인지장애를 시사
18~25점	경도 인지장애(mild cognitive impairment)
10~17점	중등도 인지장애(moderate cognitive impairment)
10점 미만	심각한 인지장애(severe cognitive impairment)

참고: 개인의 학력 수준은 점수에 영향을 미칠 수 있으며, 전문가들은 학력에 따라 점수를 조정할 수 있다.