

# Brain & Mind

## B&M News

- 알코올과 치매 위험의 연관성: 소량도 안전하지 않다
  - 치매 진단 후 신체 활동도 사망 위험 20% 감소
  - 등을 대고 자는 수면이 알츠하이머병 위험을 증가
    - 콜레스테롤 변동이 치매의 징후
- 낮은 칼슘 및 마그네슘 수치가 인지 기능 저하와 관련
  - 낮 동안 과도한 졸음은 치매 위험 증가의 신호
- 퀘양이나 이부프로펜에 의한 장 손상으로 파킨슨병 위험의 증가

## 알코올과 치매 위험의 연관성: 소량도 안전하지 않다

Written by Robby Berman on Medical News Today

- 새로운 연구에 따르면 알코올을 소비하는 사람들 사이에서 치매 위험을 증가시키지 않는 알코올 섭취 수준은 존재하지 않는 것으로 나타났다.
- 유전자 분석을 기반으로 한 통계적 방법을 사용하여, 연구 저자들은 알코올 소비량이 많을수록 치매 위험이 비례적으로 증가한다고 결론지었다.
- 이 연구는 적당한 음주가 치매를 예방할 수 있다는 기존 연구 결과와 상반된다.

새로운 연구에 따르면, 알코올 소비와 치매 위험 사이에는 안전한 수준이 없다고 합니다.

이 연구는 eClinicalMedicine에 게재되었으며, 알코올 소비량과 치매 발병 위험 사이에 선형 관계가 있다고 결론짓고 있습니다.

이전 연구에서는 적당한 음주가 보호 효과가 있다고 제안했지만, 이번 연구는 이것이 '금주자 편향' 때문일 가능성이 높다고 밝혔습니다.

## 치매 진단 후 신체 활동도 사망 위험 20% 감소

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 운동은 많은 건강상의 이점과 관련이 있으며, 연구자들은 신체 활동이 특정 하위 집단에 미치는 영향을 발견하는데 관심이 있습니다.
- 한 연구에 따르면 치매 진단을 받은 후에도 신체 활동을 유지하거나 시작하는 사람들은 모든 원인에 의한 사망 위험이 감소할 수 있습니다.
- 치매 환자는 의사, 물리 치료사 및 간병인과 협력하여 유익한 신체 활동 루틴을 구현할 수 있습니다.

신체 활동은 체중 관리에서 심장병 위험 감소에 이르기까지 다양한 이점을 제공합니다. 또한 치매 발병 위험을 낮추는데 도움이 될 수 있습니다. 또 다른 관심 분야는 이미 치매 진단을 받은 후 신체 활동의 효과입니다.

'British Journal of Sports Medicine'에 게재된 연구는 치매 환자의 신체 활동 수준과 변화가 사망률에 미치는 영향을 평가했습니다. 연구자들은 진단 전후에 신체 활동을 유지하는 것이 가장 낮은 사망 위험과 관련이 있음을 발견했습니다. 모든 수준의 지속적인 신체 활동은 사망 위험 감소와 관련이 있었습니다.

또한 연구자들은 치매 진단 후 신체 활동을 시작하면 사망 위험을 20% 이상 줄일 수 있다고 밝혔습니다. 이 결과는 치매 환자에게 운동을 적극 권장해야 함을 시사합니다.

## 등을 대고 자는 수면이 알츠하이머병 위험을 증가

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 모든 사람은 옆으로, 엎드려서, 또는 등을 대고 자는 등 선호하는 수면 자세가 있습니다.
- 이전 연구에서는 등을 대고 자는 것이 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다.
- 최근 2024년 알츠하이머병 협회 국제 회의에서 발표된 새로운 연구는 등을 대고 자는 수면 자세와 신경퇴행 사이의 가능한 연관성을 발견했습니다.

모든 사람은 선호하는 수면 자세가 있습니다. 일부 사람들은 옆으로 자고, 일부는 엎드려 자며, 다른 사람들은 등을 대고 자는 자세를 취합니다.

이전 연구에서는 등을 대고 자는 것이 고혈압과 폐쇄성 수면무호흡증과 같은 잠재적인 부정적인 건강 효과와 관련이 있으며, 야간 위식도역류질환이 있거나 임신 중인 사람들에게는 권장되지 않는다고 밝혔습니다.

최근 2024년 알츠하이머병 협회 국제 회의에서 발표된 새로운 연구는 등을 대고 자는 수면 자세와 신경퇴행 사이의 가능한 연관성을 발견했습니다.

## 콜레스테롤 변동이 치매의 징후

Written by Katharine Lang on Medical News Today

- 콜레스테롤은 간에서 생성되며 음식으로 섭취되는 필수 지방 물질입니다.
- 그러나 높은 콜레스테롤 수치는 관상동맥 심장병을 포함한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 새로운 연구에 따르면, 노인에서 변동하는 콜레스테롤 수치가 치매 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 연구자들은 연간 콜레스테롤 추적이 노인의 치매 및 인지 저하 위험을 평가하는데 사용될 수 있다고 제안합니다.

콜레스테롤은 세포막, 일부 호르몬, 지방 소화를 위한 담즙염을 만드는데 필수적인 물질입니다. 고기, 해산물, 가금류, 계란, 유제품 등 많은 음식을 통해 섭취할 수 있습니다.

미국질병통제예방센터(CDC)는 콜레스테롤이 높은 음식을 과도하게 섭취하지 말라고 권고합니다. 이는 심장마비와 뇌졸중과 같은 건강 문제를 일으킬 수 있기 때문입니다.

높은 콜레스테롤은 식이 및 생활습관 요인으로 인해 발생할 수 있지만, 유전, 특정 건강 상태 및 일부 약물의 결과일 수도 있습니다. CDC에 따르면 미국 성인 약 2,500만 명이 240 mg/dL 이상의 높은 콜레스테롤을 가지고 있습니다.

새로운 연구에 따르면 높은 콜레스테롤뿐만 아니라 변동하는 콜레스테롤 수치도 건강에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 연구는 2024년 미국심장협회 과학 세션에서 발표되었으며, 연구에 따르면 노인에서 연간 콜레스테롤 수치 변화가 치매 및 인지 저하 위험을 증가시킬 수 있습니다.

## 낮은 칼슘 및 마그네슘 수치가 인지 기능 저하와 관련

Written by Tim Newman on Medical News Today

- 인지 저하는 노화의 정상적인 부분이지만, 모든 사람이 같은 속도로 저하되는 것은 아닙니다.
- 새로운 연구는 혈중 마그네슘과 칼슘 수치와 인지 기능 사이의 관계를 조사합니다.
- 연구자들은 이러한 미량 영양소의 낮은 수치가 60세 이상의 사람들에서 더 나쁜 인지 기능과 관련이 있다고 결론지었습니다.

‘Nutrients’ 저널에 게재된 새로운 연구는 노인의 인지 기능과 관련된 요인을 조사합니다.

이전 연구와 일치하게, 이 연구는 나이, 체질량 지수(BMI), 만성 심부전이 사고 능력의 변화와 관련이 있음을 발견했습니다.

또한, 낮은 혈중 칼슘 및 마그네슘 수치가 인지 테스트에서 더 나쁜 인지 기능과 관련이 있음을 보여주었습니다.

## 낮 동안 과도한 졸음은 치매 위험 증가의 신호

Written by Finn Cohen on Medical News Today

- 낮 동안 과도하게 졸리거나 심각한 수면 문제를 겪는 노인들은 운동 인지 위험증후군(motoric cognitive risk syndrome, MCR)이라는 전치매 상태의 위험이 더 높습니다.
- MCR은 느린 보행 속도와 일부 기억 문제로 특징지어지며, 낮 동안 과도한 졸음과 활동에 대한 열의 부족을 보이는 “수면이 부족한” 65세 이상의 사람들에서 더 많이 발견되었습니다.
- 인과 관계가 확립된 것은 아니지만, 수면 문제와 MCR 사이의 연관성은 더 많은 연구가 필요하다고 전문가들은 말합니다. 중년에서 유사한 수면 장애를 겪는 사람들은 이를 조기에 해결해야 합니다.

낮 동안 과도하게 졸리거나 심각한 수면 문제를 겪는 노인들은 운동 인지 위험증후군(MCR)이라는 전치매 상태의 위험이 더 높다는 연구 결과가 나왔습니다. 이 연구는 미국신경학회(American Academy of Neurology)의 의학 저널인 ‘Neurology’에 게재되었습니다.

MCR은 느린 보행 속도와 일부 기억 문제로 특징지어지며, 낮 동안 과도한 졸음과 활동에 대한 열의 부족을 보이는 “수면이 부족한” 65세 이상의 사람들에서 더 많이 발견되었습니다. 직접적인 인과 관계는 없지만, 저자들은 이 연관성에 대한 추가 연구가 필요하다고 언급했습니다.

## 궤양이나 이부프로펜에 의한 장 손상으로 파킨슨병 위험의 증가

Written by Katharine Lang on Medical News Today

- 파킨슨병의 정확한 원인은 불분명하지만, 전문가들은 유전적 변화와 독소와 같은 환경적 요인이 파킨슨병 발병 위험을 높이는 데 역할을 한다고 믿고 있습니다.
- 최근 연구에 따르면 장이 파킨슨병 발병에 중요한 역할을 할 수 있다고 합니다.
- 새로운 연구에서는 상부위장관 손상이 파킨슨병 위험을 76% 증가시킬 수 있다고 제안하고 있습니다.

파킨슨 재단에 따르면 미국에서 약 100만 명이 파킨슨병을 앓고 있으며, 이 숫자는 2030년까지 120만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 나이는 파킨슨병의 가장 중요한 위험요소이지만, 약 4%의 사례는 50세 미만에서 진단됩니다.

전문가들은 이 질환의 정확한 원인을 알지 못하지만, 일부 사례는 특정 유전자 변이가 파킨슨병을 유발하는 유전적 요인으로 생각됩니다. 그러나 대부분의 사례는 유전적 및 환경적 요인의 조합으로 발생하는 것으로 보입니다.

장과 장 내 미생물이 파킨슨병 발병에 중요한 역할을 한다는 것을 시사하는 많은 증거가 있습니다.

연구에 따르면 위식도역류질환(GERD), 소화성 궤양, 이부프로펜과 같은 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs)의 장기 사용으로 인한 상부위장관 손상이 있는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 파킨슨병 위험이 76% 더 높을 수 있다고 합니다.

이 연구는 Beth Israel Deaconess Medical Center(BIDMC)의 연구원들이 주도했으며, JAMA Network Open에 게재되었습니다.

