

Brain & Mind

B&M News

- Leqembi(레카네맵)의 월간 정기 유지요법, 미국 FDA 승인
 - 운동과 깊은 수면으로 24시간 지속적인 뇌 boost 효과
 - 중강도의 운동이 식욕 감소에 도움
- 스파클링 워터를 마시면 체중 감소에 도움이 될까?
 - ‘조기’ 간헐적 단식이 복부 지방 감소에 도움
- 미세플라스틱이 뇌에 축적되어 치매 위험요인이 될 수 있을까?
 - 기억장애, 치매에 영향을 미치는 입 속 박테리아

Leqembi(레카네맵)의 월간 정기 유지요법, 미국 FDA 승인

31 Jan 2025, ALZFORUM

- 레카네맵(lecanevab)에 대한 IV 유지 용량을 투여하면 주입 센터 방문 횟수가 절반으로 줄어든다.
- FDA는 레카네맵의 피하 유지 용량을 8월까지 결정할 예정이다.
- 일부 환자들은 종료일이 정해져 있는 도나네맵(donanemab)을 선택하고 있다.

미국식품의약국(FDA)은 1월 27일 에자이(Eisai)와 바이오젠(Biogen)의 레카네맵 IV 유지 투여 신청을 승인했다. 이전에는 라벨에 격주 IV 투여가 명시되어 있었다. 새로운 결정에 따라, 의사는 환자가 18개월의 치료를 완료한 후 월간 투여로 전환하는 것을 고려할 수 있다.

레카네맵은 2년 전 미국에서 처음 승인돼 1년 반 동안 보험이 적용됐다. 그 이후로 클리닉에서 AD 환자를 진단, 주입 및 모니터링하기 위한 새로운 절차를 마련하는 동안 그 사용이 서서히 증가했다.

에자이 연구자들은 약물의 이점을 유지하려면 플라크 제거 후 레카네맵을 사용한 지속적인 치료가 필요할 것이라고 믿고 있으며, 그들의 모델링에서는 월별 유지 용량을 투여하면 18개월 후에도 바이오마커가 동일한 수준으로 유지될 것으로 예상한다. 이를 토대로 에자이는 8개월 전 FDA에 유지 투여 신청서를 제출했다.

운동과 깊은 수면으로 24시간 지속적인 뇌 boost 효과

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 규칙적인 운동은 뇌 건강에 좋다.
- 과거 연구에 따르면 신체 활동을 통해 뇌가 받는 'Boost'는 일반적으로 처음 10~20분 내에 최고조에 이른다고 알려져 왔다.
- University College London의 연구자들은 운동으로 인한 인지 능력 향상이 실제로 24시간 동안 지속될 수 있다는 사실을 발견했다.
- 과학자들은 또한 덜 잤아 있는 것과 6시간 이상의 수면을 취하는 것이 다음날 더 나은 기억력 테스트 점수와 연관되어 있다고 보고했다.

규칙적인 운동이 뇌 건강을 포함한 전반적인 건강에 좋다는 증거가 있다.

과거 연구에 따르면 신체 활동은 알츠하이머병을 포함한 치매 및 인지 저하에 대한 위험을 더 광범위하게 낮추는데 도움이 될 수 있는데, 운동을 통해 뇌가 받는 'Boost'는 일반적으로 처음 10~20분 내에 최고조에 달한다고 알려져 있었다.

최근, 영국 University College London의 연구자들은 운동과 관련된 인지 능력 향상이 실제로 24시간 동안 지속될 수 있음을 발견했다. 과학자들은 또한 덜 잤아 있는 것과 6시간 이상의 수면, 특히 추가적인 REM 수면과 깊은 수면을 취하는 것이 다음날 더 나은 기억력 테스트 점수와 연관되어 있다고 보고했다.

이 연구는 최근 'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity'에 게재되었다.

중강도의 운동이 식욕 감소에 도움

Written by Robby Berman on Medical News Today

- 한 시간 동안 적당한 강도의 운동을 하면 과체중 및 비만 환자들의 배고픔이 감소한다는 새로운 연구 결과가 나왔다.
- 연구자들은 운동 중 근육에서 생성되는 특정 식욕 관련 펩타이드 수준의 변화로 인해 배고픔이 감소한다고 생각한다.
- 연구에 따르면 과체중 또는 비만인 사람들의 신체는 운동에 따라 다르게 반응하며 배고픔 억제는 이러한 독특한 효과 중 하나일 수 있다.
- GLP-1 약물을 사용한 것처럼 배고픔이 크게 감소하지는 않지만, 운동은 과체중 및 비만인 사람들에게 식욕 조절에 도움이 되는 것으로 나타났다.

이란과 호주 연구팀이 실시한 새로운 연구에 따르면, 중강도의 운동이 과체중 및 비만인 사람들의 식욕을 감소시키는 것으로 나타났다. 이는 운동을 통해 더 많이 먹을 수 있기를 바라는 사람들에게는 실망스러운 소식일 수 있지만, 식욕 감소가 체중 감량 목표 달성을 조금 더 쉽게 할 수 있다는 긍정적인 측면도 있다.

이 연구는 'Physiological Reports' 저널에 실렸으며, 한 시간 동안의 운동 세션 후 식욕 억제와 관련된 단백질이 즉시 증가했으며, 동시에 식욕을 자극하는 호르몬의 감소가 관찰되었다. 이 펩타이드는 신체 활동 중 근육에서 생성된다.

식욕 억제제로 증가한 단백질은 사이토카인 단백질 인터루킨 6(IL-6)과 호르몬 유사 단백질 아이리신이었으며, 자극제 역할을 하는 호르몬 신경펩타이드 Y(NPY)의 수치는 감소했다. 연구자들은 또한 인터루킨 7(IL-7)과 렙틴의 반응을 추적했지만, 운동으로 인해 두 단백질의 수치에서 눈에 띄는 변화는 없었다.

연구 참여자들은 운동 후 식욕 감소를 보고했다. 이 연구는 이란에서 비만인 11명의 남성을 대상으로 했으며, 이들은 대사적으로 건강하고, 비흡연자이며, 약물을 복용하지 않으며, 국제 신체 활동 설문지에 따라 비활동적인 생활을 하고 있었다.

참여자들은 최소 7일 간격으로 두 번의 무작위 교차 시험에 참여했는데, 4시간의 시험에는 식사와 측정이 포함되었으며, 한 시험은 60분의 자전거 운동을 포함하고, 다른 시험은 휴식 기간으로 대체되었다. 운동 없는 시험은 대조군으로 사용되었다.

스파클링 워터를 마시면 체중 감소에 도움이 될까?

Written by Jessica Freeborn on Medical News Today

- 전문가들은 체중 감량에 기여하는 간단한 중재를 찾는데 관심이 있다.
- 최근 보고서에 따르면, 탄산수나 스파클링 워터를 마시는 것이 적혈구의 흡수와 포도당 대사를 증가시켜 체중 감량에 기여할 수 있다.
- 이 생리학적 과정은 신체의 혈액을 여과하는 혈액 투석과 유사하다.
- 체중 감량을 위해 스파클링 워터를 섭취하는 것은 섭취의 위험성과 다른 체중 감량 전략과 함께 검토되어야 한다.

탄산수나 스파클링 워터는 이산화탄소(CO₂)를 포함한 물로 스파클링 워터라고도 불리며, 전문가들은 잠재적인 건강 이점과 단점에 관심을 가지고 있다. 한 가지 관심 분야는 스파클링 워터를 마시는 것이 체중 감량에 어떻게 도움이 될 수 있는지에 있다.

‘BMJ Nutrition, Prevention & Health’에 발표된 한 보고서는 스파클링 워터가 체중 감량에 기여할 수 있는 방법을 논의했다. 이 보고서는 물 속의 CO₂가 포도당 분해와 적혈구에 의한 포도당 흡수를 증가시킨다고 제안하는데, 이는 체중 감량에 기여할 수 있을 것이다.

그러나 이 보고서는 그 효과가 매우 미미하여 탄산수 자체로는 체중 감량에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고도 언급하고 있다. 이 분야에서는 더 많은 연구가 필요하다.

‘조기’ 간헐적 단식이 복부 지방 감소에 도움

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 간헐적 단식은 단기적인 체중 감소를 포함한 잠재적인 건강 상의 이점으로 인해 지난 몇 년 동안 인기를 얻었다.
- 간헐적 단식의 한 가지 방법은 하루에 일정 시간만큼 식사를 하고 남은 시간 동안 단식하는 시간 제한 식사이다.
- 오후 5시 30분부터 다음날 오전 10시까지 단식하는 ‘조기’ 시간 제한 패턴을 따르면 혈당 조절을 개선하고 복부 피하 지방량을 줄이는데 도움이 된다는 새로운 연구 결과가 나왔다.

지난 몇 년간 간헐적 단식이 인기를 얻고 있는 가운데, 연구 결과에 따르면 2형 당뇨병 예방, 체중 감량, 심장 건강 개선, 알츠하이머병 위험 감소 등의 건강 상의 이점을 제공할 수 있다고 한다.

스페인 University of Granada의 Jonatan R. Ruiz, PhD 박사는 최근 ‘Nature Medicine’ 저널에 발표된 새로운 연구의 공동 저자로, “간헐적 단식은 참가자들이 따르기 쉽고 처방하기도 상대적으로 간단한 실용적인 영양 전략입니다.”라고 말했다.

이 연구는 설정된 시간 동안 음식을 섭취하고 나머지 시간 동안 단식하는 ‘조기’ 시간 제한 간헐적 단식 패턴을 따르는 것이 혈당 조절 개선과 피부 바로 아래의 복부 피하 지방을 줄이는데 더 유익하다고 보고했다. 이 단식은 오후 5시부터 다음날 오전 10시까지 이어졌다.

미세플라스틱이 뇌에 축적되어 치매 위험요인이 될 수 있을까?

Written by Corrie Pelc on Medical News Today

- 연구자들은 평균적으로 한 사람이 매년 78,000~211,000개의 미세플라스틱 입자를 섭취한다고 추정한다.
- 이전 연구들은 미세플라스틱과 나노플라스틱이 인간 건강에 해로울 수 있다는 것을 보여주었다.
- 새로운 연구에서는 인간의 뇌가 다른 신체 기관보다 더 높은 농도의 미세플라스틱을 포함하는 경향이 있다는 사실을 발견했다.
- 또한, 연구자들은 치매를 진단받은 사람들의 뇌에서 미세플라스틱이 최대 10배 더 많이 발견된다는 사실도 밝혀냈다.

이전 연구에 따르면 미세플라스틱은 단순히 환경에 해로울 뿐만 아니라 인간 건강에도 영향을 미칠 수 있다. 미세플라스틱은 매우 작은 플라스틱 조각으로, 제조 과정에서 만들어지거나 더 큰 플라스틱 제품이 분해되면서 생성된다.

연구자들은 평균적으로 한 사람이 매년 78,000~211,000개의 미세플라스틱 입자를 섭취한다고 추정한다. 이러한 입자들은 미세플라스틱이 포함된 음식을 섭취하거나 오염된 식수를 마시거나 공기 중에 떠다니는 미세플라스틱을 들이마시는 과정을 통해 체 내로 유입된다.

이전 연구에서는 미세플라스틱이 심장병, 폐질환, 암과 같은 여러 건강 문제의 위험 증가와 관련이 있다는 사실이 밝혀졌다.

University of New Mexico의 Matthew Campen, PhD는 다음과 같이 설명한다.

“지난 반세기 동안 환경 내 미세 및 나노플라스틱(MNPs)의 농도가 기하급수적으로 증가해 왔습니다. 이러한 급격한 증가에도 불구하고, MNPs가 인간 건강에 어떤 잠재적 위험을 초래할 수 있는지에 대한 연구는 아직 부족한 실정입니다. 현재 진행 중인 연구는 이러한 위험을 명확히 밝히는데 필수적이며, 이를 통해 미세플라스틱의 영향을 이해하고 가능한 피해를 예방하거나 완화할 수 있는 전략을 개발하는데 도움이 될 것입니다.”

Campen 박사가 주도한 최신 연구는 저널 'Nature Medicine'에 발표되었으며, 이 연구에서는 뇌에 존재하는 미세플라스틱의 양이 간이나 신장과 같은 다른 장기보다 훨씬 높다는 사실이 밝혀졌다.

또한 연구자들은 치매를 진단받은 사람들의 뇌에서 미세플라스틱이 최대 10배 더 많이 발견된다는 사실을 확인했다.

기억장애, 치매에 영향을 미치는 입 속 박테리아

Written by Paul Ian Cross, PhD on Medical News Today

- 새로운 연구에 따르면, 나이가 들수록 우리 입 속에 살고 있는 박테리아가 인지 기능에 영향을 미칠 수 있다.
- 몇몇 박테리아 종은 다른 박테리아 종보다 잠재적으로 더 해로운 것으로 확인되었으며, 이러한 미생물 중 일부는 기억 상실 및 치매에 영향을 미칠 수 있다.
- 과학자들은 이제 식이요법 및 특정 프리바이오틱스와 함께 구강 건강이 어떻게 인지 저하를 늦추고 알츠하이머병과 같은 질병으로부터 보호하는데 도움이 될 수 있는지 탐구하고 있다.

사람은 나이가 들수록 기억력과 사고력이 저하된다. 노인의 약 15%는 알츠하이머병 및 치매의 주요 위험인자인 경도 인지 장애를 경험한다.

인지 저하와 치매에 대한 우려가 커지고 있으며, 이에 과학자들은 치매의 위험요인들을 더 잘 이해하고 이를 줄이는 방법을 찾기 위해 노력하고 있다. 새롭게 떠오르는 연구 분야 중 하나로, 구강 건강이 뇌 건강에 중요한 역할을 할 수 있다고 알려지고 있다.

새로운 연구에 따르면 입 속에 사는 박테리아는 나이가 들수록 인지 기능에 영향을 미칠 수 있으며, 일부 해로운 박테리아는 치매와 알츠하이머병 발병에 기여할 수 있다고 한다.

연구 결과는 'PNAS Nexus' 저널에 게재되었다.