

COMO SABER SE SOFRO DE HIPOTENSÃO POSTURAL?

(QUEDA DA PRESSÃO ARTERIAL EM PÉ)

1. Você teve algum desmaio ou "apagão" recentemente?

2. Você se sente tonto ou atordoado ao ficar em pé?

3. Você tem distúrbios da visão (escurecimento, pontos pretos) ao ficar em pé?

4. Você tem dificuldade em respirar ao ficar em pé?

5. Você tem moleza, fraqueza nas pernas ao ficar em pé?

6. Você já sentiu dor no pescoço ou dor nos ombros ao ficar em pé?

7. Os sintomas acima melhoram ou desaparecem quando você se senta ou se deita?

8. Os sintomas acima são piores de manhã ou após as refeições?



9. Você sofreu uma queda recentemente?

10. Existem outros sintomas que você costuma sentir quando se levanta ou dentro de 3 a 5 minutos depois de ficar em pé que melhoram quando você se senta ou se deita?

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENIR OS EPISÓDIOS DE HIPOTENSÃO POSTURAL

- **Beba mais água. A desidratação piora a hipotensão.**
- **Aumente UM POUCO o sal na comida (voce pode salpicar um pouco apenas no seu prato)**

- **SEMPRE** levante-se lentamente para que haja tempo do seu coração ajustar a sua pressão arterial.
- Realize exercícios para manter a boa circulação de sangue nas pernas. O sangue acumulado nas pernas ajuda a sua a hipotensão arterial.

- **Evite álcool, pois ele interfere no controle da pressão arterial.**
- **Evite banhos longos com água muito quente. O aumento da temperatura do corpo ajuda a sua pressão arterial cair.**

- **Experimente usar meias elásticas. Elas ajudam a evitar que o sangue fique acumulados nas pernas.**
- **Durma com a cabeceira da cama elevada em 15–23 cm. Use travesseiros, mas tome cuidado para não prejudicar a coluna.**

- **Procure seu médico para discutir se é necessário algum ajuste na medicação.**

Alguma dúvida?

NOS ESCREVA!