

Plan de emergencia

Ficha para completar con tu equipo: señales, pasos y contactos clave.

Señales de alarma y emergencias

Qué vigilar, cómo responder y cuándo pedir ayuda urgente.

Cuándo buscar ayuda urgente

Ante la duda, llama a emergencias

Esta guía es general y no reemplaza al plan que te dio tu equipo ni a los servicios de emergencia de tu país. Si hay riesgo vital, llama de inmediato al número local de emergencias.

- Debilidad súbita en cara, brazo o pierna, dificultad para hablar o ver (posible ACV): actúa rápido, cada minuto cuenta.
- Crisis (convulsión) que dura más de 5 minutos o se repite sin recuperar la conciencia.
- Dolor de cabeza súbito e intensísimo, distinto a lo habitual.
- Fiebre alta con rigidez de cuello o confusión.
- Dificultad para respirar, atragantamiento o pérdida de conciencia.

Primeros auxilios en una crisis (convulsión)

1. Mantén la calma y protege: retira objetos con los que pueda golpearse.
2. Coloca algo blando bajo la cabeza y afloja lo que apriete el cuello.
3. No sujetes con fuerza ni metas nada en la boca.
4. Gíralo de lado (posición de recuperación) para ayudar a respirar.
5. Cronometra la crisis; si supera 5 minutos o se repite, llama a emergencias.
6. Acompaña hasta que se recupere y sigue el plan indicado por su médico.

Después de la crisis

Es normal la somnolencia o confusión posterior. Habla con voz suave, ofrece seguridad y registra qué pasó para el equipo médico.

Prepararse con antelación

- ✓ Un plan de acción escrito por tu equipo (qué hacer y a quién llamar).
- ✓ Lista de medicamentos y alergias, visible y actualizada.
- ✓ Contactos de emergencia y del neurólogo a mano.
- ✓ Documento o brazalete de identificación médica si se recomienda.