

תכנית חירום

כרטיס למילוי עם הצוות שלכם: סימנים, שלבים ואנשי קשר מרכזיים.

סימני אזהרה וחירום

מה לנטר, איך להגיב ומתי לבקש עזרה דחופה.

מתי לבקש עזרה דחופה

בספק, התקשרו לחירום

המדריך הזה כללי ואינו מחליף את התכנית שנתן הצוות שלכם או את שירותי החירום במדינתכם. אם יש סכנת חיים, התקשרו מיד למספר החירום המקומי.

- חולשה פתאומית בפנים, בזרוע או ברגל, קושי לדבר או לראות (חשד לשבץ): פעלו מהר, כל דקה חשובה.
- התקף (פרקוס) שנמשך יותר מ-5 דקות או חוזר בלי חזרה להכרה.
- כאב ראש פתאומי וחזק מאוד, שונה מהרגיל.
- חום גבוה עם נוקשות צוואר או בלבול.
- קושי בנשימה, חנק או אובדן הכרה.

עזרה ראשונה בהתקף (פרקוס)

1. שמרו על רוגע והגנו: הרחיקו חפצים שעלול להיפגע מהם.
2. הניחו משהו רך מתחת לראש ושחררו את מה שלוחץ על הצוואר.
3. אל תחזיקו בכוח ואל תכניסו דבר לפה.
4. הפנו אותו לצד (תנוחת התאוששות) כדי לסייע לנשימה.
5. תזמנו את ההתקף; אם עובר 5 דקות או חוזר, התקשרו לחירום.
6. הישארו עד ההתאוששות ועקבו אחר תכנית הרופא.

אחרי ההתקף

נמנום או בלבול לאחר מכן הם נורמליים. דברו בקול רך, העניקו ביטחון ורשמו מה קרה עבור הצוות הרפואי.

להתכונן מראש

- ✓ תכנית פעולה כתובה מהצוות שלכם (מה לעשות ולמי להתקשר).
- ✓ רשימת תרופות ואלרגיות, גלויה ומעודכנת.
- ✓ אנשי קשר לחירום והניירולוג בהישג יד.
- ✓ מסמך או צמיד זיהוי רפואי אם הומלץ.