

응급 계획

팀과 함께 작성하는 양식: 신호 · 단계 · 주요 연락처.

경고 신호와 응급

무엇을 지켜보고, 어떻게 대응하며, 언제 긴급 도움을 청할지.

긴급 도움을 청할 때

의심되면 응급에 전화

이 안내는 일반적이며 팀이 준 계획이나 자국의 응급 서비스를 대신하지 않습니다. 생명 위험이 있으면 즉시 지역 응급번호로 전화하세요.

- 얼굴 · 팔 · 다리의 갑작스러운 힘 빠짐, 말이나 시야의 어려움(뇌졸중 가능): 빨리 행동, 1분이 중요합니다.
- 5분 넘게 지속되거나 의식이 돌아오지 않고 반복되는 발작.
- 평소와 다른, 갑작스럽고 매우 심한 두통.
- 고열에 목 경직이나 혼란이 동반.
- 호흡 곤란, 질식 또는 의식 상실.

발작(경련) 시 응급처치

1. 침착하게 보호: 부딪힐 만한 물건을 치우기.
2. 머리 밑에 부드러운 것을 두고 목을 조이는 것을 풀기.
3. 억지로 붙잡지 말고 입에 아무것도 넣지 않기.
4. 옆으로 눕히기(회복 자세)로 호흡을 돕기.
5. 발작 시간을 재기: 5분을 넘거나 반복되면 응급에 전화.
6. 회복될 때까지 곁에 있고 의사의 계획을 따르기.

발작 후

이후의 졸림이나 혼란은 정상입니다. 부드러운 목소리로 안심을 주고, 무슨 일이 있었는지 의료진을 위해 기록하세요.

미리 준비하기

- ✓ 팀이 작성한 행동 계획(무엇을 하고 누구에게 연락할지).
- ✓ 약과 알레르기 목록을 눈에 띄고 최신으로.
- ✓ 응급 연락처와 신경과 의사 연락처를 가까이.
- ✓ 권고되면 의료용 신분 서류나 팔찌를.