

パニックと他人軸を一瞬で手放し、
自分の気持ちに正直に生きる人生にシフトする
メンタルフォームプログラム

パニック・不安を防ぐ 血糖値コントロール&肝臓リセットマニュアル

天然お出汁美人メソッド

Na'au Noa | 小松 大将

副腎疲労によるホルモンバランスの乱れは睡眠の質や 血糖コントロールに超影響あり

ストレス対抗ホルモン コルチゾールは副腎から分泌
ストレスを受けることが多い人はコルチゾール過多で副腎疲労
副腎疲労でだるさ倦怠感常時覚醒が慢性化し睡眠の質低下

本来、コルチゾールは朝に高く夜に低くなるというリズム（日内変動）があります。
これが狂うと「日中は出なくてダルいのに、夜に高くなって眠れない（常時覚醒）」
という最悪の逆転現象が起きます。

脳疲労が取れず、判断力感情コントロール力も低下
命を守るためにリスクのみを認識するモードへ

脳のブレーキ（前頭葉）が壊れると、本能や恐怖を司る「扁桃体」という部分が暴走します。
脳は「自分は今、命の危機に瀕している！」と勘違いするため、
生き残るために周囲の「危険（リスク）」ばかりを過剰に探すモードに切り替わります。

目の前の出来事を黒で解釈する脳のフィルターが常時になる

心理学ではこれを「認知の歪み（マイナス思考のフィルター）」と呼びますが、
これは性格の問題ではなく、脳がサバイバルモード（生存戦略）に入ってしまった結果
のバグです。良いことよりも、悪いこと（黒）を警戒した方が生き残れる確率が上がる
と脳が判断している状態です。

血糖値コントロールの破綻がもたらす症状

① 血糖値が低い時に、コルチゾールが必要なだけ分泌できない場合

（＝副腎がバテていて、血糖値を上げる手助けができない状態）

本来、お腹が空いたときや夜間など、血糖値が下がりそうなときはコルチゾールが「糖を作れ！」と指示を出して血糖値を維持します。しかし、副腎が疲弊してコルチゾールが出ないと、体は「機能性低血糖（エネルギー切れ）」に陥ります。

【このときに生じる主な症状】

- ・ 夕方（16日前後）の激しい疲労感と強烈な眠気（エネルギー切れを起こし、泥のように眠くなったり動けなくなったりします）
- ・ 突然のイライラ、焦燥感、不安感（脳が飢餓状態になり、パニックを起こします）
- ・ 甘いものやカフェインへの異常な執着（体が手っ取り早く血糖値を上げようと、チョコレートやコーヒーを猛烈に欲します）
- ・ 夜中の食いしばり、悪夢、中途覚醒（寝ている間に低血糖になると、体は最後の手段として「アドレナリン」をドバツと出します。アドレナリンは攻撃性のホルモンなので、寝ているのに戦っている状態になり、目が覚めたり、朝起きたときに顎が痛かったりします）

② 食事直後などに血糖値が高く、ストレス過多でさらに血糖値が上がりすぎる場合

（＝食後の自然な上昇＋ストレスによる上昇の「ダブルスパイク」状態）

食後に急なストレスがかかると、ただでさえ高い血糖値が限界突破します。これにより、体は処理しきれない糖をどうにかしようと、インスリンを大量に分泌して急激に血糖値を下げようとします。この「乱高下（ジェットコースター状態）」が体に大ダメージを与えます。

【このときに生じる主な症状】

- ・ 食後の激しい胃痛、胃もたれ、吐き気
- ・ 気絶するような食後の猛烈な眠気
- ・ 動悸、冷や汗、手の震え（血糖値の急激な乱高下に自律神経がついていけず、パニック発作のような症状が出ます）

このストーリーの結末（悪循環）

1. 副腎が疲れる ＝ 血糖値が維持できず、すぐ「低血糖」になる。
2. 脳がピンチを察知 ＝ 「手っ取り早く糖をくれ！」と命令し、甘いものや炭水化物をドカ食い
3. ドカ食い＋ストレス ＝ 食後に血糖値が「爆上がり」
4. 乱高下で疲弊 ＝ 血糖値を乱高下させるたびに、副腎や膵臓（インスリンを出す臓器）が使われ、疲労結果として、「体は常にエネルギー不足なのに、心は常に戦時モード（リスク認知フィルター）」という、生きているだけで疲れてしまう状態が完成

このプログラムの目的は、減量ではなく「自律神経の暴走（動悸・不安発作）の引き金になる『低血糖』を防ぎ、どっしりした心と体を取り戻すこと」です。

大前提：心を軽くする「超安心ゆるルール」

- ・「食べられない時」は絶対に無理しない スケジュール通りに食べられなくても、数口つまめば100点満点 「食べなきゃ」という義務感はゴミ箱に捨てましょう。
- ・お腹が空く前に「先回り」して口に入れる 空腹時間が長くなると、脳が「命の危機！」と判断して不安ホルモン（アドレナリン）を出します。2〜3時間おきに何かを口に入れるのが最大の防御です。
- ・完璧を目指さなくて大丈夫 しんどい時は、全部をこなそうとせず、以下のどれか「1つだけ」できればその日は満点です。
 - 「10時に干し芋を少し口に入れるだけ」
 - 「お昼前にサイリウムスープを数口飲むだけ」
 - 「夜寝る前に温かい豆乳を一口すするだけ」

【一番大切なお守りルール】

病院から処方されているお薬（抗不安薬や抗うつ薬など）は、ご自身の判断で絶対に減らしたり、やめたりしないでくださいね。今回お休みするのは、あくまで「ご自身で購入されているサプリメントとプロテインだけ」です。お薬はドクターの指示通りに飲みながら、優しく体を変えていきましょう。

全体のロードマップ（6週間のステップアップ）

- ・【第1ステージ：1週目】脳を慣らす「グラデーション減量期」 脳に「サプリが減っている」と気づかれないよう、1週間かけてサプリ・プロテインの量をゆっくり減らします。
- ・【第2ステージ：2〜3週目】肝臓の「完全な有給休暇期」 お薬以外のサプリ・プロテインを完全に「ゼロ」にし、朝をお出汁に変えて、肝臓の血糖キープ力を限界まで引き上げます。
- ・【第3ステージ：4〜6週目】「復活・日常コントロール期」 肝臓が元気になったサインを確認後、プロテインを安全に再開し、一生モノの血糖値コントロールを身につけます。

【第1ステージ：1週目】 グラデーション減量期

「一気にやめるのが不安...」という方でも大丈夫。7日間かけて一歩ずつ減らしていきます。

- ・【1～2日目】プロテインを「半分」にする 消化・解毒に最もエネルギーを使うプロテインの量をいつもの「半分」に減らします。市販の栄養ドリンクやエナジードリンクはこの時点で完全にストップします。カプセルや錠剤のサプリは、まだいつも通りで構いません。
- ・【3～4日目】プロテインを「3分の1」にし、サプリを「半分」にする プロテインをさらに減らし、いつもの「3分の1」にします。物足りなさを感じたら、ここで後述する「天然お出汁」を少しずつ飲み始めましょう。同時に、ビタミンやミネラルなどのサプリの量も半分に減らします。
- ・【5～6日目】プロテインは「ゼロ」へ、夜のサプリもゼロにする ここでプロテインは「完全にゼロ」になり、朝は「天然お出汁セット」に完全移行します。残っている日中のサプリもさらに半分に減らし、夜（夕食後や寝る前）のサプリはすべてストップします。
- ・【7日目】最後の1粒に「ありがとう」をしてゼロにする 最後まで残していた日中のサプリをストップし、すべてのサプリがお休みに入ります。

【第2ステージ：2～3週目】 肝臓の完全な有給休暇期

ここから2週間、お薬以外のサプリ・プロテインはすべてお休みです。入ってくるゴミ（解毒タスク）をなくすことで、肝臓は本来の仕事である「血糖値の維持」に100%のパワーを使えるようになり、夜間の発作を防ぎます。

【第3ステージ：4～6週目】 復活・日常コントロール期

2週間の有給休暇を終え、以下の「肝臓の体力が復活したサイン」が出たら、このステージ
肝臓の復活サイン

1. 夜中に動悸や悪夢で目が覚めることがなくなった。
2. 朝起きた瞬間の「だるさ」や「理由のない不安感」が消えた。
3. 日中のソワソワ感（パニックの予兆）が明らかに減った。

プロテイン・サプリの安全な再開ルール

朝食のメニューを以下のようにステップアップさせます。

- ・ 朝食の進化：「朝の天然お出汁」を飲んだあと、プロテインを【いつもの半分の量】から再開
- ・ サプリの再開：どうしても必要なサプリがある場合のみ、「2～3日に1回」または「規定量の半分」から、肝臓の様子を見ながら慎重に再開

日常のゆとり（5～6週目）

体調が良い日の食事（週3回程度）には、全粒粉パンやパスタなど他の炭水化物も試していきます。さらに2週間に1回程度は、ピザやアイスなど「今一番食べたいもの」を制限なく楽しむ日を作りましょう。楽しんで食べることで副腎のストレスが一気に吹き飛びます。

【プランA：サイリウムハスク活用プラン】

胃の中に「天然の血糖値ガード（食物繊維の網）」を先に作り、普通の白いご飯の吸収を玄米並みに穏やかにする裏技プランです。家族と同じ白いご飯を美味しく食べられます。

- 07:00【起床・朝食】熱々の天然お出汁、リンゴやバナナ、干し芋、おかゆなどの「優しい炭水化物」を体調に合わせて食べられる分だけ。
- 10:00【午前中の先回り糖質】 干し芋を少し（または全粒粉クラッカー）
- 11:45【お昼ごはんの15分前】★最重要 サイリウムハスク（小さじ1/2～1杯）を温かいスープやお味噌汁、またはお出汁に混ぜて飲む。そのあとにお水やお茶をコップ1杯飲む。
- 12:00【お昼のごはん】 普通の白米（お茶碗半分～1杯） + おかず（豆腐や白身魚など）
- 15:00【午後の先回り糖質】 サツマイモ（ふかしたもの）数口、またはナッツ類
- 17:45【夜ごはんの15分前】★最重要 お昼前と同様に、サイリウムハスク入りのスープとお水を飲む。
- 18:00【夜のごはん】 普通の白米（お茶碗小盛り～1杯） + おかず + お味噌汁 ※夜もしっかり白米を食べて大丈夫！サイリウムが糖を朝まで長持ちさせてくれます。
- 21:00【夜間の低血糖予防（寝る前）】 温かい豆乳を少し飲む、または具なしのお味噌汁を一口

【プランB：天然食材こだわりプラン】

サイリウムなどの粉末を使わず、普通のスーパーで買える食材の力だけで、じわじわと長く血液中に残る「安全な糖質（多糖類）」を小分けにして味方につける王道プランです。

- ・ 07:00【起床・朝食】 温かい天然お出汁をマグカップ1杯【その後】 リンゴやバナナ、干し芋、おかゆなどの「優しい炭水化物」を体調に合わせて食べられる分だけ。
- ・ 10:00【午前中の先回り糖質】 干し芋を少し、またはアーモンドやクルミを数粒
- ・ 12:00【お昼のごはん】 「安全な主食」をお茶碗半分～1杯 + おかず ★安全な主食：白米に「もち麦」や「十六穀米」を混ぜて炊いたもの、または十割そば。
- ・ 15:00【午後の先回り糖質】 サツマイモ（ふかしたもの）数口、または少量のドライフルーツ
- ・ 18:00【夜のごはん】 「安全な主食（もち麦ごはんや、おそば等）」をしっかり1杯 + おかず
※制限のストレスは一番の敵です。夜も安全な主食をしっかり食べて、心とお腹を満たしてください。これが夜間の発作を防ぐ強力な盾になります。
- ・ 21:00【夜間の低血糖予防（寝る前）】 温かい豆乳を少し飲む、または具なしのお味噌汁を一口

胃腸を傷つけない「天然お出汁」の作り方

【一番カンタン】① 魔法瓶にほったらかし「本格ペプチド出汁」

- 用意するもの（約200ml分）：かつお節1パック（約3g）、昆布（5cm角）1枚、乾燥しいたけスライス2〜3枚、天然の波動の高い海水塩をひとつまみ
- 作り方：前日の夜（保存容器なら朝一番）、魔法瓶に材料をすべて入れ、熱湯を200ml注いでフタをして30分以上放置するだけ。飲むときは茶こしで注ぎます。

【もっと手軽に】② 市販の「完全無添加・粉末出汁」をお湯に溶かすだけ

- 選び方：原材料名に「調味料（アミノ酸等）」「風味調味料」「食塩」「デキストリン」が入っていない、【かつお、昆布、しいたけ、煮干し】などの乾物だけでできた粉末出汁を選びます。
- 作り方：マグカップに小さじ1/2〜1杯入れ、熱湯を注いでよく混ぜてゆっくり飲みます。底の粉も丸ごと飲んで大丈夫です。

これだけは基本避けてほしい「NG食材リスト」

血糖値をロケットのように乱高下させ、激しい低血糖（パニック）を招く食材です。体調が安定するまでは、できる限り遠ざけておきましょう。

- 砂糖・甘いもの全般：白砂糖、チョコレート、飴、ケーキ、クッキー、アイス、和菓子
- 液体状の糖質（最も危険）：ジュース全般（100%もNG）、清涼飲料水、エナジードリンク、甘い缶コーヒー、スポーツドリンク
- 精製された白い主食：食パン、うどん、そうめん、白い小麦粉を使ったパンやパスタ
- 胃腸・自律神経を刺激するもの：過度なカフェイン、アルコール、激辛スパイス、揚げ物、加工肉（ウインナーなど）
- 体に良さそうで実はNG：玄米（今の弱った胃腸には消化の負担が強すぎて、逆に低血糖を悪化させます。主食は白米+もち麦にしましょう）

● 血糖コントロールを立て直す「おすすめ食材リスト」

- ① 脳と自律神経をリラックスさせる（マグネシウム・ビタミンB群・タンパク質） 大豆製品（豆腐、納豆、豆乳）、卵（セロトニンの材料）、青魚（サバ、イワシ、鮭などの良質な油）
- ② 食欲がない時のエネルギー源（優しい糖質とアミノ酸） 干し芋・ふかしたサツマイモ、かつお・昆布のお出汁、アサリやシジミの貝類、鶏胸肉のすり流し
- ③ 血糖値の急上昇を抑えるクッション（水溶性食物繊維） アボカド、オクラ、めかぶ、サイリウムハスク（※必ず料理やお出汁に混ぜて加熱し、水分を多めに摂ること）

おすすめのサイリウムハスクと選定根拠

サイリウムハスクを選ぶ際の最大のポイントは、「添加物（香料・甘味料）が一切含まれていない100%純粋なものであること」と「日本の食品衛生法に基づく検査をクリアしていること」

1. 井藤漢方製薬 『オオバコダイエット』

- ・ 特徴：日本のドラッグストアやネットで最も手に入りやすく、実績のある定番製品です。原材料はプラントゴ・オバタ種皮（サイリウムハスク）100%で、余計な添加物は一切入っていません。

根拠：

- 。 肝臓への負担ゼロ：香料や人工甘味料（スクラロースやアスパルテームなど）が含まれている製品は、その解毒のために肝臓のコスト（徹夜残業）が発生します。完全無添加の本品は、肝臓を完全に休ませる「第2ステージ（有給休暇）」の目的と100%一致します。
- 。 純度が高いため、水溶性・不溶性食物繊維が理想的なバランスで含まれており、胃の中でお出汁の水分を抱え込んで強固なゼリー状の網を作ります。これにより、白米の糖質吸収を物理的に遅らせる力が極めて高いです。

おすすめの天然お出汁と選定根拠

お出汁を選ぶ際の絶対条件は、「化学調味料（アミノ酸等）」だけでなく、「食塩」「酵母エキス」「デキストリン（植物性でんぷん）」すらも一切使っていない『完全無添加』であることです。

1. 恵味だし（プレミアム） または ペプチドリップ 『だし&栄養スープ』

- ・ 特徴：かつお、昆布、いわし、しいたけ、無臭にんにく等の天然素材を、化学薬品を使わず「ペプチド（アミノ酸が数個つながった状態）」にまで細かく分子破壊して粉末にしたお出汁です。
- ・ 根拠（なぜパニック・低血糖に最強なのか）：
 - 。 一般的な「無添加だしパック」であっても、市販のものは味を整えるために「食塩」や、実質的な化学調味料の代替品である「酵母エキス」が入っているものが大半です。上記製品はそれらが完全ゼロ（原材料は魚介類と植物のみ）であるため、自律神経が過敏なパニック期に最も安全です。
- ・

2. 前田家 『飲むお出汁』（かつお・昆布・煮干し・しいたけ）

- ・ 特徴：完全に日本の伝統的な乾物（かつお節や昆布など）だけをそのまま細かく粉砕して粉末にした、究極のリアルフード出汁です。
- ・ 根拠：
 - 。 自然派思考（リアルフード）への完全合致：「人間が数千年前から食べてきた、遺伝子が認識できる本物の食べ物」そのものです。サプリメントのような不自然に濃縮された栄養素ではないため、脳の自律神経が「これは安全な食べ物だ」と判断し、内臓の緊張を緩めます。結果として副交感神経が優位になり、胃腸の血流が戻りやすくなります。