

# 베이지안 절차

# 정의

- 개요

1. 베이지안 정리에서  $\frac{g(\theta)g(y|\theta)}{\sum g(\theta)g(y_i|\theta)}$ 는

1) 사전확률  $\theta$ 가 주어졌을 때

2)  $y$ 라는 추가 정보가 주어졌을 경우 변동되는 사후 확률로 정의할 수 있으며

3) 이를 모든 확률변수로 확대하면 다음과 같은 꼴이 도출된다.

$$(1) \frac{g(\theta_i)g(y|\theta_i)}{\sum_{j=1}^n g(\theta_j)g(y|\theta_j)} (i = 1, 2, \dots, n) \Rightarrow \frac{h(\theta)L(y|\theta)}{\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(y|\theta) d\theta} = k(\theta|y)$$

2. 즉, 베이지안 확률론을 모수의 추정에 대입한 것

1) 모수에 대한 확률변수  $\theta$ 에 대한 pdf  $h(\theta)$  와

2) 그 분포에 모수를 의존하는 확률변수  $X$ 의 pdf  $L(X|\theta)$  결합하여  $h(\theta)L(X|\theta)$

3) 모수에 대해 적분한 후  $\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(y|\theta) d\theta$

4) 그것을 결합 pdf  $h(\theta)L(X|\theta)$ 에 대해  $\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(y|\theta) d\theta$ 로 통제하면 베이지안 사후분포가 나온다.

# 정의

- 사전분포와 사후분포

1. 위에서, 모수에 대한  $h(\theta)$  를 pdf로 가지는 확률변수  $\theta$ 의 분포를 사전분포라고 한다.
2. 위에서,  $\frac{h(\theta)L(y|\theta)}{\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(y|\theta) d\theta} = k(\theta|y)$ 로 도출되는  $k(\theta|y)$ 를 pdf로 가지는 분포를 사후분포라고 한다.
3. 한편, 사후 분포는  $\theta$ 에 의존하지 않는 '상수'  $C(y)$ 와  $\theta$ 에 의존하는 항의 인수로 분해될 수 있다.
  - 1) 즉,  $k(\theta|y) = \frac{h(\theta)L(y|\theta)}{\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(y|\theta) d\theta} = c(y)h(\theta)L(y|\theta)$  이고, 만약 상수를 고려하지 않는다면
  - 2)  $k(\theta|y) \propto h(\theta)L(y|\theta)$  의 비례 관계로 정의할 수 있다.
  - 3) 한편, 만약  $Y = U(X)$ 인  $X$ 에 대한 충분통계량이라면, 이는 또한  $h(\theta)L(u(x)|\theta)$  로 나타낼 수 있다.

# 정의

- 켈레분포족(공액분포)

1. 사전 분포의 pdf와 표본 분포의 pdf를 결합하였을 때 도출되는 사후 분포가 사전 분포와 동일한 분포족에 속한다면
2. 이를 표본 분포  $X$ 에 대한 사전 분포가 켈레분포족에 속한다고 정의한다.
  - 1) 다시 말해,  $k(\theta|y) \propto L(x|\theta)h(\theta)$ 를 정의할 때
  - 2) 만약  $k(\theta|y)$ 의 분포가  $h(\theta)$ 의 분포와 동일한 분포족에 속할 때
  - 3)  $h(\theta)$ 의 분포를  $L(x|\theta)$ 가 따르는 분포에 대한 켈레분포족이라고 정의한다.

표본의 분포	사전 분포	사후분포
$Bin(n, \theta)$	$\theta \sim beta(a, \beta)$	$beta(c, d)$
$poi(\theta)$	$\theta \sim gamma(a, \beta)$	$gamma(c, d)$
$N(\theta, \sigma^2)$ (단, 모분산은 알려져있다.)	$\theta \sim N(a, \beta)$	$N(c, d)$
$N(\mu, \theta)$ (단, 모평균은 알려져있다.)	$\theta \sim \frac{1}{gamma(a, \beta)}$	$gamma(a, \beta)$

# 정의

- 베이زي안 점추정

1. 위험함수  $E[\mathcal{L}\{\theta, \delta(X)\} | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{L}\{\theta, \delta(X)\} k(\theta | x) d\theta$ 를 정의하자.

1) 이 때, 이 위험함수값을 최소화하는 추정량  $\delta(X)$ 를 베이زي안 추정량이라고 한다.

2) 만약 손실함수가 절대손실오차함수(MAE)로 주어지는 경우

(1)  $\delta(X) = E[\theta | X]$  일 때 위험함수가 최소화되므로, 베이زي안 추정값은 중위수가 된다.

3) 만약 손실함수가 제곱손실오차함수(MSE)로 주어지는 경우

(1)  $\delta(X) = E[\theta | X]$  일 때 위험함수가 최소화되므로, 베이زي안 추정값은 평균값이 된다.

# 정의

- 베이지안 점추정

2. 위험함수의 기댓값은 다음과 같이 구할 수 있다.

1)  $g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(x|\theta) d\theta$  라고 할 때

$$\begin{aligned}(1) E[E[\mathcal{L}\{\theta, \delta(X)\}|X=x]] &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{L}\{\theta, \delta(X)\} k(\theta|x) d\theta \right\} g(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{L}\{\theta, \delta(X)\} \frac{h(\theta)L(x|\theta)}{\int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(x|\theta) d\theta} d\theta \right\} \int_{-\infty}^{\infty} h(\theta)g(x|\theta) d\theta dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{L}\{\theta, \delta(X)\} L(x|\theta) dx \right\} h(\theta) d\theta\end{aligned}$$

(2) 이 때,  $\delta(X)$ 를 극소화하면 위험의 평균을 최소화하게 된다.

3. 한편, 이 베이지안 추정해가  $\delta(X)$ 에 대한 항과 나머지 항의 선형결합으로 표현되어서

1)  $n \rightarrow \infty$ 일 때 어떤 특정값으로 '수렴(축소)'하는 관계를 보여준다면

2) 이를 **축소 추정값** 이라고 표현한다.

# 정의

- 베이지안 구간 추정

1.  $\theta$ 의 구간추정을 원할 경우

- 1)  $\alpha = P[u(x) < \theta < v(x) | X = x] = \int_{u(x)}^{v(x)} k(\theta|x) d\theta$  인  $v(x)$ 와  $u(x)$ 를 찾는다.

- 2) 이를 신용구간 혹은 확률구간이라고 표현하며, 신뢰구간과는 엄연히 다른 개념이다.

# 정의

- 베이지안 검정절차

1.  $H_0 : \theta \in w_0$  VS  $H_1 : \theta \in w_1$ 의 가설을 검정한다고 할 때

1) 각각의 가설에 대한 확률 즉

$$(1) P(\theta \in w_0 | X) = P_{H_0}$$

$$(2) P(\theta \in w_1 | X) = P_{H_1}$$

2) 이 때

(1)  $P_{H_1} > P_{H_0}$  이면  $H_1$ 을 채택한다.

(2)  $P_{H_0} > P_{H_1}$  이면  $H_0$ 를 채택한다.

2. 특이한 점은, 두 개 이상의 가설에 대해 동시에 검정을 실시할 수 있다는 점이다.

1) 왜냐하면 단순히 조건부 확률이 더 큰 쪽을 옳은 가설로 선택하기 때문이다.

2) 따라서, 동시 검정하고자 하는 가설을 조건부 확률에 포함하여 검정한다.



# 예제

- 베이지안 절차

1.  $X_i|\theta \sim N(\theta, \sigma^2)$  이고  $\theta \sim N(\theta_0, \sigma_0^2)$  이라 하자.
2.  $Y = \bar{x}$  인 충분통계량일 때, 결론적으로 모수  $\theta$ 에 대한 베이지안 점추정은

$$1) \quad k(\theta|y) \propto \exp \left[ \frac{(\sigma_0^2 + \sigma^2/n)\theta^2 - 2(y\sigma_0^2 + \theta_0(\sigma^2/n))\theta}{2(\frac{\sigma^2}{n})\sigma_0^2} \right] \text{의 비례관계가 성립된다.}$$

$$(1) \quad \text{위를 정리하면 } k(\theta|y) \propto \exp \left[ \frac{\left( \theta - \frac{y\sigma_0^2 + \theta_0(\sigma^2/n)}{\sigma_0^2 + \frac{\sigma_0^2}{n}} \right)^2}{2 \frac{(\sigma^2/n)\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + \sigma^2/n}} \right] \text{ 이고}$$

$$(2) \quad N \left[ \frac{y\sigma_0^2 + \theta_0(\sigma^2/n)}{\sigma_0^2 + \frac{\sigma_0^2}{n}}, \frac{(\sigma^2/n)\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + \sigma^2/n} \right] \text{인 정규분포에서, 손실함수가 MSE로 주어질 때}$$

- 위험함수를 최소화하는 베이지안 추정해는 이 분포의 평균이 된다.
- 따라서  $\theta = \delta(Y) = \frac{y\sigma_0^2 + \theta_0(\sigma^2/n)}{\sigma_0^2 + \frac{\sigma_0^2}{n}} = \left( \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2 + \frac{\sigma_0^2}{n}} \right) y + \frac{\theta_0(\sigma^2/n)}{\sigma_0^2 + \frac{\sigma_0^2}{n}}$  은 베이지안 추정해가 된다.
- 이 때, 가장 오른쪽의 표현형은 축소추정값을 표현하는 형태이며, 는  $n \rightarrow \infty$  일 때 점차  $y$ 로 수렴한다.

# 예제

- 베이저안 검정절차

1.  $H_0 : \theta \leq 10$  VS  $H_1 : \theta > 10$ 의 가설을 검정한다고 하자.
2. 사전분포로  $\Gamma(a = 10, \beta = 1.2)$ 를 가정했다고 하고,  
이 때 표본은 푸아송 분포에서 무작위로 추출되었다고 하자.
  - 1) 이 때, 푸아송분포의 켈레분포는 감마분포로, 이 두 분포의 결합은  
같은 감마분포를 도출하게 된다.
  - 2) 이 때
    - (1)  $k(\theta|y) \propto \text{pdf}\left\{f : f(x) \text{는 } \Gamma\left(\sum x_i + a, \frac{\beta}{n\beta+1}\right) \text{의 pdf}\right\}$ 와 비례관계에 있고
    - (2)  $\sum x_i = 177, n = 20$ 이라고 한다면 사후분포는  $\Gamma(187, 0.48)$ 로 변화한다.
  - 3) 사후 분포로 가설을 검정하면
    - (1)  $p_{H_0} = P[\Gamma(187, 0.48) \leq 10] = 0.9368$
    - (2)  $p_{H_1} = P[\Gamma(187, 0.48) > 10] = 1 - 0.9368$
  - 4) 따라서  $H_0$ 를 채택한다.