

Formulaire - Probabilités et Variables Aléatoires

Abdallah K

Formulaire de Probabilités - Résumé

Comment montrer qu'une fonction est une densité de probabilité



Théorème 1 : f est une densité de probabilité si :

1. $f(t) \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$
2. f est continue sur \mathbb{R} sauf éventuellement en un nombre fini de points
3. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$

Fonction de répartition à partir de la densité



Si X a pour densité f , alors sa fonction de répartition est :


$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Comment montrer qu'une fonction F est une f.r. de VAR à densité



Théorème 4 : F est fonction de répartition d'une VAR à densité si :

1. F est continue sur \mathbb{R}
2. F est \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} sauf en un nombre fini de points
3. F est croissante sur \mathbb{R}
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$



Alors $f(x) = F'(x)$ (aux points de dérivabilité) est une densité.

Calculs de probabilités avec densité et fonction de répartition



Soit X une VAR de densité f et fonction de répartition F :

$$P(X = a) = 0$$

$$P(X \leq a) = P(X < a) = F(a) = \int_{-\infty}^a f(t)dt$$

$$P(X \geq a) = P(X > a) = 1 - F(a) = \int_a^{+\infty} f(t)dt$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt$$



- **Cas discret** : X de support \mathcal{X} , $P(X = x_k) = p_k$

$$\rightarrow E[X] = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} x_k p_k, \quad E[g(X)] = \sum_{x_k \in \mathcal{X}} g(x_k) p_k$$

$$\rightarrow \text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

- **Cas continu** : X de densité f

$$\rightarrow E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t) dt, \quad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f(t) dt$$

$$\rightarrow \text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - E[X])^2 f(t) dt = E[X^2] - (E[X])^2$$

Calcul d'Espérance et Variance - Cas Discret Non Usuel

Méthode de calcul pour une VAR discrète non usuelle

Soit X une variable aléatoire discrète avec $P(X = x_i) = p_i$

Étapes pour le calcul de l'espérance

1. Dresser le tableau des valeurs et probabilités
2. Calculer les produits $x_i \cdot p_i$
3. Faire la somme pour obtenir $E[X]$

x_i	$p_i = P(X = x_i)$	$x_i \cdot p_i$	x_i^2	$x_i^2 \cdot p_i$
x_1	p_1	$x_1 \cdot p_1$	x_1^2	$x_1^2 \cdot p_1$
x_2	p_2	$x_2 \cdot p_2$	x_2^2	$x_2^2 \cdot p_2$
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
x_n	p_n	$x_n \cdot p_n$	x_n^2	$x_n^2 \cdot p_n$
Total	1	$E[X] = \sum x_i p_i$		$E[X^2] = \sum x_i^2 p_i$

Calcul de la variance

Deux méthodes équivalentes :

Méthode 1 : $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

Méthode 2 : $\text{Var}(X) = \sum (x_i - E[X])^2 p_i$

Étape	Formule	Calcul
1	$E[X] = \sum x_i p_i$	Valeur obtenue du tableau
2	$E[X^2] = \sum x_i^2 p_i$	Valeur obtenue du tableau
3	$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$	Application numérique
4	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	Racine carrée

Notes
Moyenne

coéf (%)

DS	TP	Ex
18	16	14
0.2	0.1	0.7

$$M = 0.2 \times 18 + 0.1 \times 16 + 0.7 \times 14$$

$$= 3.6 + 1.6 + 9.8 \quad E(X) = \text{Moyenne:}$$

$$M = 15.0$$

Expectation:

what did you expect:

45% → 10\$

365:

X : r.a.n.d. → $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

x_k	x_1	x_2	x_n
$P(X=x_k)$	p_1	p_2	p_n

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$$


$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{P(X=x_i)}_{p_i} :$$

MG

$$2LM_1 \quad | \quad 2LM_2 \quad | \quad 2LM_3 \quad | \quad 2LM_4$$


$$11.8 \quad | \quad 12.3 \quad | \quad 13.1 \quad | \quad 11.75$$

$$\begin{matrix} 1 \\ 17.5 \\ 16 \\ \vdots \\ 10.5 \\ 9 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 11.8 \\ 12.2 \\ 11.6 \\ \vdots \\ 12.3 \end{matrix}$$



* $V(X) = E[(X - E(X))^2] \rightarrow \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$



$V(X) = E[(X - E(X))^2]$

$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$= \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$


$\sigma(X)$

Espace

$P(X) = 3X^2 + 2X + 1$

d'

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{matrix} \text{ base}$



M.

Exemple concret

Soit X telle que $P(X = k) = \frac{c}{k(k+1)}$ pour $k = 1, 2, 3$

1. Détermination de c :

$$\sum_{k=1}^3 \frac{c}{k(k+1)} = 1 \Rightarrow c \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} \right) = 1 \Rightarrow c = \frac{4}{3}$$

$\frac{6+2+1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$

2. Tableau de calcul :

k	$P(X = k)$	$k \cdot P(X = k)$	k^2	$k^2 \cdot P(X = k)$
1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{2}{6}$	$\frac{4}{6}$	4	$\frac{8}{6}$
3	$\frac{1}{9}$	$\frac{3}{9}$	9	$\frac{9}{9}$
Total	1	$E[X] = \frac{13}{9}$		$E[X^2] = \frac{23}{9}$

3. Calculs finaux :

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \frac{23}{9} - \left(\frac{13}{9}\right)^2 = \frac{38}{81} = \frac{38}{81}$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{38}{81}} = \frac{\sqrt{38}}{9}$$

Vérifications importantes

- $\sum p_i = 1$ (loi de probabilité) $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$
- $E[X]$ existe si $\sum |x_i| p_i < +\infty$ ex :
- $Var(X)$ existe si $E[X^2] < +\infty$
- $Var(X) \geq 0$ toujours $\rightarrow \sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$

Propriétés de l'espérance et variance

→ Linéarité : $E[aX + b] = aE[X] + b$

→ Variance : $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

• $X = a$: cte : $E(a) = a$ $Var(a) = 0$

• $Var(aX) = a^2 Var(X)$

• Théorème de transfert : $E[g(X)] = \sum g(x_k) p_k$ (discret) ou $\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f(t) dt$ (continu) .

• Indépendance : Si X et Y indépendantes, alors $E[XY] = E[X]E[Y]$ et $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$

Variable centrée réduite

Pour toute variable aléatoire X :

$$X^* = \frac{X - E[X]}{\sigma(X)} \quad \text{avec} \quad \sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$$

On a alors $E[X^*] = 0$ et $Var(X^*) = 1$.

def

soient x, y deux v.a.r. discrètes

x et y sont deux variables aléatoires indépendantes si:

$$P(X=i \wedge Y=j) = P(X=i, Y=j) = P(X=i) \cdot P(Y=j)$$

$$\forall i \in X(\Omega).$$

$$\forall j \in Y(\Omega).$$

$$E(aX+b) \stackrel{?}{=} a E(X) + b \quad a, b \in \mathbb{R}$$

X v.a.r. d.

X admet une espérance

Rappel

$$E(g(X)) = \sum_{x_i \in X(\Omega)} g(x_i) P(X=x_i)$$

$$g(x) = ax+b$$

$x \leftarrow x_i$

$$E(aX+b) = \sum_{x_i \in X(\Omega)} (ax_i+b) P(X=x_i)$$

$$= \sum_{x_i \in X(\Omega)} [ax_i P(X=x_i) + b P(X=x_i)]$$

$$= \sum_{x_i \in X(\Omega)} ax_i P(X=x_i) + \sum_{x_i \in X(\Omega)} b P(X=x_i)$$

$$= a \sum_{x_i \in X(\Omega)} x_i P(X=x_i) + b \sum_{x_i \in X(\Omega)} P(X=x_i)$$

$$= a \cdot E(X) + b \cdot 1$$

$$= a E(X) + b$$

$$* V(aX+b) \stackrel{?}{=} a^2 V(X)$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Rq.
 $E(X^2)$ existe $\Rightarrow E(X)$ existe

X v.a.r. c

X admet une espérance

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

$$E(aX+b) = \int_{-\infty}^{+\infty} (ax+b) f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} ax f(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} b f(x) dx$$

$$= a E(X) + b$$

$$V(aX+b) = E([aX+b]^2) - [E([aX+b])]^2$$

$$= E(a^2X^2 + 2abX + b^2) - (aE(X) + b)^2$$

$$= E(a^2X^2) + E(2abX) + E(b^2) - \{a^2E(X)^2 + 2abE(X) + b^2\}$$

$$= a^2E(X^2) + \cancel{2abE(X)} + \cancel{b^2} - a^2E(X)^2 - \cancel{2abE(X)} - \cancel{b^2}$$

$$= a^2 [E(X^2) - E(X)^2]$$

$$= a^2 \cdot V(X)$$

Exemple
de Calcul σ^2

$$c = \frac{4}{3}$$

k	1	2	3	T
$P(X=k)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{3} + 2 \times \frac{2}{9} + 3 \times \frac{1}{9}$$

$$E(X) = \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{3}{9} = \frac{13}{9}$$

$$V(X) = E([X - E(X)]^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$= \frac{2}{3} \times \left(1 - \frac{13}{9}\right)^2 + \frac{2}{9} \times \left(2 - \frac{13}{9}\right)^2 + \frac{1}{9} \times \left(3 - \frac{13}{9}\right)^2$$

$$= \frac{2}{3} \times \left(-\frac{4}{9}\right)^2 + \frac{2}{9} \times \frac{25}{81} + \frac{1}{9} \times \left(\frac{14}{9}\right)^2 = \frac{38}{81}$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$


$$E(X^2) = \frac{2}{3} \times (1)^2 + \frac{2}{9} \times (2)^2 + \frac{1}{9} \times (3)^2$$

$$E(X^2) = \frac{2}{3} + \frac{8}{9} + 1 = \frac{23}{9}$$

$$V(X) = \frac{23}{9} - \left(\frac{13}{9}\right)^2 = \frac{207 - 169}{81} = \frac{38}{81}$$

Lois Discrètes Usuelles

Formules à connaître !!



Loi	Espérance	Variance	Écart-type
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	p	$p(1-p)$	$\sqrt{p(1-p)}$
Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	np	$np(1-p)$	$\sqrt{np(1-p)}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	λ	λ	$\sqrt{\lambda}$
Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{\sqrt{1-p}}{p}$
Uniforme $\mathcal{U}\{a, b\}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$	$\sqrt{\frac{(b-a+1)^2-1}{12}}$

Lois Continues Usuelles

Loi	Espérance	Variance	Écart-type
Uniforme $\mathcal{U}(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{b-a}{\sqrt{12}}$
Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{1}{\lambda}$
Normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	σ
Normale $\mathcal{N}(0, 1)$	0	1	1

Loi Normale - Propriétés importantes


- Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $X^* = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$
- $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ où Φ est la f.r. de $\mathcal{N}(0, 1)$
- $P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$
- Valeurs usuelles :
 - $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.6827$
 - $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$
 - $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$

Primitives usuelles

Fonction	Primitive
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
e^{ax}	$\frac{e^{ax}}{a}$
$\ln x$	$x \ln x - x$
$\cos(ax)$	$\frac{\sin(ax)}{a}$
$\sin(ax)$	$-\frac{\cos(ax)}{a}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$

Variable de Bernoulli

Expérience Aléatoire



(lancer une pièce de monnaie)

$$P(\text{Succé}) = p \in]0; 1[$$

$$P(\text{Echec}) = 1 - p$$

$$X: \Omega \longrightarrow \{0; 1\}$$

$$\text{Echec} \longrightarrow 0$$

$$\text{Succé} \longrightarrow 1$$

i	0	1	T
$P(X=i)$	$1-p$	p	1
$i P(X=i)$	0	p	$E(X) = p$

$$E(X^2) = 0^2 \times (1-p) + 1^2 \times p = p$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$= p - p^2$$

$$V(X) = p(1-p)$$

Loi Binomiale :

: une Expérience de Bernoulli répétée n fois d'une manière indépendante.

X : compte le nombre de succès dans les tentatives.

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$\underbrace{\quad \quad \quad}_{n \text{ fois}}$
 $\boxed{E} \boxed{S} \boxed{E} \boxed{S} \boxed{S} \quad \boxed{E}$

$$\rightarrow S \text{ Succé} \rightarrow k:$$

$$\rightarrow E \text{ Echec} \rightarrow n-k$$

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

$$X \sim B(n, p)$$

le nombre de rép

$P(\text{"Succé"})$

Rq: X Bernoulli $X \sim B(1, p)$

$$X \sim B(n, p) \rightarrow E(X) = n \cdot p : V(X) = np(1-p)$$

$$X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$$

$$E(X) = \sum_{i=0}^n i P(X=i) \quad \text{ou} \quad P(X=i) = \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

$$* = \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = \dots = np$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$f(x) = (x+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k b^{n-k}$$

$$f'(x) = n(b+x)^{n-1} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} i x^{i-1} b^{n-i}$$

$x \neq 0$

$$E(X) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \quad \begin{bmatrix} a \leftarrow p \\ b \leftarrow 1-p \end{bmatrix}$$

$$= p \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^{i-1} (1-p)^{n-i}$$

$$= p \cdot f'(p) \quad \text{avec } b = 1-p$$

$$= p(n)(b+p)^{n-1}$$

$$= p \cdot n (1-p+p)^{n-1}$$

$$E(X) = n \cdot p$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$E(X(X-1)) = E(X^2 - X) = E(X^2) - E(X)$$

✓

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$$

$$X \sim B(n, p)$$

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^n k(k-1) P(X=k)$$

$$= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$f(x) = (x+b)^n \rightarrow f'(x) = n(x+b)^{n-1}$$

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^{k-1} b^{n-k}$$

$$f''(x) = \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^{k-2} b^{n-k}$$

$$f''(x) = n(n-1)(x+b)^{n-2}$$

$$= p^2 \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^{k-2} (1-p)^{n-k}$$

$$= p^2 f''(p)$$

$$b = 1-p$$

$$E(X(X-1)) = p^2 n(n-1) (p+1-p)^{n-2}$$

$$E(X(X-1)) = p^2 n(n-1) = n^2 p^2 - n p^2$$

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$$

$$E(X^2) = n^2 p^2 - n p^2 + n p$$

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = n^2 p^2 - n p^2 + n p - n^2 p^2$$

$$V(X) = n p (1-p)$$

$$\begin{cases} E(X) = p \\ V(X) = p(1-p) \end{cases}$$

$$B(1, p)$$

répéter
n fois
(indép)

$$B(n, p)$$

$$\begin{cases} E(X) = np \\ V(X) = np(1-p) \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$

$$P(\lambda)$$

$$E(X) = V(X) = \lambda$$

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$X \sim \text{Geom}(p)$$

(jusqu'à obtenir le premier succès)

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$$

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Intégrales utiles en probabilités

$$\int_0^{+\infty} t^n e^{-at} dt = \frac{n!}{a^{n+1}}$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$$
$$\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-\beta t} dt = \frac{\Gamma(\alpha)}{\beta^\alpha}$$

Changements de variable utiles

- Pour les exponentielles : $u = e^{-t}$, $du = -e^{-t} dt$
- Pour les gaussiennes : $u = \frac{t-\mu}{\sigma}$
- Pour les fonctions rationnelles : décomposition en éléments simples