

PLANTAS TÓXICAS PARA GALINHAS

Guia Visual e Prático de Proteção do Galinheiro em Portugal

Introdução: O Perigo do Espaço Livre

As galinhas soltas em quintais ou jardins têm um comportamento natural de busca por alimento (*foraging*) que passa por bicar incessantemente o solo, folhas, caules e flores. Ao contrário de outros animais, as galinhas possuem um sentido de paladar diferente e, por vezes, a curiosidade ou a escassez de erva fresca leva-as a consumir plantas venenosas.

Como o seu metabolismo é rápido e a sua capacidade de depuração hepática é sensível, a ingestão de toxinas vegetais pode ser fatal em poucas horas. Conhecer as espécies perigosas presentes em Portugal é o primeiro passo essencial para garantir a segurança e o bem-estar do seu aviário caseiro.

▣ **Atenção ao Criador:** Muitas plantas ornamentais comuns em jardins portugueses são altamente tóxicas para aves de capoeira. O acesso livre sem supervisão em áreas desconhecidas é o principal fator de risco para o envenenamento accidental.

Sinais de Intoxicação em Galinhas

Identificar precocemente os sintomas de envenenamento ou intoxicação permite intervir a tempo. Fique atento aos seguintes sinais de alerta:

- **Apatia e fraqueza:** A galinha isola-se do bando, fica com a cabeça encolhida junto ao corpo e mostra-se prostrada.
- **Problemas gastrointestinais:** Diarreia intensa (muitas vezes com muco ou coloração anómala) e vômitos ou regurgitação (pouco comum em aves, mas possível em casos graves).
- **Alterações neurológicas:** Tremores musculares, perda de equilíbrio, andar cambaleante, paralisia ou convulsões.
- **Falta de apetite e sede excessiva:** Recusa total da ração habitual ou, pelo contrário, consumo desesperado de água.
- **Queda abrupta na postura:** Interrupção súbita na produção de ovos ou ovos com casca mole/deformada.
- **Sintomas respiratórios:** Dificuldade em respirar, respiração de bico aberto ou ruídos anómalos.

Plantas Comuns em Portugal Perigosas para Galinhas

Abaixo encontra-se uma lista detalhada de 16 plantas ornamentais, silvestres e hortícolas muito comuns em Portugal que representam perigo para as galinhas:

1. Loendro / Espirradeira (*Nerium oleander*)

- **Porque é tóxica:** Contém glicósidos cardioativos (oleandrina) em todas as partes da planta, incluindo na seiva e nas flores.
- **Sinais:** Arritmias cardíacas graves, tremores, salivação excessiva, fraqueza extrema e morte súbita.

2. Teixo (*Taxus baccata*)

- **Porque é tóxica:** Possui alcaloides (taxina) altamente letais nas folhas e sementes. Mesmo seco, mantém a toxicidade.
- **Sinais:** Tremores musculares, colapso circulatório, paralisia respiratória e morte quase imediata.

3. Cicuta (*Conium maculatum*)

- **Porque é tóxica:** Erva silvestre muito comum em bermas e terrenos húmidos. Contém coniina, um potente neurotóxico.
- **Sinais:** Paralisia progressiva, espasmos musculares, dificuldades respiratórias e convulsões.

4. Dedaleira (*Digitalis purpurea*)

- **Porque é tóxica:** Rica em digitoxina e outros glicósidos digitálicos que afetam diretamente o funcionamento do coração.
- **Sinais:** Perturbações cardíacas profundas, diarreia severa, fraqueza e apatia total.

5. Hera (*Hedera helix*)

- **Porque é tóxica:** As folhas e os frutos contêm saponinas triterpénicas altamente irritantes para o trato digestivo das aves.
- **Sinais:** Irritação oral intensa, salivação, diarreia severa e dores abdominais.

6. Batata Verde e Rebentos (*Solanum tuberosum*)

- **Porque é tóxica:** Tubérculos expostos à luz (esverdeados), cascas verdes e rebentos contêm altos níveis de solanina.
- **Sinais:** Apatia, paralisia parcial, fraqueza nas patas, diarreia e alterações neurológicas.

7. Folhas e Caules de Tomateiro (*Solanum lycopersicum*)

- **Porque é tóxica:** A planta verde do tomateiro (e os tomates ainda muito verdes) contém tomatina, um glicoalcaloide tóxico.
- **Sinais:** Fraqueza, salivação, perturbações digestivas e lentidão nos movimentos.

8. Feijão Cru (*Phaseolus vulgaris*)

- **Porque é tóxica:** Contém lectinas (fitohemaglutinina), toxinas destruídas apenas com a cozedura completa. O feijão cru ou mal cozido é altamente tóxico.
- **Sinais:** Dor abdominal intensa, diarreia sanguinolenta, colapso e mortalidade elevada.

9. Cebola e Alho em Excesso (*Allium cepa / sativum*)

- **Porque é tóxica:** Contêm dissulfuretos que provocam a destruição dos glóbulos vermelhos (anemia hemolítica) se consumidos em grandes quantidades.
- **Sinais:** Urina avermelhada/acastanhada, fraqueza, cristas descoradas e icterícia.

10. Abacate (*Persea americana*)

- **Porque é tóxica:** Contém persina, uma toxina fungicida presente na polpa, casca, caroço e folhas, altamente tóxica para aves.
- **Sinais:** Dificuldade respiratória aguda, acumulação de líquido no peito, fraqueza e morte rápida.

11. Ruibarbo (*Rheum rhabarbarum*)

- **Porque é tóxica:** As folhas contêm elevados teores de ácido oxálico e cristais de oxalato, que prejudicam os rins.
- **Sinais:** Tremores, fraqueza renal, falha metabólica e colapso.

12. Hortênsia (*Hydrangea macrophylla*)

- **Porque é tóxica:** As folhas e flores contêm glicósidos cianogénicos que libertam cianeto quando ingeridos e digeridos.
- **Sinais:** Dor abdominal, letargia, respiração ofegante e, em casos graves, convulsões.

13. Aroeira (*Schinus molle*)

- **Porque é tóxica:** Árvore ornamental comum em jardins portugueses cujos frutos e resinas contêm compostos irritantes.
- **Sinais:** Irritação gastrointestinal, diarreia e apatia.

14. Loureiro-comum e Loureiro-cerja (*Laurus nobilis / Prunus laurocerasus*)

- **Porque é tóxica:** O loureiro-cerja (falso loureiro) e folhas de loureiro em excesso contêm compostos cianogénicos.
- **Sinais:** Dificuldade respiratória, fraqueza e sintomas neurológicos rápidos.

15. Rícino / Mamona (*Ricinus communis*)

- **Porque é tóxica:** As sementes contêm ricina, uma das toxinas naturais mais potentes do mundo.
- **Sinais:** Vômitos intensos, diarreia severa com sangue, desidratação extrema e colapso fatal.

16. Bico-de-papagaio / Poinsettia (*Euphorbia pulcherrima*)

- **Porque é tóxica:** O látex leitoso provoca forte irritação nas mucosas e no sistema digestivo.
- **Sinais:** Salivação intensa, irritação do bico e garganta, diarreia e fraqueza.

Plantas e Restos Seguros para Galinhas

Para compensar e dar uma alimentação rica, pode fornecer em segurança:

- **Hortícolas:** Folhas exteriores de couve, alface, acelgas, abóbora cozida ou crua ralada, courgette e cenoura desfiada.
- **Ervas daninhas seguras:** Dente-de-leão, beldroegas, morugem e erva-cidreira.
- **Restos de cozinha seguros:** Arroz cozido, massa cozida (sem sal em excesso ou molhos picantes/gordurosos), cascas de ovos trituradas (excelente fonte de cálcio) e restos de fruta (maçã sem caroço, pera, melancia).

□ **Dica Nutricional:** Fornecer ervas seguras como o dente-de-leão e restos de hortícolas melhora a coloração da gema do ovo e garante galinhas mais ativas e entretidas no quintal.

O que Fazer se Suspeitar de Intoxicação

Se notar que uma galinha apresenta sintomas e suspeitar que ingeriu uma planta tóxica, aja rapidamente:

1. **Isolar a ave:** Coloque imediatamente a galinha afetada num espaço calmo, seco, escuro e seguro, longe do resto do bando para evitar que seja pisada ou atacada.
2. **Remover a fonte:** Inspeccione o espaço e retire qualquer vestígio da planta tóxica do alcance de todas as galinhas.
3. **Fornecer água limpa:** Mantenha água fresca disponível. Consulte um médico veterinário especializado em aves para orientação sobre medicação de suporte ou carvão ativado.
4. **Não forçar alimentos:** Deixe o sistema digestivo repousar enquanto aguarda avaliação profissional.

Prevenção: Como Proteger o Galinheiro

A melhor defesa é a prevenção ativa no recinto:

- **Vedar zonas de risco:** Cerque canteiros com plantas ornamentais perigosas (como loendros e hortênsias) para que as galinhas não tenham acesso.
- **Inspeção regular:** Limpe o perímetro do galinheiro, arrancando infestantes tóxicas como a cicuta ou a hera.
- **Plantar aromáticas protetoras:** À volta do galinheiro, plante ervas benéficas e seguras que ajudam a afastar pragas e são seguras se bicadas, como alecrim, lavanda, tomilho e hortelã-pimenta.

Tabela de Consulta Rápida

Planta	Perigo / Princípio Ativo	Sinal Clínico Principal
Loendro	Glicósidos cardioativos (oleanodrina)	Arritmias, tremores, morte súbita
Teixo	Alcaloides letais (taxina)	Paralisia respiratória, colapso
Cicuta	Neurotóxico (coniina)	Convulsões, paralisia progressiva
Dedaleira	Glicósidos digitálicos	Perturbações cardíacas, diarreia
Hera	Saponinas triterpénicas	Irritação oral, diarreia severa
Batata Verde	Solanina nos tubérculos/rebentos	Fraqueza nas patas, apatia
Tomateiro (verde)	Tomatina em folhas e caules	Perturbações digestivas, fraqueza
Feijão Cru	Lectinas / fitohemaglutinina	Diarreia sanguinolenta, colapso
Cebola/Alho	Dissulfuretos (anemia hemolítica)	Urina avermelhada, cristas pálidas
Abacate	Persina tóxica em folhas/fruto	Dificuldade respiratória aguda
Ruibarbo	Ácido oxálico nas folhas	Falha renal, tremores
Hortênsia	Glicósidos cianogénicos	Letargia, respiração ofegante
Aroeira	Resinas e frutos irritantes	Irritação gastrointestinal
Loureiro-cerja	Compostos cianogénicos	Dificuldade respiratória
Rícino	Ricina nas sementes	Vómitos, diarreia com sangue
Bico-de-papagaio	Látex irritante	Salivação intensa, irritação

Guia compilado para criadores — A segurança do seu aviário começa na prevenção quotidiana.