

PRIMEIROS SOCORROS NO GALINHEIRO

O Guia Definitivo e Completo de Emergência Avícola para Criadores

Capítulo 1: Introdução, Psicologia e Fisiologia de Sobrevivência

As galinhas (*Gallus gallus domesticus*) são aves fascinantes, mas possuem uma característica evolutiva que desafia frequentemente os criadores: **o instinto absoluto de mascarar a doença**. Na natureza, presas que demonstram fraqueza são imediatamente abandonadas pelo bando ou abatidas por predadores. Por esta razão ancestral, quando uma galinha finalmente apresenta sinais evidentes de apatia, cabeça encolhida ou penas eriçadas, o problema já evoluiu de forma silenciosa ao longo de vários dias.

O papel do criador de galinheiro familiar não é apenas alimentar e recolher ovos, mas atuar como um observador clínico diário. Manter a calma, agir com método científico e implementar medidas imediatas de suporte vital são os pilares que distinguem a perda de um animal da sua recuperação bem-sucedida.

Regra de Ouro do Socorrista Avícola: Nunca entre em pânico. O stress do criador transmite-se à ave e agrava o choque hipovolêmico ou respiratório. Tenha sempre um plano estruturado, um espaço de quarentena pré-preparado e um kit de emergência acessível em menos de 60 segundos.

1.1 A Necessidade de Avaliação Sistémica

Uma galinha doente raramente tem apenas um problema isolado. A falência de um sistema (como a digestão ou a postura) afeta rapidamente todo o metabolismo. Compreender a anatomia básica avícola — como o funcionamento do papo, a moela, o aparelho respiratório com sacos aéreos e a cloaca — é fundamental para não aplicar tratamentos errados que possam acelerar o desfecho fatal.

Capítulo 2: Anatomia Básica para Emergências Avícolas

Antes de administrar qualquer procedimento de primeiros socorros, é vital compreender os aspetos anatómicos mais singulares das galinhas:

- **Aparelho Respiratório:** As galinhas não têm diafragma. A ventilação dos pulmões depende inteiramente dos movimentos da caixa torácica e dos sacos aéreos distribuídos pelo corpo. *Consequência crítica:* Nunca aperte o peito de uma galinha com força ao segurá-la, pois isso sufocá-la-á de imediato.
- **O Papo (Crop):** Um órgão de armazenamento localizado na base do pescoço, do lado direito. Serve para amaciar o alimento antes de este descer para o proventrículo e moela. Obstruções ou infeções fúngicas no papo são extremamente comuns e requerem manobras específicas.

- **Sistema Reprodutor:** As galinhas ovulam quase diariamente. O trato reprodutor (infundíbulo, magno, istmo, útero e vagina) é altamente suscetível a infecções (salpingite), retenção de ovos e peritonite interna.
- **Termorregulação:** A temperatura corporal normal de uma galinha ronda os 41.1°C a 41.7°C. Elas não suam; regulam a temperatura através da respiração de bico aberto e do fluxo sanguíneo na crista e barbatanas.

Capítulo 3: O Kit Avançado de Primeiros Socorros a Ter em Casa

A preparação prévia poupa tempo precioso. O seu kit de emergência avícola deve estar guardado numa mala estanque e organizada, contendo obrigatoriamente:

- **Luvas de nitrilo e resguardo:** Proteção mútua contra zoonoses (como salmonela ou ácaros) e biossegurança.
- **Soro Fisiológico (NaCl 0.9%) em quantidade:** Indispensável para lavagem ocular, limpeza de feridas profundas e desinfecção de tecidos expostos sem ardor.
- **Seringas descartáveis sem agulha (1ml, 3ml, 5ml, 10ml e 20ml):** Essenciais para lavagens sob pressão controlada e suplementação hídrica assistida.
- **Povidona Iodada (Betadine cutâneo) e Clorexidina:** Antissépticos de largo espectro seguros para uso aviário.
- **Amido de milho ou pó estancador:** Aplicação imediata em unhas partidas, sangramentos de crista ou feridas superficiais.
- **Compressas de gaze estéril e ligas coesivas auto-aderentes:** Para pensos que não colam nas penas.
- **Eletrólitos veterinários orais e vitaminas do complexo B:** Para combater desidratação e choque metabólico.
- **Vaselina pura ou óleo de coco:** Utilizado em casos de ovo preso, parasitas externos e proteção de pele.
- **Cotonetes e tesouras cirúrgicas de ponta romba:** Para cortar penas sujas ou aceder a zonas delicadas.

Dica de Manutenção do Kit: Verifique as validades de todos os soros e antissépticos a cada 6 meses. Mantenha lanternas de LED com pilhas carregadas para inspeções noturnas no galinheiro.

Capítulo 4: Protocolo de Triagem e Exame Físico Passo a Passo

Quando detetar uma ave debilitada, execute um exame físico sistemático da cabeça à cauda:

1. **Cabeça, Olhos e Narinas:** Verifique se há corrimento nasal transparente ou purulento, espuma nos olhos (sinal de Mycoplasma) ou inchaço nos seios nasais. A crista deve estar túrgida e vermelha; cristas pálidas indicam anemia ou parasitas; cristas roxas ou azuladas indicam cianose (falta de oxigénio ou problemas circulatórios).
2. **Papo:** Palpe suavemente a zona do papo. Se estiver duro como uma bola de ténis, pode ser impactação alimentar. Se estiver mole, cheio de líquido malcheiroso e a ave regurgitar líquido ácido ao inclinar-se, suspeite de papo pendular ou candidíase.
3. **Abdómen e Cloaca:** Palpe o abdómen entre as pernas. Deve ser macio e flexível. Um abdómen duro, excessivamente dilatado ou cheio de líquido indica ascite, peritonite ou ovo partido internamente. A cloaca deve estar limpa; sujidade acumulada indica diarreia severa ou parasitas internos.
4. **Asas e Pernas:** Verifique a simetria das asas e se a ave consegue apoiar o peso em ambas as patas sem tremores ou rotações anómalas nas articulações.
5. **Plumagem e Pele:** Afaste as penas à volta da base da cauda e debaixo das asas para detetar piolhos, ácaros vermelhos ou picadas infetadas.

Capítulo 5: Instalação e Gestão da Zona de Quarentena e Hospitalização

Toda a galinha doente deve ser imediatamente afastada do bando principal. As galinhas são animais hierárquicos e cruéis com os elementos débeis, bicando-os até à morte se estes não forem isolados.

5.1 Como Montar a Caixa Hospital

- **Recipiente:** Uma caixa de plástico rígido de grande capacidade (tipo multibanco de 100L) com tampa perfurada para ventilação, ou uma gaiola de coelhos/cães limpa e forrada.
- **Cama:** Utilize papel de jornal picado ou toalhas de papel limpas nos primeiros dias. Evite serradura fina em feridas abertas, pois pode infetar os tecidos.
- **Temperatura e Conforto:** Se a ave estiver em choque, hipotérmica ou apática, mantenha o ambiente a uma temperatura estável entre 22°C e 25°C, recorrendo a uma lâmpada cerâmica de aquecimento ou garrafa de água morna revestida com uma toalha grossa.
- **Acesso a Água e Comida:** Coloque comedouros e bebedouros baixos, de fácil acesso, para que a ave não precise de se esforçar para se alimentar.

Capítulo 6: Emergências Traumáticas e Cirúrgicas (Sem Medicamentos)

6.1 Ataques de Predadores e Feridas Profundas

As raposas, cães, saca-rabos ou aves de rapina deixam frequentemente feridas dilacerantes.

- **Procedimento Imediato:** Lave a ferida exaustivamente com soro fisiológico morno para remover terra, penas e coágulos velhos. Aplique Povidona Iodada (Betadine) generosamente. Se houver pele descolada mas com irrigação, mantenha-a limpa. Isole a ave num local escuro para reduzir o movimento e evitar stress.
- **Sangramentos Ativos:** Se a crista ou uma unha sangrar profusamente, pressione com amido de milho ou farinha durante 2 minutos até estancar.

6.2 Fraturas e Entorses em Membros

- **Asas:** Imobilize a asa junto ao corpo da ave utilizando uma ligadura elástica coesiva suave, sem apertar o peito. Mantenha em repouso absoluto durante 10 a 14 dias.
- **Patas:** Fraturas ósseas em patas de galinhas são difíceis de alinhar sem apoio veterinário, mas fraturas simples podem beneficiar de repouso restrito numa caixa pequena e acolchoada para que o osso cale por repouso.

6.3 Canibalismo e Bicadas Severas no Bando

Se uma galinha for bicada até sangrar na crista ou cauda, as outras continuarão a atacá-la devido à atração pelo sangue.

- **Ação:** Retire a vítima imediatamente. Lave e desinfete as feridas e aplique um spray protetor de sabor amargo ou coloração prateada anti-bicagem. Só a reintroduza quando a pele estiver totalmente sarada e com penas a nascer.

Capítulo 7: Emergências do Trato Digestivo e Reprodutor

7.1 Papo Impactado (*Impacted Crop*)

Ocorre quando a ave ingere fibras longas, capim seco ou palha que formam um novelo indigerível que bloqueia a saída do papo.

- **Sintomas:** Papo duro, volumoso e rijo mesmo de manhã cedo, antes de comer. A ave emagrece e perde o apetite.
- **Primeira Ação:** Retire toda a comida durante 12 a 24 horas, mantendo apenas água com eletrólitos. Massage o papo suavemente de baixo para cima para tentar desagregar o bolo. Adicione algumas gotas de óleo vegetal na boca para lubrificar. Se não resolver em 48 horas, consulte um veterinário para esvaziamento cirúrgico.

7.2 Ovo Preso (*Egg Binding*)

Uma emergência médica grave e potencialmente fatal, comum em poedeiras jovens ou galinhas mais velhas.

- **Sintomas:** Ave prostrada, com a cauda descaída, a fazer força constante com o abdómen contraído, sem conseguir defecar nem expelir o ovo.
- **Primeira Ação:** Realize um banho de assento com água morna durante 15 minutos. O calor relaxa os músculos do oviducto. Após secar a ave, aplique vaselina pura ou óleo de coco ao redor da cloaca com luvas. Coloque-a numa caixa escura, quente e silenciosa. O escuro estimula a paragem temporária da postura e o relaxamento muscular.

7.3 Prolapso da Cloaca

Ocorre quando o útero e a cloaca se viram do avesso após a postura de um ovo grande ou devido a esforço excessivo.

- **Primeira Ação:** Lave a zona prolapsada com soro morno e limpo para retirar sujeira e insetos. Com luvas lubrificadas, empurre delicadamente o tecido para dentro da cavidade abdominal. Isole a ave num espaço escuro por 48 horas para suspender a ovulação e permitir a cicatrização dos tecidos.

Capítulo 8: Emergências Ambientais, Metabólicas e Parasitárias

8.1 Golpe de Calor e Stress Térmico

Em dias de ondas de calor em Portugal, as galinhas sofrem rapidamente de hipertermia.

- **Sintomas:** Respiração ofegante de bico aberto, asas afastadas do corpo, crista pálida ou desfalecimento.
- **Primeira Ação:** Mude a ave para um local sombreado e ventilado. Borrife as patas e a zona debaixo das asas com água fresca. Adicione cubos de gelo e eletrólitos à água de bebida.

8.2 Infestação Severa por Parasitas Externos (Ácaro Vermelho e Piolhos)

- **Sintomas:** Apatia profunda, crista e barbatanas totalmente brancas, perda de penas no peito e pescoço, recusa em entrar no galinheiro à noite.
- **Primeira Ação:** Trate a ave com um inseticida ou pó antiparasitário aprovado para aves de capoeira. Limpe e desinfete a fundo todo o galinheiro, pulverizando fendas e poleiros.

Capítulo 9: Reabilitação, Nutrição e Reintrodução no Bando

A recuperação não termina quando a doença abrandar. O período de convalescença exige cuidados rigorosos.

9.1 Dieta de Recuperação

Forneça alimentos altamente nutritivos e de fácil digestão:

- Arroz cozido sem sal misturado com ovo cozido picado (fonte rica de proteína e energia).
- Flocos de aveia embebidos em água morna com vitaminas.
- Folhas tenras de dente-de-leão e vegetais frescos picados.
- Cascas de ovo limpas, cozidas e trituradas para reposição de cálcio.

9.2 Regras de Reintrodução no Bando

Quando a galinha estiver curada, as outras galinhas podem rejeitá-la e atacá-la por a considerarem uma “estranha” após o período de ausência.

- **Estratégia:** Utilize a técnica da “jaula dentro do galinheiro”. Coloque a galinha recuperada dentro de uma rede ou gaiola separada dentro do próprio galinheiro durante 2 a 3 dias. Elas conseguirão ver-se e habituar-se ao cheiro e presença sem que ocorram agressões físicas.

Capítulo 10: Sinais de que é GRAVE e o Veterinário é Obrigatório

Embora a gestão caseira resolva muitos cenários, existem limites clínicos intransponíveis. Procure um médico veterinário especializado em aves de capoeira se observar:

- Letargia extrema em que a ave não consegue manter-se de pé ou abrir os olhos.
- Dificuldade respiratória grave com ruídos estridentes (chiado, gorgolejo ou pescoço esticado para captar ar).
- Sinais neurológicos marcados (torcicolo extremo, rotação da cabeça, incapacidade de coordenar os movimentos ou paralisia total das patas).
- Hemorragias descontroladas ou fraturas expostas com fragmentos ósseos visíveis.
- Mortes súbitas inexplicadas em massa no bando.

Capítulo 11: Higiene e Biossegurança no Galinheiro

A prevenção diária reduz em mais de 80% a incidência de emergências no aviário:

- **Lavagem de Mãos:** Lave sempre as mãos e os antebraços com sabão desinfetante após manusear aves doentes ou limpar dejetos.
- **Desinfecção de Utensílios:** Higienize bebedouros, comedouros e seringas com soluções de lixívia diluída e enxague abundantemente com água limpa a cada semana.
- **Controle de Humidade:** Mantenha a cama do galinheiro limpa e seca. A humidade acumulada fomenta o desenvolvimento de fungos e amoníaco.

Capítulo 12: Tabela Completa de Consulta Rápida

Sintoma Observado	Causa Provável	Primeira Ação Imediata
Isolada, penas eriçadas, murcha	Doença sistêmica / Parasitas	Isolar, aquecer e dar água com eletrólitos
Ferida sangrenta na pele ou crista	Ataque de predador / Bicadas	Lavar com soro, aplicar Betadine e amido
Papo duro, volumoso e rijo	Impactação alimentar por fibra	Retirar comida, massajar suavemente, óleo vegetal
Abdômen duro, faz força sem pôr ovo	Ovo preso (<i>Egg binding</i>)	Banho de assento morno e isolamento escuro
Respiração de bico aberto, asas caídas	Golpe de calor / Hipertermia	Sombra, ventilação e borrifar patas com água fresca
Cristas e barbatanas totalmente brancas	Anemia grave por parasitas	Aplicar acaricida/inseticida e suplementar ferro
Prolapso visível na zona da cloaca	Esforço excessivo na postura	Lavar com soro, repor tecido com luvas e isolar
Incapacidade de andar, pernas bambas	Traumatismo ou carência nutricional	Repouso absoluto em caixa pequena e vitaminas
Corrimento espumoso nos olhos e nariz	Infeção respiratória crônica	Limpar narinas, isolar e ventilar o espaço

Guia Definitivo de Primeiros Socorros Avícolas — Cuidar com rigor e rapidez é garantir a longevidade e saúde do bando.