NOVA PLANTARVM GENERA,

Auctore

I. C. Buxbaum.

I.

Chamædaphne.

Frequens est Ingriæ & Careliæ uliginosis & terra turfacea scatentibus ericetis frutex, Botanicis hucusque minus notus, qui merito novum constituit genus, cuius notæ sunt: Flores monopetali, campaniformes globosi, fructus in quinque loculamenta divisi, seminibus fœti exiguis subrotundis. Adde modum nascendi, qui Polygonato vulgari respondet. Descriptio sit sequens: Radix lignosa, tortuosa, repens, ramosa, quæ hinc inde fibras in fasciculos congestas dimittit, novos quoque iuxta stipitem emittit stolones. Caudex digiti fere crassitie, spadiceus, dodrantali spatio

terram ſuperans, in duos vel tres maiores, hique rurſus in minores brachiantur ramos arcuatos & verſus terram inclinatos. Folia ex ſummis egrediuntur ramis, alternatim poſita, oblonga, ex rotundo paulum acuminata, rigida, granulis albidis adſperſa, quaſi puſtulata, ſuperiore parte obſcure, inferiore vero dilutius viridia, glabra, hyemisque patientia, petiolis brevibus adhærentia & erecta. Inferiora ſunt maiora, eque horum alis gemmæ novorum ſurculorum prodeunt quatuor vel quinque, ſuperiora vero ſucceſſive, quo altius adſcendas, minora & magis rotunda, tandemque Serpilli foliorum æmula evadunt. Ex ſingulis horum alis ſinguli enaſcuntur flores, brevi petiolo reflexo inſidentes, penduli, nivei, quinque laciniis acutis conniventibus diſſecti, calyce quinquifido, brevi, ſuſco, & ab alio bifido ſuſtentato cincti, decem ſtaminibus, piſtillum breve quinquetrum ambientibus præditi. Sequuntur capſulæ quinquangulares, quinqueloculares, & quinque valvis ab apice dehiſcentes, perianthio inſtar ſtellæ expanſo inſidentes. Mirum in hac planta eſt, quod folia, quæ tota retinet hyeme, media demum æſtate abiiciat. Floribus enim ultimis Maii & primis Iunii diebus emarcidis, iam novi ex alis foliorum inferiorum rami frugiferi ſurgunt ſurculi, qui maius incrementum ſumentes Iulio producunt folia & florum gemmas, prioris interim anni foliis delapſis, ramulisque nudis cum ſolo relictis fructu. Gemmæ vero novi ſurculi eo perveniunt, ut, ſi calycem, quo obvolvuntur, immaturum aperias, ſtamina florum futuri anni clare ſe conſpicienda exhibeant. Videtur autem tota planta tempeſtate accedente frigida, Auguſto nempe & Septembri, exa-

exareſcere. Vere tamen ſequenti, ſi aliquot ſaltem dies ſol læte fulſerit, folia ante nigra viridem acquirunt colorem, & planta floribus onuſta elegantiſſimis non ſine ſtupore conſpicitur. Ramulus, qui ante annum floruerat, eſt aridus, foliis orbus, capſularum ſeminalium ſaltem veſtigia brevi etiam interitura oſtendens, terræque proximus, licet ante annum in ſummitate fruticis locatus. Quamvis enim ſingulis annis hic frutex procreſcat, nunquam tamen evadit altior, ſed caudex ſemper verſus terram inclinatur & novas agit radices. Ob foliorum aliquam cum Lauro ſimilitudinem nomen hactenus vacuum, olim tamen variis tributum plantis, revocamus & Chamædaphnen nominamus. Vid. Fig. I.

II.

Potamopitys.

Planta hæc paluſtris facie externa convenit cum I. Bauhini Equiſeti facie Polygono fœmina, ſeu Limnopeuce Cordi, ob florem & fructum vero longe diverſa, uti patebit ex deſcriptione ſequenti: Radix fibroſa. Caulis palmaris fere, interdum ramoſus, (qualem noſtra figura exhibet) rectus, rotundus, concavus, ex multis articulis pyxidatis confiatus. Ex his ipſis articulis egrediuntur folia radiatim poſita, ſex, ſeptem vel octo, quæ radici proxima & inferiora, ſunt anguſta, mollia atque virentia, Gallii foliorum æmula; ſuperiora vero multo latiora, quatuor, tria vel interdum duo ſaltim coniuncta. Ex foliorum alis exeunt flores parvi, albicantes, ex petalis quatuor, anguſtis & acutis, cruciatim poſitis, conſtantes, ſeſſiles, calyce pariter quatrifido ſuſtentati, in floris

medio piſtillum rotundum, quatuor ſtaminibus cinctum. Fructus ſequitur rotundus, quadricapſularis, ſeminibus gracilibus lunatis fœtus. Character itaque huius plantæ eſt: Folia ſtellata, flores tetrapetali & fructus in quatuor loculamenta diviſi. Pertinet iuxta Raium ad Herbas flore tetrapetalo anomalas. Occurrit in paluſtribus Thraciæ, non longe a Boſphoro prope pagum Boiucteri, floret Maio. Fig. II.

III.

Ceratocarpus.

Huius notæ ſunt: Folia graminea. Flores apetali, calyce deſtituti, embryoni inſidentes. Fructus triangulares depreſſi, capſulæ Burſæ paſtoris fere ſimiles, bicornes & bivalves, ſemine fœti unico, ſingularis figuræ, longum enim eſt, gracile & teres, cuius extremitates inſtar arcus inflexæ & ſibi invicem adductæ intermedia coniunguntur membrana. Deſcriptio vero eſt ſequens: Radix parva, fibroſa, ut mihi videtur, annua, ex qua cauliculus unicus, lignoſus & anguloſus, ab exortu ſtatim ramoſus. Folia anguſta, graminea, unum vel duo, ſingulo ramo nec non ſingulæ capſulæ aut flori ex caule emergenti ſingulum appoſita, rigida, in medio carinata. Ex alis foliorum aut ramulorum naſcuntur floſculi ſtaminei, exigui, lutei, nullo obvoluti calyce, ſed fructum ſtipantes tenerum, qui deinde abit in capſulam bicornem ſupra deſcriptam. Creſcit in locis ſqualidis, ſalſis & arenoſis, circa mare Caſpium, in regione Tageſtan, nec non circa Aſtrakan. Auctumno caulis a radice a ventis divellitur & vagatur per campos, more Eryngii aut Echinophoræ. Ob duos capſulæ aculeos ſeu cor-



fig: 1.

fig: 2.



fig. 1.



fig. 2.




fig. 3.



fig: 3.

cornua ſic appellare placuit. Deſcribitur a Tourneforſtio in Corollario novum genus, Ceratoides, a fructu cornuto. Diu hæſi dubius, anne Ceratocarpus noſter ſit eius Ceratoides folio Pſyllii. Sed fructum dicit bicapſularem a flore remotum. Suſpectus tamen mihi eſt, quod nullam Ceratoidis dederit figuram. Forſitan vidit plantam immaturo adhuc fructu & deceptus eſt. Fig. III.

DE DIRECTIONE CORPORVM GRAVIVM *IN VORTICE SPHAERICO*, ET FIGVRA NVCLEI,

Diſſertatio Experimentalis,

Auct.

G. B. Bülffingero.

Occasio et Destinatio Experimenti.

I.

SVnt anni complures; ex quo occaſione epiſtolæ a *Iac. Bernoullio* ad *I. Chr. Sturmium* ſcriptæ, & in Actis Erud. Lipſ. 1686. M. Febr. p. 92. ſeqq. exhibitæ, viſum mihi eſt, recte illos ſubducere rationes ſuas, qui *ex motu vorticis*, qualem *M. Nov.* 1725.