CATOPARDI PHOCAE & ELEPHANTI*

CISTERNA & CANALIS THORACICVS *primum detectus* a Io. Georgio Du Vernoi.

M. Sept. 1726.

CAnis, equus, lupus, leo, lynx, felis odorata & non odorata, cuniculus, porcus, erinaceus, vitulus adeoque undecim solummodo animantium genera eo cum successu incisa sunt, ut viarum chyliferarum conspectus in iis aliquando oblatus sit. Ex hisce vero non omnes, sed paucæ solummodo delineatæ; aliæ neglectæ uti ex historia animalium abunde patet. Propterea differentiæ viarum chyliferarum in variis animantium speciebus notitiam perexiguam nos tenere fatendum est. Nemo interea scire potest, in quibusnam speciebus canalis thoracicus latus dextrum potius quam sinistrum vel utrumque simul occupet? Num eius insertio contraria sit? Num chylus alia via quam per thoracem in sanguinem perveniat, & quæ forte aliæ sunt innumeræ proprietates circa huncce chyli transitum observandæ oculove minus indifferenti considerandæ. Itaque quum in Elephanto chylus haud diversa ratione quam in pennatorum genere sine ope ductus thoracici ad massam sanguineam contendit; quum in Phoca canalis thoracicus sub forma arcus offertur; quum denique singularem in Catopardo huius con-

* *Anno* 1727. *demum instituta fuit Anatome Elephanti, cuius ductus thoracicus aptiorem hic locum obtinere visus est.*

conformationem deprehendimus: magna sane suspicio est, in cæteris quoque animantibus magnum circa vias chyliferas discrimen a conditore animantium constitutum esse.

Quælibet animantia, quæ tantum non subtilitate sua visus aciem effugiunt, quocunque morbo ac tempore defuncta ad hancce disquisitionem adhibere licet, sicuti tribus hisce exemplis comprobavimus.

Prima dissectio fuit cuiusdam feræ in vivario SVAE IMP. MAI. defunctæ, a Parisiensibus *Chatpard*. vocatæ; vid. *Memoires pour servir a l'histoire des Animaux*. Raio *Catus pardus* seu *Catus montanus Americanor. Synops. animal. quadrup. pag.* 169. In hacce dissectione præter vias chyliferas quædam sponte oblata sunt, quæ ad perficiendam magis ornandamve huius quadrupedis historiam, adeoque pro supplemento ad laudatam Parisiensium descriptionem conferre visa sunt.

Effigiem felinam aut lynceam, caput rotundum, rostrum breve, auriculas felinas, duos prælongos dentes caninos in utraque mandibula, sex incisores qui in superiore maxilla crassiores sunt, totidem molares in inferiore & octo in superiore, quorum duo utrinque positi vix apparent, digitos denique in singulis pedibus quaternos unguibus cinereo aduncis instructos obtinet, magnitudine lyncem aut vulpeculam æquans. Quem mensi sunt Parisienses, uno pollice altitudinis & dimidio pede longitudinis nostro cedit. Cauda felinæ similis est, cum unius pedis longitudine & trium pollicum peripheria. Pellis maculosa est & tricolor ex pilis flavescentibus nigris & albis, non asperis neque longis, picturam mixturamve macularum admirabilem efficientibus. Dorsi maculæ nigræ & flavescentes,

tes, ad ventris latera albæ & flavæ, in ventre partim flavæ & nigrescentes, quales etiam in pedibus conspicuæ sunt. Figura macularum veluti in Tigride oblonga seu virgata, quo charactere hæc fera æque ac Tigris a Pantheris differt. In medio dorsi macula una præ aliis notabilior est instar fasciæ in longum protensa, quædam minus longæ sunt uti in ventris lateribus aliæ minores & breviores, figuræ ovalis, maculis prioribus inclusæ, quatuor in cervice, quarum duæ mediæ serpentum instar flexuosæ prope occiput ad invicem inclinatæ mox in duo cornua figuræ V terminantur duæ aliæ exteriores pariter flexuosæ, posterius ad radicem auricularum terminantur: eo loco quo desinunt, duæ tenues fasciolæ inter duas auriculas usque ad palpebræ superioris medium protenduntur relicto vacuo seu area in vertice plurimis punctis nigricantibus seu maculis consperſa. Prope angulum oculi exteriorem, duæ utrinque fasciæ incipiunt, per medium genæ oblique sub auribus descendentes invicemque coeuntes. Cauda maculosa ex annulis imperfectis exteriore seu superiore parte flavis nigrisve, inferiore vero canis nigrisve pilis ornata. Denique notandum est, non solum mystaci sed etiam superciliis genisve infixas esse setas partim albas partim nigras easque valde rigidas, pellemque fortem exspirare odorem.

Non licuit in nostro similem imperfectionem seu defectum deprehendere, qui in Catopardo Parisiensibus secto conspicuus erat, quique variis præbuit ansam ratiociniis puta utriusque testiculi & vasorum præparantium deferentiumve defectum absque ullo apparente castrationis signo

gno. Excepto thymo, qui in utroque deficere visus est, nec non vesiculis spermaticis glandulisque sublingualibus, omnium partium apparatu bene instructus erat. Præter penem vagina sua inclusum sed admodum gracilem, testiculos duos bursa continebat avellanam æquantes, una cum parastatis, ductibus deferentibus in prostatæ corpus desinentibus arteriisq; & venis spermaticis, quæ propter suam exilitatem ægre inveniri possunt. Quod reliquas partes attinet, nimirum ossa, musculos, caput, pectus cum inclusis visceribus, ea fere eadem sunt cum iis, quæ partim in laudata descriptione, partim in descriptionibus hyænæ odoriferæ seu cati zybethici * iam tradita sunt. De exquisito huius animalis odoratu suspicionem facit, ampla turbinatorum ossium ossisque cribrosi superficies, item sinuum frontalium numerus auctus. De acie visus, punctum nigricans in fundo choroidis, quod in lynce pariter observatum est, nec non undecim musculi oculum moventes, una cum magnitudine glandulæ lachrymalis. De voracitate & cita dissolutione ciborum testantur dentes, lingua valde aspera & quasi spinosa, aculeis versus gulam inclinatis, glandula magna salivalis musculo oculi deprimenti adeoque orbitæ adhærens, cum ductu excretorio iuxta ultimum dentem molarem hiante, item duæ aliæ glandulæ conglomeratæ in cœlo palati conspicuæ, quæ glandularum sublingualium officio defunguntur, ventriculi pinguedo, crassities nec non foramina variæ magnitudinis, quorum nonnulla granum hordei facile, alia vix setam admittunt, qualia in

* *item Leonis, cuius dissectio his sub prælo sudantibus administratur.*

principio duodeni ſimul conſpeximus. Denique pancreatis amplitudo hepatisque ſeu potius vaſorum bilariorum ſingularis fabrica ſilentio minus prætermittenda eſt: Nam præter ſuperficiem hepatis plurimis punctis ſeu maculis albicantibus reſperſam, id notatu dignum viſum eſt, quod ſinguli ductus hepatici in unum ductum haud confluunt, ſed diſtinctis orificiis ductui cyſtico inoſculantur, ſpecie ductuum hepatico-cyſticorum. Ductus pancreatici & cholidochi ingreſſus communis in duodeni cavitatem quatuor digitis infra pylorum, in quo loco tunica inteſtini in tumorem oblongo-rotundum elevata eſt, ſub qua ſpecies receptaculi in conſpectum venit, in quo bilis & ſuccus pancreaticus invicem permiſceri videntur, antequam in cavum inteſtini effluant. Veſicula ipſa bilaria ſic conformata eſt, ut duobus ſepimentis horizontalibus, certa diſtantia remotis ac in medio foramine pertuſis, in duas veluti cameras diſtincta ſit. Poſtremo Lienis 8. transverſos digitos longi ſitus admodum curioſus viſus eſt: Nam in medio ventris ſub umbilico quaſi fluctuat, ſicuti omento ablato, quo inſtar panni omnia inteſtina obvolvuntur, luculenter conſpeximus.

Tab. II. *Fig.* 2. Hiſce præmiſſis Pecquetiani receptaculi & canalis thoracici, prout in hac rariſſima fera hæ viæ nobis oblatæ ſunt, deſcriptio accurata ſuppeditanda eſt. Tum vaſa lymphatica ex imo ventre utrinque aſcendentia *aa*, tum tria 4ve vaſa lactea meſenterii *bb* in faſciculum collecta, ex Aſellii pancreate ſub arteria meſenterii ſuperiore incedentia, primo in conſpectum veniunt iisque ciſterna continuata eſt. Ciſterna ipſa *c* veſicula ſimplex, parva, oblonga, transparens, digiti minimi apicem vix admittens, cuius ſitus

ſitus ordinarius eſt, factoque 9. linearum itinere ductus thoracici formam aſſumens : Pulchrior ac ornatior tum fabrica tum ſitu tum inſertione minus ordinaria canalis thoracicus *ddd* viſus eſt. Triquetram laternam referens ex tribus tubulis in medio diſtantibus ac denuo infra & ſupra coeuntibus conſtat, hæcque conformatio tribus in locis *eee* perſpicue apparet. Duo hinc efformantur canales *ff* diverſæ capacitatis diſtantia aliquot linearum ſeparati, qui non ſuper dorſi ſpinam iuxta venam ſine pari, ſed iuxta latus ſiniſtrum aortæ ſuper radices coſtarum usque ad cordis baſin incedunt. Eodem tempore arteriæ intercoſtales modo ſub illis modo ſuper illos decurrere obſervantur. Porro duo prædicti canales tandem coeunt, ſicque unus efficitur ductus ſtraminis craſſitie, prope arcum aortæ incipiens, & iugulum verſus ſub carotide ſiniſtra ad venam iugularem contendens g. Equidem quum in animantibus hactenus notis canalis thoracicus haud ſupra altitudinem vaſorum axillarium aut ſubclaviorum aſcendat, Catopardo paucisque aliis id proprium eſt ut ultra memorata vaſa ſubclavia notabiliter excurrat, (huicce vero animantium generi claviculæ conceſſæ ſunt) maioremque adeo longitudinem acquirat, quippe ad medium fere cervicis perveniens, facta levi inclinatione in venam iugularem internam ſiniſtram deſinit.

Phoca.

Phoca incola eſt Maris Balthici & Newæ fluminis isque in omnibus piſcinis Petropolitanis ad curioſitatem alligatus venalis proſtat. Exemplo itaque Eruditorum ma-

Tab. II. *Fig.* 3.

ris Balthici Academiæque Pariſinæ in hac quoque urbe Imperiali vitulus marinus nuper diſſectus eſt. Inſtituti autem ratio poſtulat, ut de viis chyliferis a nobis primum detectis ſolummodo idque quam breviſſime agamus, quumque primum amphibium ſit in quo receptaculi ductusque *Pecqueti* demonſtratio facta eſt, nihil obſtare videtur, quo minus in aliis huius ſpeciei animantibus tam minoribus quam maioribus, uti ſunt equus marinus, rana, lutra, caſtor &c. easdem vias exiſtere dicamus. 1. Obſervari meretur inferiorum partium lymphatica ad ciſternam contendentia vix ultra pelvim aſcendere, quia ſitus ciſternæ talis eſt, ut proxime ad pelvis confinia ortum ſuum habeat. 2. Ciſterna *a* omni artificio vacua eſt, ampullam valde amplam oblongamve ſimulque pellucidam ſeu hydatiformem referens. 3. Non diſpar habitudo canalis huic continuati *bbb*, ſiquidem magna ſimplicitate, unaque bifurcatione in principio, altera prope extremitatem, cum duplici ramo ad venam axillarem contendente præditus eſt. Eius porro notabilis amplitudo excedens proportionem corporis; Arcus denique quem efformat, cuiusmodi exemplum antea nunquam viſum eſt, ſingulari attentione digna ſunt.

Elephantus.

Inter omnia Animantia terreſtria Elephantus ob ſummum eius pretium molemque corporis maximam cultro anatomico digniſſimum aptiſſimumque cenſendum eſt. Quis vero non putet ſibi facile eſſe, absque cognitione inventorum *Aſellii & Pecqueti*, clauſis fere oculis, vias chyliferas in tam vaſto corpore invenire? niſi diſſectiones

trium

trium quatuorve Elephantorum a *Pecqueti* temporibus inſtitutæ contrarium edocerent. Cauſa nulla alia eſſe poteſt quam 1. quia ad canalis thoracici præparationem neceſſaria eſt talis reſolutio, ut Proſector non manibus ſolummodo, ſed pedibus & toto ſuo corpore intra ipſum corpus Elephanti ſeſe demittat in eoque ceu carcere aut ventre balænæ per aliquot horarum ſpatium perduret. Atqui ſub talibus conditionibus vias chyliferas videre nemo cupit. Altera cauſa eſt quod Proſectores Elephantorum, eos viis prædictis penitus deſtitutos eſſe fortaſſis credant; Equidem aliquam rationem ſeu fundamentum huicce opinioni ineſſe fatendum eſt: Nam diſtinguere inter vias Aſellianas & Pecquetianas omnino neceſſe nobis videtur: Etſi incredibile & conceptu arduum ſit Animantia dari ductum habentia thoracicum ſed vaſis lacteis deſtituta, id tamen certo certiſſime affirmare poſſumus quacunque arte diligentia & præparatione adhibita, ea per integrum octiduum fruſtra quæſita fuiſſe. Si quis de noſtra diligentia potius quam de naturæ defectu dubitet obiiciens, vaſa lactea non tam defuiſſe quam latuiſſe, is conſideret nihil fuiſſe quod eorum conſpectum difficilem nobis reddere poſſet: Non earum parvitas, ſiquidem in Cuniculis & Erinaceis Elephanto millies magnitudine inferioribus ea conſpicua ſunt: Non pinguedo neque concidentia: Talia enim obſtacula non amplius hodie curamus. Verum enimvero, ut minor hallucinationis ſuſpicio ſuperſit, illud etiam probe attendendum eſt, in toto meſenterio quod admodum amplum & vaſtum erat, non ſolum vaſa lactea ſed etiam glandu-

las meſaraicas, lacteorum perpetuas in aliis animantibus comites ita defuiſſe, ut ne veſtigium earum appareret.

Tab. 11. *Fig.* 4. Unius hac vice canalis thoracici eique appenſorum lymphæ ductuum carotidem hominis fere æquantium exiſtentiam certo ſtatuere poſſumus: Nam quod receptaculum attinet, ambiguum eſt quid proprie hocce nomine appellari debeat, ſiquidem eo in loco ubi ordinario ciſterna adeſſe ſolet, nihil præter quatuor canales *aaaa* ductui thoracico appenſos invenire & obſervare licet. Prædictis ductibus canalis thoracicus *bbbb* ſimplex ſed magnitudine ſua Elephanto reſpondens continuatus eſt. Is ductu ſimplici absque diviſione & biſurcationibus magnamque rectitudinem obſervans, ſuper ſpinam dorſalem vena ſine pari & aorta ſtipatus incedit. Poſtquam ad 3. dorſi vertebram pervenit, notabilem dilatationem *c* duos pollices longam in eo obſervavimus, cuius cauſa proinde ſeu naturalis ſit ſive præternaturalis incerta eſt. Canalis porro in eo loco paulisper a ſpina dorſi recedens obliquo inceſſu ſummum thoracis iugulumve petit, tandemque in latere colli ſiniſtro duos in ramos *dd* breves diſpeſcitur, qui ad venæ iugularis cum axillari confluxum deſinere viſi ſunt. Tractus itaque ſeu longitudo canalis thoracici fere 4. ped. diameter 4. lin. æquat. Poſtremo haud prætermittendum eſt in toto eius tractu nullas nobis valvulas oblatas fuiſſe, etſi amplitudo canalis tanta fuerit, ut digitum minorem facile admitteret. Vice verſa ſubſtantia ductus poſt detractam pinguedinem eam craſſitiem obtinebat, quæ ordinario in vena iugulari hominis obſervari ſolet.

DE