OBSERVATIONES ANATOMICAE.

I.

Tumores vesiculosi.

GLobuli cavi, pellucidi, qui unionum forma viſceribus appenſi ſunt, quoad eorum producendi modum a Viris eruditis excogitatum, nova hodie difficultate laborare videntur: Nam hydatides hodie oſtenduntur, quæ non in ſuperficie ſolummodo ſed in profundo partium generatæ ſunt, uti autopſia teſtatum facit. Hæ in cavitate quadam cuiuslibet viſceris aggregatæ, ſerum continentes purum, pedunculis modo annexæ modo liberæ iacent. vid. *Ruyſchius. Courtial. Iourn. des Sc. An.* 1697. fol. 442. 457. *Hiſtor. Reg. Acad. Paris.* fol. 454. *Mem. de l'Acad. Roi. des Sc.* A. 1704. Iam manifeſtum eſt in hacce ſpecie notionem glandularum ac lymphæductuum paulo infelicius applicari, ſicuti rationes tum ex partium ſtructura tum ex obſtructionibus artificialibus deſumtæ demonſtrant. Omnium vero graviſſima difficultas illa eſt, quæ in certa ſpecie hydatidum nobis oblata eſt, cuius nullum exemplum forte exſtat. Hæ magno numero & ſub varia magnitudine amplo ſacco incluſæ ſunt, omni nexu ſolutæ & liberæ, nullo pediculo præditæ nec ſibi invicem cohærentes, & (quod attentione digniſſimum eſt) in ſua cavitate alias veſiculas minores, quæ ſimiliter cavæ aliisque veſiculis exiguis fœtæ ſunt, continentes. De hiſce ſeqq. hiſtoria legi meretur.

Exeunte Anno 1726. in hepate viri fumo carbonum exſtincti, cuius reliqua viſcera nullo ſenſibili vitio

rupta erant, prope fundum veſiculæ felleæ magnus eminebat tumor globoſus, cuius alterum hæmiſphærium ſub ſtantiæ hepatis firmiter incorporatum erat. Poſt eius ſeparationem, antequam incideretur, lanci impoſitus eſt, isque unam libram & quatuor drachmas pendebat, ex cuius proinde mollitie & albo colore magnam humoris quantitatem in eo collectam eſſe viſum eſt. Inciſione facta rem ſecus ſe habere humoribusque vacuum tumorem eſſe admirati ſumus. Tota eius cavitas ab imo usque ad ſummum incredibili numero veſicularum compreſſarum & pelliculas uvarum vacuas mentientium infarcta erat, hancque veſicularum congeriem unus ſaccus globoſus cute admodum dura & craſſa eaque exterius lævi & polita, interius vero aſpera conſtans, ſeptemque drachmas pendens continebat. Eo aperto odore omni vacuum deprehendimus, etſi veſiculæ colorem virideſcentem obtinerent. Quamquam earum prodigioſa quantitas eſſet, ſui omnes iuris hoc eſt liberæ & ſolutæ absque ulla ſive cum ſacco ſive inter ſe invicem connexione, mutuo tantum ſeſe exoſculantes & comprimentes iacebant, verbo, exactiſſime pelliculas uvarum vacuas tum figura tum colore herbaceo ſeu virideſcente æmulabantur. Subſtantia pellicularum minime fibroſa ſeu organica, ſed concretum quoddam gelatinoſum eſſe videbatur. Quoad magnitudinem, ſub triplici differentia oblatæ ſunt nempe maiorum, minorum & minutiſſimarum, quæ invicem permixtæ acervo eodem comprehendebantur: Ovum nonnullæ columbinum, aliæ fabam, aliæ denique piſum æquabant.

Exteriore harum veſicularum diſpoſitione ſic perluſtra-

ſtrata ad interioris quoque cavitatis contemplationem devenire neceſſe fuit, ſucceſſu minime pœnitendo, ſiquidem in phænomeni extraordinarii & forte inauditi cognitionem præter ſpem incidimus. Poſtquam veſicularum nonnullarum expanſio ſeu inſufflatio immiſſo aere facta eſt lucique hæ exponerentur, aliquid in earum cavo quod flatu ſeſe movebat, includi nobis viſum eſt: Veſiculis igitur apertis, nihil aliud quam minores veſiculæ ab omni nexu liberæ, inæqualis magnitudinis, minime inter ſe cohærentes, in vacuo fluitantes, numero ternario quaternariove, magna cum lætitia ſpectatorum oblatæ ſunt. Cæterum tum colore, tum figura, tum ſubſtantia, a continente veſicula quæ ovarii vices tenebat, haud abſimiles erant. Poſtremo ne quicquam intactum relinqueretur, cupido inceſſit eas omnes veſiculas toto acervo comprehenſas enumerandi earumque ſummam extrahendi. Itaque ſine reſpectu magnitudinis, portio harum veſicularum permixtarum usque ad unius drachmæ pondus lanci impoſita eſt. Quæ numeratæ præter minores earum cavo contentas ſeptuagenarium numerum cum uno aut altero completum, efficiebant: Ex quo veſicularum ſumma, quæ quidem ultra 9000. aſcendit, facile colligi poteſt. *Tab.* 12. *Fig.* 4.

Hoc certe phænomenum etſi ſolutu difficile, ex bullis humorum vitioſorum magis quam fragmentis organicarum partium originem ſuam trahere veroſimile eſt.

II.

Eousque quorundam hominum ſtultitia excedit, ut *Exſplenii*, hoc eſt, ſine liene vivere pro ſummo bono ali- *Ruptio Lienis.*

quando teneant. Idcirco in generis humani perniciem quædam operatio, transfuſoria funeſtior inventa eſt quam *Exciſionem lienis* vocant. Culter ligneus ſuper hypochondrium applicatur, quem una manu ſuſpenſum tenet artifex, deinde malleum altera manu prehendit, ac cultrum magna vi, unaque cum ipſo lienem, uti fabulatur, percutit. Quo facinore perpetrato, non ſolum disruptionem lienis ab ictu factam eſſe impudenter affirmat, ſed talia etiam exhibet remedia quæ vim habent totam maſſam lienis diſſolvendi eamque ſic comminutam modo per vomitum modo per alvum vel quacunque via alia expellendi. De hacce inviſibili exciſione lienis vid. *Iourn. des Savans* 1672. Quum in hocce negotio non de ære ſolummodo, ſed de vita hominum certo certius agitur, periculum ſaltem indicandum eſt: Etſi enim tales impoſtores disruptionem lienis neque intendant neque forte poſſibilem aut noxiam eſſe putent, lienum tamen ex levi cauſa diffractorum mortemque inferentium exempla contrarium demonſtrant, laterisque percuſſiones periculo plenas evidenter ſignificant. In hunc modum Vir iuvenis, pugnis cum altero ſeſe excercens in hac urbe ſubito mortuus eſt: Vix enim cultro inciſis abdominis tegumentis quæ vehementer diſtenta erant, tanta copia cruoris exiit, ut pelves omnes præſentes vix ſufficerent, unde venter ſtatim detumuit; Lienem in medio ruptum, ea parte qua ſtomacho obverſus eſt, hocque proinde vulnere hæmorrhagiam excitatam fuiſſe perſpicue obſervavimus.

III.

Hæmorrhagia omenti. Sub eodem tempore, percuſſionis Abdominis infelicem exitum alia diſſectio fœminæ a milite percuſſæ & ſubito mor-

mortuæ nobis expoſuit. Poſtquam enim totum abdomen ſanguine effuſo oppletum eſſet, ex omenti hæmorrhagia hanc occubuiſſe ex hoc uno conſtabat, quia inter folia omenti parvi grumuli intercepti & incluſi erant. Cæterum in rariſſima hacce læſione, illud forte in conſiderationem trahendum eſt, quod præter naturæ inſtitutum, omentum fundo uteri connatum eſſet. vid. *Ruyſch. Obſ. Anat. Chirurg.* LXIII. & LXXXIII.

IV.

Hæmorrhagia ſtomachi.

Inter mortes ſubitas hominum inſolens exemplum hæmorrhagiæ occultæ Stomachi ſe ſiſtit, non ea de cauſa lethalis, quia ſanguis extra nimium in modum prorumpit; ſed quia ſtomachus citius ſanguinis copia opprimitur & ſuffocatur quam eius ſive per os ſive per inteſtina effluxus excretione fieri poteſt. Eo autem modo homo ſexagenarius enecatus eſt improviſo absque ulla ſuſpicione cauſæ in ſtomacho latentis, hoc eſt, ſine vomitu, ſine deiectionibus cruentis. Tota cavitas ventriculi uno prægrandi & formam eius referente grumo eum in modum obſeſſa & oppleta erat, ut ſpatium nullum vacuum inter pylorum & ſiniſtrum orificium relinqueretur. Cæterum prædictam maſſam nihil aliud eſſe quam purum ſanguinis grumum absque alterius ſubſtantiæ permixtione tum viſu tum experimento cognovimus. In ſtomacho mirum dictu! perfectæ integritatis: In Liene e contra putredinis notæ deprehenſæ ſunt.

V.

Notæ ſeu impreſſiones fulminis.

Notas ſeu impreſſiones fulminis tam externas quam internas in variis regionibus annotatas, forte non omnino contemnere licet, ut natura huius ſtupendi phænomeni paulo cla-

clarius eluceſcat: Abdominis & membri genitalis inflatio: Cutis lateris ſiniſtri in durum corium igne torrefactum commutata, in reliquis partibus purpurea, in collo rubra: Sanguinis ex aure dextra ſtillicidium: In ſummo vertice vulnus lacerum absque cranii læſione, non penetrans, 2. lineas longum & $\frac{1}{2}$ latum, externe conſpectui oblata ſunt. Interne præter copiam ſanguinis inſolitam in cranii apertione erumpentem, ſanguis in duræ matris ſinubus inſtar aquæ fluidus, item in ventriculis & baſi cerebri, inque vertebrarum theca ſeri magna copia incluſa apparuit. Pectore aperto uterque Pulmo mediocriter collapſus nigricansque; Cordis ventriculi, auriculæ, vaſaque communia ſanguine vacua. Separatis denique abdominis tegumentis inteſtina una cum ſtomacho præ inflatione magno impetu proiecta ſunt. Hepar, Lien ac Renes vitio carebant: Sed veſica tum fellea tum urinaria vacuæ & collapſæ, cum ureteribus retentione urinæ valde diſtentis.

Hæcce in viro ſuper fluvium navigante fulmineque peremto obſervata fuere.

CLAS-