

Экспериментальное и теоретическое исследование процессов в условиях электроспрея и фрагментации арендiazоний тозилатов, трифлатов и тетрафторборатов методами ESI-MS и DFT

Alexander A. Bondarev,¹ Evgeny V. Naumov, Assiya Zh. Kassanova²,
Elena A. Krasnokutskaya³, Victor D. Filimonov³

¹Department of Biomedicine, Altai State University, Barnaul, Russia, alex_root@mail.ru

²S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar, Kazakhstan

³The Kizhner Research Center, National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia, 634050 Tomsk, Russia

Abstract

Впервые для diaзониевых солей методом ESI-MS исследовано влияние природы противоионов на процессы фрагментации арендiazониевых солей $ArN_2^+ X^-$ с $X = BF_4^-, p-TsO^-, TfO^-$. Показано, что ESI-MS эксперименты фиксируют не только diaзониевые катионы ArN_2^+ , но и устойчивые кластерные ионы, состоящих из $n+1$ diaзониевого катиона и n (от 1 до 9) противоионов. Установлено, что в кластерах изученных diaзониевых солей прочность связей $Ar-N_2^+$ оказывается выше, чем в изолированных diaзоний-катионах. В спектрах ESI-MS трифлатов присутствуют положительные ионы, соответствующие продуктам азо-сочетания и арилирования diaзониевых солей и полимеризации с участием соответствующих производных бензина. Проведено моделирование зафиксированных превращений diaзониевых солей методами DFT.

1. Introduction

Ароматические diaзониевые соли (DS) являются важнейшими и широко применяемыми реагентами в органическом синтезе и промышленности [1]. DS используются для получения сложных продуктов органического синтеза, инициации полимеризации, модификации поверхностей и наноматериалов [2]. Однако, многим DS присущи такие недостатки, как взрывоопасность и малая устойчивость при фото облучении, нагреве и механическом воздействии в сухом твердом состоянии [7,8]. Эти недостатки сдерживают масштабы и ограничивают сферы применения DS. Многие из этих веществ опасны при хранении и транспортировке. Стабильность DS связана с как электронным строением и свойствами самого diaзониевого катиона, так и природой противоиона и характером их взаимодействия. В настоящее время вопрос стабильности мало исследован и требует дальнейшего более глубокого изучения теоретическими и экспериментальными методами.





Ранее нами получены арендiazоний тозилаты и арендiazоний трифлаты [3, 1s] и показано, что они стабильны при хранении в сухом состоянии, обладают малой энергией термического разложения, хорошо растворимы, как в воде, так и органических растворителях

[3]. В то же время, они недороги, легко получаются из доступного сырья, обладают высокой «дiazониевой» активностью и с успехом используются для галоид-дediaзонирования [3,4a-e] и введение в арены изотопа ^{18}F [4f], для получения ароматических азидов [4g], проведения azo-coupling с этил α -метилацетоацетатом [5a], замещении diaзониевой группы на триэтоксисилильную [5b], Cu- и Pd-catalyzed арилирования 5c,d]. Кроме того, арендiazоний тозилаты оказались удобными агентами ковалентной прививки ароматических групп к поверхностям карбонизированных наночастиц металлов [5e] и графену [5f]. Однако, причины повышения стабильности арендiazоний тозилатов и трифлатов в сравнении с традиционными арендiazоний тетрафторборатами остаются неясными.

Масс-спектрометрия - один из высокоточных экспериментальных методов, позволяющих изучать ионы в газовой фазе или вакууме, оценить их стабильность, пути распада и взаимодействие с другими частицами. Классический метод ГХ-МС мало применим для diaзониевых солей вследствие ионного характера этих соединений и малой стабильности при ионизации электронным ударом. Наиболее подходящим методом для изучения этих объектов является метод ВЭЖХ-МС при ионизации электроспреем, который широко используется для изучения механизмов органических реакций в газовой фазе [2n, 3n, 5n, 9n].

Однако в настоящее время опубликованы лишь две работы по изучению арендiazоний тетрафторборатов и хлоридов методом ESI/MS [22n, 15n]. В этих исследованиях авторы не ставили задачи описать влияние противоиона. По данным авторов [22n] первой стадией и основным путем фрагментации diaзониевых катионов и diaзотатов является отщепление молекулярного азота. В работе представлены спектры фрагментации при различных напряжениях на скиммере.

В работе [15n] изучено поведение тетрафторборатных пар замещенных производных фенилдиязония в экспериментах с использованием ионизации электроспреем. Авторами проведен анализ взаимодействий и превращений, происходящих между молекулами нуклеофилов и фенильными катионами в газовой фазе. В статье рассматривается явление образования кластерных частиц содержащих несколько катионов и тетрафторборат анионов. Показано также, что характеристики МС 2-нитробензолдиязоний тетрафторбората отличаются от других изученных ДС. Авторы предложили основные схемы 1-4 процессов происходящих с участием diaзониевых катионов:



Схемы 1-4. Основные процессы сопровождающие распад диазониевых катионов.

Целью нашей работы было изучение свойств перспективных арендиазоний тозилатов и трифлатов в сравнении с тетрафторборатами в экспериментах на масс-спектрометре с ионизацией электроспреем. Изучение фрагментации диазониевых катионов при различных энергиях позволяет оценить и сравнить их прочность в эксперименте. Закономерности фрагментации кластерных частиц несут важную информацию о влиянии противоионов на прочность диазониевых частиц.


Другой важной задачей было DFT моделирование процессов происходящих в условиях ионизации электроспреем и количественный расчет прочности диазониевых катионов. Отдельный интерес представляло квантово-химическое описание особенностей аномальной фрагментации 2-нитрофенилдиазония.

DFT исследование кластерных частиц необходимо для объяснения особенностей их фрагментации, позволит описать строение, прочность кластеров и природу связи в кластерных ионах. Строение кластерных частиц является моделью состояния DS в конденсированной фазе.

Для исследований мы синтезировали ряд ДС **1a-i**, **2**, **3** с вариацией заместителей различной природы (метокси, нитро, бром, карбокси) и их положения в кольце. Бром-производные ДС **1h** и **1i** удобны тем, что имеют специфический изотопный профиль, облегчающий идентификацию продуктов фрагментации.

Таблица 1.

Структурные формулы изучаемых диазониевых солей (DS)



2. Experimental section

2.1. Получение диазониевых солей

Arenediazonium triflates **1a-i** and 4-nitrobenzenediazonium tosylate **2** были получены известными методами [3a,b]. 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate **3** представлял собой коммерческий образец (Aldrich CAS № 456-27-9). Характеристики полученных солей приведены в приложении 1.

2.2. Масс спектрометрия растворов солей

Спектры были получены на время-пролетном масс-спектрометре высокого разрешения Agilent LC-1260 MS QTOF 6530 с использованием двух источников ионизации электроспреем (ESI). Для элюирования использовали изократический режим ацетонитрил:вода 50:50. Колонка Zorbax Eclipse Plus C18 2.1x50mm 1.8 micron. Поток 0.25 мл/мин. Потенциал на фрагменторе 150 В. Напряжение на капилляре 3500 В. Энергия столкновений MSMS - 0, 0.01, 0.1, 1, 10, 20, 40 эВ. Для исследования готовили 1 мг/мл растворы диазониевых солей в смеси вода:ацетонитрил 50:50. Инжекция 5 мкл.

Для обработки и интегрирования масс-спектров использован программный комплекс OpenMS 2.0 [5f, 6f]. Отдельно производилось интегрирование спектров первого и второго

уровня по каждому прекурсору. Для анализа спектров использовалась база данных фрагментов масс-спектров METLIN [2f, 3f].

2.3. Квантовохимические расчеты

Расчеты термодинамики распада диазониевых катионов с отщеплением азота выполнялись методом DFT Unrestricted и Restricted B3LYP в базисе aug-cc-pVDZ с помощью программного комплекса Gaussian 09 [1f]. Для всех систем рассчитан теоретический ИК-спектр, отсутствие отрицательных частот доказывает стационарный характер оптимизированных структур. Для моделирования диазониевых катионов и химических реакций с их участием эффективно использовано DFT методов [26n-29n, 33n]. Следуя рекомендациям авторов [29n], учитывалась возможность существования арильных катионов как в синглетном, так и в триплетном состоянии.

Для 2-нитробензол диазоний катиона выполнено сканирование энергии в процессе возрастания длины связи C-N между арильным кольцом и диазониевой группой в процессе отщепления молекулы азота. Расчет произведен с использованием квантовохимического программного комплекса ORCA-3.0.2. [6f] методом R-B3LYP в базисе aug-cc-pVDZ.

Оптимизация геометрии и расчет термодинамики структур кластерных катионов произведен методом R-B3LYP с использованием базиса 6-31G(d,p). Определена термодинамика в газовой фазе для процессов взаимодействия катион - анион и для процессов присоединения катиона к нейтральной ионной паре DS.

Для обработки данных и построения графических зависимостей было использовано открытое программное обеспечение - gnuplot 5.0 [7f].

3. Results and discussion

3.1. Масс спектры растворов солей диазония

Полученные масс-спектры растворов диазониевых солей (рисунок 1-11) показали, что для всех исследуемых соединений характерное наличие кластерных ионов содержащих $n+1$ диазониевый катион и n - анионов. Во всех спектрах наблюдается набор линий с шагом, равным молекулярной массе соответствующей соли. Интенсивность каждой из линий от числа n носит индивидуальный характер и зависит от природы катиона и аниона, что позволяет определить некие «магические числа» n соответствующие наиболее интенсивным линиям, приведенные в таблице 2. Похожая, но не идентичная картина наблюдалась по данным [15f] в МС для тетрафторбората (3), определенные авторами магические числа для этой соли также $n=1, 4$.

Таблица 2.

Интенсивность кластерных ионов и наблюдаемые «магические числа» для изученных солей диазония.

Compound	n	Intensity, abs.	Intensity, %
1a $C_6H_5N_2^+ TfO^-$	1*	16677	9.4
	2	2383	1.3

Compound	n	Intensity, abs.	Intensity, %
	3*	6634	3.7
	4	4252	2.4
	5	5736	3.2
	6*	17022	9.6
	7	705	0.4
1b 2-NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻	1*	318437	39.1
	2	35066	4.3
	3*	82974	10.2
	4*	94245	11.6
	5	16912	2.1
	6	9680	1.2
1c 3-NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻	1*	242321	98.1
	2	110927	44.9
	3*	198494	80.3
	4	136849	55.4
	5	41087	16.6
	6	3478	1.4
1d 4-NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻	1*	340795	19.1
	2	95220	5.3
	3*	206412	11.6
	4	141580	7.9
1e 4-MeOC ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻	1*	116628	100
	2	22493	19.3
	3*	94173	80.7
	4	54904	47.1
	5	36505	31.3
	6	4199	3.6
1f 2-HCO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻ отщепление HOTf	1	1325	1.3
	2	426	2.0
	3	-	-
	4	332	1.6
	5*	4005	18.7
	6*	5243	24.5
	7	1193	5.6
	8*	3404	15.9
1g	1*	5644	11.7

Compound	n	Intensity, abs.	Intensity, %
4-HCO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻ полимеризация малая интенсивность кластерных линий	2	-	-
	3	128	0.3
1h 4-BrC ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻ отщепление HOTf	1*	12809	19.8
	2	335	0.5
1i 4-Br-2-HCO ₂ C ₆ H ₃ N ₂ ⁺ TfO ⁻ отщепление HOTf	1	2018	4.4
	2	2600	5.6
	3	664	1.4
2 4-NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TsO ⁻	1	205817	37.2
	2*	413793	74.4
	3*	553818	100
	4	242131	43.7
	5	99595	18.0
3 4-NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ BF ₄ ⁻	1*	24953	90.4
	2	267	1.0
	3	115	0.4
	4*	25822	93.6
	5	5098	18.5
	6	1935	7.0
	7	1171	4.2

* - наиболее интенсивные линии кластерных ионов

На наш взгляд «магические числа» связаны с координационным числом аниона (количество атомов фтора) - для тетрафторбората BF₄⁻ - наиболее устойчивы n=4. Для тозилатов и трифлатов повышенной интенсивностью обладает n=3 - что соответствует числу атомов кислорода сульфогруппы, n=6 наблюдается только для незамещенной соли диазония. Малая интенсивность кластерных линий для соединений **1g**, **1h**, **1i** связана с протекающими процессами полимеризации и отщепления HOTf от кластерных ионов. Прочность и пространственное строение кластеров более подробно обсуждается в разделе 3.6. На строение кластеров вероятно влияют стерические факторы, особенно для орто замещенных производных. Для замещенных производных существенным является и образование водородных связей при взаимодействии диазониевых катионов с анионом.

Кроме масс диазониевого катиона и кластерных частиц на спектрах присутствуют линии арильных катионов (за исключением трифлата 2-нитрофенилдиазония, вопросы особенных свойств обсуждаются в дополнительном материале 5S), что доказывает

ожидаемый разрыв C-N связей. В процессе ионизации электроспреем происходит частичный распад диазониевых катионов.

Интересным фактом является полное отсутствие масс соответствующих потере азота комплексными частицами. Таким образом, наличие аниона в кластере стабилизирует диазониевые катионы.




Fig. 1. Integrated ESI/MS data of $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+ \text{TfO}^-$ **1a** in the positive mode.

$\text{A} = [\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+]$; $\text{B} = [\text{C}_6\text{H}_5^+]$; Clusters $\text{C}_n = [\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+]_{n+1}[\text{TfO}^-]_n$;

polymeric cation $\text{P1} = [\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2(\text{C}_6\text{H}_4)_n]^+$; $\text{E} = [\text{C}_6\text{H}_4]$;

polymeric cation $\text{P2} = [\text{C}_6\text{H}_5(\text{C}_6\text{H}_4)_n]^+$;




Fig. 2. Integrated ESI/MS data of $2\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{N}_2^+ \text{TfO}^-$ **1b** in the positive mode.

$\text{A} = [2\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{N}_2^+]$; $\text{B} = [2\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4^+]$; Clusters $\text{C}_n = [2\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{N}_2^+]_{n+1}[\text{TfO}^-]_n$.




Fig. 3. Integrated ESI/MS data of 3-NO₂C₆H₄N₂⁺ TfO⁻ **1c** in the positive mode.

A = [3-NO₂C₆H₄N₂⁺]; B = [3-NO₂C₆H₄⁺]; Cluster C_n = [3-NO₂C₆H₄N₂⁺]_{n+1}[TfO⁻]_n.




Fig. 4. Integrated ESI/MS data of 4-NO₂C₆H₄N₂⁺ TfO⁻ **1d** in the positive mode.

A = [4-NO₂C₆H₄N₂⁺]; B = [4-NO₂C₆H₄⁺]; Clusters C_n = [4-NO₂C₆H₄N₂⁺]_{n+1}[TfO⁻]_n.




Fig. 5. Integrated ESI/MS data of 4-MeOC₆H₄N₂⁺ TfO⁻ **1e** in the positive mode.

A = [4-MeOC₆H₄N₂⁺]; B = [4-MeOC₆H₄⁺]; Clusters C_n = [4-MeOC₆H₄N₂⁺]_{n+1}[TfO⁻]_n;

polymeric cation P1 = [MeOC₆H₄N₂(MeOC₆H₃)_n]⁺; E = [MeOC₆H₃].




Fig. 6. Integrated ESI/MS data of 2-HCO₂C₆H₄N₂⁺ TfO⁻ **1f** in the positive mode.

M = [HCO₂C₆H₄N₂⁺ TfO⁻]; A = [2-HCO₂C₆H₄N₂⁺]; B = [2-HCO₂C₆H₄⁺];

Clusters C_n = [2-HCO₂C₆H₄N₂⁺]_{n+1}[TfO⁻]_n; D_n = [2-HCO₂C₆H₃N₂][2-HCO₂C₆H₄N₂⁺]_n[TfO⁻]_{n-1}.




Fig. 7. Integrated ESI/MS data of 4-HCO₂C₆H₄N₂⁺ TfO⁻ **1g** in the positive mode.

A = [4-HCO₂C₆H₄N₂⁺]; B = [4-HCO₂C₆H₄⁺]; clusters C_n = [4-HCO₂C₆H₄N₂⁺]_{n+1}[TfO⁻]_n;

polymeric cation P1 = [HCO₂C₆H₄N₂(HCO₂C₆H₃)_n]⁺; E = [HCO₂C₆H₃];

polymeric cation P2 = [HCO₂C₆H₄(HCO₂C₆H₃)_n]⁺;




Fig. 8. Integrated ESI/MS data of 4-BrC₆H₄N₂⁺ TfO⁻ **1h** in the positive mode.

A = [4-BrC₆H₄N₂⁺]; B = [4-BrC₆H₄⁺]; Clusters C_n = [4-BrC₆H₄N₂⁺]_{n+1}[TfO⁻]_n;

D_n = [4-BrC₆H₃N₂][4-BrC₆H₄N₂⁺]_n[TfO⁻]_{n-1}; E₂ = [4-BrC₆H₃N₂]₂[4-BrC₆H₄N₂⁺];




Fig. 9. Integrated ESI/MS data of 4-Br-2-HCO₂C₆H₃N₂⁺ TfO⁻ **1i** in the positive mode.
 A = [4-Br-2-HCO₂C₆H₄N₂⁺]; B = [4-Br-2-HCO₂C₆H₄⁺]; Clusters C_n = [4-Br-2-HCO₂C₆H₃N₂⁺]_{n+1}[TfO⁻]_n;
 D_n = [4-Br-2-HCO₂C₆H₂N₂][4-Br-2-HCO₂C₆H₃N₂⁺]_n[TfO⁻]_{n-1};
 E₄ = [4-Br-2-HCO₂C₆H₂N₂]₂[4-Br-2-HCO₂C₆H₃N₂⁺]₂[TfO⁻].




Fig. 10. Integrated ESI/MS data of 4-NO₂C₆H₄N₂⁺ TsO⁻ **2** in the positive mode.
 A = [4-NO₂C₆H₄N₂⁺]; B = [4-NO₂C₆H₄⁺]; Clusters C_n = [4-NO₂C₆H₄N₂⁺]_{n+1}[TsO⁻]_n.




Fig. 11. Integrated ESI/MS data of 4-NO₂C₆H₄N₂⁺ BF₄⁻ **3** in the positive mode.

A = [4-NO₂C₆H₄N₂⁺]; B = [4-NO₂C₆H₄⁺]; M = [NO₂C₆H₄N₂⁺ BF₄⁻]; Clusters C_n = [4-NO₂C₆H₄N₂⁺]_{n+1}[BF₄⁻]_n.

На спектрах соединений **1f**, **1h**, **1i** были обнаружены массы синхронно повторяющиеся в соответствии с массами кластерных ионов. Эти линии D_n соответствуют частицам, которые образуются после отщепления трифторметансульфокислоты от кластерного катиона (уменьшение массы на [HOTf] = 150.0). Образование наблюдаемых катионов D_n может быть объяснено схемами 5, 6. При этом, образование катиона (G) с участием производного бензина (F) может проходить альтернативным образом через реакции циклоприсоединения (9) по схеме 6.




Схема 5. Предлагаемые пути образования зафиксированных ESI MS интермедиатов

(X = H, 4-MeO, 2-HCO₂, 4-HCO₂, 4-Br, 2-HCO₂-4-Br)




Схема 6. Альтернативный путь образования интермедиата (G) через реакцию циклоприсоединения (X = H, 4-MeO, 2-HCO₂, 4-HCO₂, 4-Br, 2-HCO₂-4-Br)

Также на спектрах нитро-производных **1b**, **1c**, **1d**, **2**, **3** присутствуют массы, соответствующие катионам отличающиеся от масс кластерных частиц на величину $\Delta M/Z = -127.0$, причем эта потеря массы не зависит от вида противоиона, что свидетельствует о процессах связанных только с катионом. Этот факт подтверждается **аналогичной** потерей массы в случае метокси-замещенной соли диазония **1e**, $\Delta M/Z = -112.1$. Эти величины потери массы отличаются в соответствии с разностью масс нитро и метокси-групп. Также следует отметить, что эта потеря массы характерна для кластеров содержащих три и более катионов, значит для осуществления данного процесса деструкции необходимо участие нескольких катионов. С учетом этих фактов, потеря массы 127.0 вероятно соответствует брутто формуле продуктов отщепления $[C_4H_5NO_2 + N_2]$ для солей **1b**, **1c**, **1d**, **2**, **3** и масса 112.1 соответствует $[CH_3OC_4H_5 + N_2]$ в случае **1e**. Такие продукты распада, с разрушением бензольного кольца, вероятно могут образоваться в результате последующей деструкции соединения (H) образующейся по схеме 6 или катиона (D) в схеме 5. Эти процессы распада и потери массы кластерными частицами требуют дальнейшего изучения.

На ESI/MS спектрах соединений **1a**, **1e**, **1f**, **1g**, **1h** наблюдаются полимерные катионы (таблица 3), с шагом равным массе соответствующего производного бензина и степенью полимеризации до 9. В большинстве случаев первым звеном полимерной цепочки, является диазониевый катион **1a-P1**, **1e-P1**, **1f-P1**, **1g-P1**, **1h-P1**, который участвует в процессах азосочетания и циклоприсоединения по схемам 5, 6 с последующей полимеризацией (11), (12) по схеме 7. Также встречаются полимерные цепочки, где начальным звеном является арильный катион **1a-P2**, **1f-P2**, **1g-P2**, **1h-P2** с его дальнейшей полимеризацией (13), (14) по схеме 7. Спектры карбокси-замещенных солей диазония **1f**, **1g** имеют еще более сложный характер и сопровождаются процессами декарбоксилирования с образованием продуктов **1f-P3**, **1f-P4**, **1g-P3**.




Схема 7. Предлагаемые пути образования зафиксированных ESI MS полимерных катионов (Y = H, 4-MeO, 2-HCO₂, 4-HCO₂, 4-Br; Z = H; 2-HCO₂, 4-HCO₂, 4-Br)

Таблица 3

Полимерные катионы, наблюдаемые в спектрах ESI/MS

Compound		Polymeric cation	n	M/Z
1a	1a-P1	$C_6H_5N_2(C_6H_4)_n^+$	0-7	105; 257; 333; 409; 485; 561; 637
	1a-P2	$C_6H_5(C_6H_4)_n^+$	0-2	77; 153; 229
1e	1e-P1	$CH_3OC_6H_4N_2(CH_3OC_6H_3)_n^+$	0, 2-4, 6-7	135; 347; 453; 559; 771; 877
1f	1f-P1	$HCO_2C_6H_4N_2(HCO_2C_6H_3)_n^+$	0-3	149; 269; 389; 509;
	1f-P2	$HCO_2C_6H_4(HCO_2C_6H_3)_n^+$	0-2	121; 241; 361
	1f-P3	$C_6H_5N_2(HCO_2C_6H_3)_n^+$	0-4, 6	105; 225; 345; 465; 585; 825
	1f-P4	$C_6H_5(HCO_2C_6H_3)_n^+$	1-3	197; 317; 437
1g	1g-P1	$HCO_2C_6H_4N_2(HCO_2C_6H_3)_n^+$	0-3, 4-9	149; 269; 389; 629; 749; 869; 989; 1109; 1229
	1g-P2	$HCO_2C_6H_4(HCO_2C_6H_3)_n^+$	0-5	121; 241; 361; 481; 601; 721
	1g-P3	$C_6H_5(HCO_2C_6H_3)_n^+$	0-1	77; 197
1h	1h-P1	$BrC_6H_4N_2(BrC_6H_3)_n^+$	0-3	183; 337; 491; 645
	1h-P2	$BrC_6H_4(BrC_6H_3)_n^+$	0-2	155; 309; 463
	1h-P3	$C_6H_3(C_6H_3)_n^+$	0-2	76; 230; 384

Представляет интерес строение нейтральной частицы - интермедиата (I), ее можно представить как цвиттерион. После оптимизации геометрии, азот остается связанным, имеет плоское строение цикла, длины связей C-N=1.413, N-N=1.130 и угол C-N-N=172°.




Рис 12. Строение интермедиата (I), рассчитанное методом DFT B3LYP в базисе aug-cc-pVDZ.

Сканирование поверхности потенциальной энергии (PES) методом DFT B3LYP в базисе aug-cc-pVDZ при отщеплении азота (рис. 13, табл. 4) показывает, что существует локальный минимум и барьер 10 кДж/моль при переходе от интермедиата (I) к бензин производному (F), соответственно соединение (I) является мало устойчивым. Не смотря на малую устойчивость, в кластере частица (I) успевает прореагировать по схеме (6) по причине близкого соседства с еще одним диазониевым катионом, присутствующем в кластере.




Рис. 13. Зависимость энергии интермедиата (I) при увеличении дыны связи C-N в процессе отщепления азота с образованием производного бензина (F) по схеме 5, рассчитанная методом DFT B3LYP в базисе aug-cc-pVDZ

Таблица 4.

Результаты сканирование ППЭ отщепления азота от интермедиатов (I) с образованием бензин-производных (F) при увеличении длины связи C-N, (DFT R-B3LYP aug-cc-pVDZ), энергии приведены относительно соответствующих бензин производных.

№	Process	ΔE_0 , kJ/mol / (d(C-N), Å)		E_A , kJ/mol			Наблюдаемые процессы в MS-ESI эксперименте
		Intermediate	TS	Scan ORCA	IRC Gaussian 09	NEB ORCA	
1a	$C_6H_4N_2 = C_6H_4 + N_2$	104.4 (1.401 Å)	114.3 (1.602 Å)	9.9	9.89	9.88	Азосочетание с последующей полимеризацией. Полимеризация бензин производного.
1e	$4-MeO-C_6H_3N_2 = 4-MeO-C_6H_3 + N_2$	80.9 (1.381 Å)	99.4 (1.622 Å)	18.5	18.43	18.51	Азосочетание с последующей полимеризацией.
1d, 2, 3	$4-NO_2C_6H_3N_2 = 4-NO_2C_6H_3 + N_2$	101.1 (1.411 Å)	108.4 (1.602 Å)	7.3	7.27	7.24	-
1c (v1)	$3-NO_2C_6H_3N_2 = 3-NO_2C_6H_3 + N_2$	97.4 (1.411 Å)	105.9 (1.602 Å)	8.5	8.45	8.46	-
1c (v2)	$3-NO_2C_6H_3N_2 = 3-NO_2C_6H_3 + N_2$	89.5 (1.411 Å)	97.1 (1.592 Å)	7.6	7.51	7.49	-

1b	$2\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_2 = 2\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_3 + \text{N}_2$	105.4 (1.411 Å)	114.6 (1.632 Å)	9.5	9.27	9.25	-
1h	$4\text{-BrC}_6\text{H}_3\text{N}_2 = 4\text{-BrC}_6\text{H}_3 + \text{N}_2$	90.0 (1.391 Å)	103.0 (1.622 Å)	13.0	12.97	13.0	Только азосочетание.
1g	$4\text{-HCO}_2\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_2 = 4\text{-HCO}_2\text{C}_6\text{H}_3 + \text{N}_2$	108.8 (1.401 Å)	116.0 (1.592 Å)	7.2	7.22	7.20	Азосочетание с последующей полимеризацией. Полимеризация бензин производного.
1f	$2\text{-HCO}_2\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_2 = 2\text{-HCO}_2\text{C}_6\text{H}_3 + \text{N}_2$	108.7 (1.411 Å)	117.5 (1.612 Å)	8.8	8.85	8.83	Азосочетание с последующей полимеризацией. Полимеризация бензин производного.
1i	$2\text{-HCO}_2\text{-4-BrC}_6\text{H}_2\text{N}_2 = 2\text{-HCO}_2\text{-4-BrC}_6\text{H}_2 + \text{N}_2$	94.6 (1.401 Å)	106.8 (1.632 Å)	12.2	12.18	12.14	Только азосочетание.

Устойчивость интермедиатов коррелирует с результатами эксперимента, там где энергетический барьер выше (метокси **1e**, бром производные **1h**, **1i**), наблюдается в основном процессы азосочетания. При низкой устойчивости интермедиата (**1a**, **1g**, **1f**) наблюдается образование полимерных катионов без начального процесса азосочетания (преобладает бензин производное). Исключение являются нитро-производные, там вероятно идут иные взаимодействия между катионами (неизвестная потеря массы 127 в кластерах) и процесс образования интермедиата (I) затруднен. Во всех случаях интермедиаты хотя и мало устойчивые соединения, но имеют энергетический барьер в процессе отщепления азота. Высота энергетический барьера определяется устойчивостью самого интермедиата (I), в случае метокси- и бром- производных самые низкие значения энергии интермедиата и самый высокий барьер. Переходное состояние отличается в меньшей степени. С этим согласуются и длины связей, самые низкие значения для метокси- и бром- производных.

Эти процессы происходящие в газовой среде и сопровождающиеся образованием сложных органических веществ важны для использования их в препаративных и технологических целях для модификации поверхностей с помощью высоко-реакционных частиц.

3.2. Фрагментация диазониевых катионов

Впервые получены спектры MS2 при фрагментации изолированных диазониевых катионов в ячейке соударений при различных энергиях. Отсутствие некоторых данных связано с низкой интенсивностью исходных ионов прекурсоров. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5.

Спектр MS2 диазониевых ионов $[\text{X-Ar-N}_2]^+$ при различных энергиях столкновений

Соединение	Преку рсор	M/Z, (Intensity %)						
		0 eV	0.1 eV	1 eV	3 eV	10 eV	20 eV	40 eV
$C_6H_5N_2^+ TfO^-$ (1a)	105.05	105.05 (20) - [$C_6H_5N_2^+$] 77.06 (100) - [$C_6H_5^+$]	105.05 (17) 77.06 (100)	105.05 (9) 77.06 (100)		105.05 (0) 77.06 (100)	105.05 (0) 77.06 (100) 51.06 (47)	51.06 (100) 42.07 (38)
$2-NO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$ (1b)	150.03	150.03 (100) - [$NO_2C_6H_4N_2^+$] 94.03 (15) 92.03 (14) - [$C_6H_4O^+$] 51.02 (12)	150.03 (100) 94.03 (17) 92.03 (15) 51.03 (12)	150.03 (100) 94.03 (24) 92.03 (22) 78.03 (12) 51.02 (19)		150.03 (1) 94.03 (60) 92.03 (96) 78.03 (14) 64.03 (24) 53.00 (55) 51.02 (100) 39.02 (34)	150.03 (0) 94.03 (3) 92.03 (20) 64.03 (75) 63.02 (58) 53.00 (100) 51.02 (80) 39.02 (40)	150.03 (0) 64.03 (12) 63.11 (15) 63.02 (100) 53.00 (43) 51.02 (19) 50.02 (17) 39.02 (12)
$3-NO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$ (1c)	150.03	150.03 (41) - [$NO_2C_6H_4N_2^+$] 122.02 (100) - [$NO_2C_6H_4^+$]	150.03 (39) 122.02 (100)	150.03 (18) 122.02 (100)	150.03 (8) 122.02 (100)	150.03 (0) 122.02 (23)	150.03 (0)	150.03 (0) 122.02 (0)
$4-NO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$ (1d) $4-NO_2C_6H_4N_2^+ TsO^-$ (2) $4-NO_2C_6H_4N_2^+ BF_4^-$ (3)	150.03	150.03 (26) - [$NO_2C_6H_4N_2^+$] 122.02 (100) - [$NO_2C_6H_4^+$]	150.03 (24) 122.02 (100)	150.03 (15) 122.02 (100)		150.03 (0) 122.02 (62) 92.03 (74) 75.02 (100) 64.03 (13)	150.03 (0) 122.02 (0) 92.03 (12) 76.03 (11) 75.02 (100) 64.03 (12)	150.03 (0) 122.02 (0) 76.03 (13) 75.02 (100) 74.02 (41) 64.03 (16) 50.02 (20)
$4-MeOC_6H_4N_2^+ TfO^-$ (1e)	135.05	135.06 (42) - [$CH_3OC_6H_4N_2^+$] 107.05 (100) - [$CH_3OC_6H_4^+$]	135.06 (43) 107.05 (100)	135.06 (25) 107.05 (100)	135.06 (11) 107.05 (100)	135.06 (0) 107.05 (34)	135.06 (0) 107.05 (3)	135.06 (0) 107.05 (0)
$2-HCO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$ (1f) Низкая интенсивность (не достоверно)	149.02	149.05 (72) - [$HCO_2C_6H_4N_2^+$] 121.02 (100) - [$HCO_2C_6H_4^+$]	149.05 (72) 121.02 (100)	-	-	-	-	-
$4-HCO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$ (1g)	149.05	149.05 (16) - [$HCO_2C_6H_4N_2^+$] 121.02 (100) - [$HCO_2C_6H_4^+$]	149.05 (16) 121.02 (100)	149.05 (11) 121.02 (100)		149.05 (0) 121.02 (100)	65.07 (100)	65.07 (27) 39.06 (100)
$4-BrC_6H_4N_2^+ TfO^-$ (1h)	183.00	184.99 (58) 183.00 (52) [$BrC_6H_4N_2^+$] 156.99 (88) 155.00 (100) [$BrC_6H_4^+$]	184.99 (40) 183.00 (58) 156.99 (100) 155.00 (89)	184.99 (30) 183.00 (42) 156.99 (100) 155.00 (95)		184.99 (0) 183.00 (0) 156.99 (100) 155.00 (65)	184.99 (0) 183.00 (0) 156.99 (97) 155.00 (100)	76.08 (100) 50.06 (56)

Общей для всех катионов является фрагментация с потерей азота. Существенное изменение интенсивностей происходит при энергиях столкновений более 1 эВ. При повышении энергии до 10 эВ происходит практически полное разрушение диазониевых частиц и превращению их в арильные катионы. Это свидетельствует о том, что энергия отщепления азота составляет величину порядка 1 эВ. Более подробные данные представлены

на рисунке 14 и в таблице 6. Значения энергий диссоциации находятся в интервале 1.16-2.33 эВ. К сожалению высокая начальная диссоциация (при 0 эВ) не позволяет провести аппроксимацию более точно и количественно описать влияние заместителей на энергию диссоциации диазониевых катионов.




Рис. 14. Экспериментальные зависимости степени диссоциации от E collision

$$K_D = \frac{[Ar^+]}{[ArN_2^+]} = \exp\left(B + \frac{E_{collision}}{\Delta G}\right) \quad (1)$$

Таблица 6.

Параметры аппроксимации по уравнению (1) экспериментальных кривых диссоциации для диазониевых катионов в газовой фазе

№	Diazonium salts	ΔG , eV	B
1a	$C_6H_5N_2^+ TfO^-$	1.33	1.56
1b	$2-NO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$	1.71	-0.84
1c	$3-NO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$	1.60	1.83
1d	$4-NO_2C_6H_4N_2^+ TfO^-$	1.36	1.50
1e	$4-CH_3OC_6H_4N_2^+ TfO^-$	2.33	1.77

1g	4-HCO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.16	2.63
1h	4-BrC ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.77	0.80
1i	4-Br-2-HCO ₂ C ₆ H ₃ N ₂ ⁺ TfO ⁻	2.12	-0.07
2	4-NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ TsO ⁻	1.42	1.56
3	4-NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺ BF ₄ ⁻	1.27	1.56

В случае столкновений с энергий 20 и 40 эВ, степень фрагментации становится настолько высокой, что уже практически не наблюдается диазониевых и арильных катионов, а регистрируемые массы сосуществуют фрагментам бензольного кольца. По данным базы данных METLIN массы 76.03 (C₆H₄⁺), 75.02 (C₆H₃⁺), 65.04 (C₅H₅⁺), 64.03 (C₅H₄⁺), 51.02 (C₄H₃⁺), 39.02 (C₃H₃⁺) являются типичными осколками фрагментации при высоких энергиях соударений для соединений содержащих бензольное ядро, этим ДС не отличаются от других ароматических соединений. Фрагмент имеющий M/Z=92.03 соответствует брутто формуле C₆H₄O⁺, по версии авторов [15n], вероятно, является продуктом присоединения молекулы воды элюента к фенильному катиону с последующим отщеплением водорода.

Для теоретического описания процессов фрагментации мы рассчитали методом DFT B3LYP термодинамику процессов отщепления азота от диазониевого катиона в газовой фазе (таблица 2S.2 в приложении 2). Предварительный расчет показал (таблица 2S.1 в приложении 2), что для арендиазониевых катионов в большинстве случаев выгодно синглетное состояние. За исключением 4-метоксифенил катиона (9), синглет-триплетный переход которого сопровождается уменьшением энергии. В случае 4-бромфенил (15) и 2-карбокси-4-бромфенильного (17) катионов энергия Гиббса синглет-триплетного перехода имеет значение менее 25 кДж/моль и эти два состояния могут находиться в равновесии, что необходимо учитывать при анализе термодинамики. По результатам расчетов, во всех случаях, кроме 2-нитрофенилдиазония процесс отщепления азота требует энергетических затрат. Величины энергии Гиббса имеют значения от 82 до 116 кДж/моль, что согласуется с оценочной величиной полученной в эксперименте по фрагментации диазониевых катионов (раздел 3.2).

Прочность диазониевых катионов определяется природой и положением заместителя. Количество продуктов распада для 2-нитрофенилдиазония значительно меньше, чем для 3- и 4-нитрофенилдиазония при одной и той же энергии соударения (Таблица 3.).

Особым случаем является 2-нитрофенилдиазоний, который мы более подробнее исследовали квантовохимическими методами в приложении 5S.

3.3. Фрагментация кластерных катионов

Для оценки влияния противоиона на стабильность диазониевых катионов, мы впервые провели эксперимент по фрагментации кластерных частиц, содержащих два диазониевых катиона и анион (тозилат, трифлат и тетрафторборат). Результаты эксперимента представлены в таблице 7.

Таблица 7.

Спектр MS2 кластерных ионов [M + X-Ar-N₂]⁺ при различных энергиях столкновений

Соединение	Прекурсор	M/Z, (Intensity %)						
		0 eV	0.01 eV	0.1 eV	1 eV	10 eV	20 eV	40 eV
2-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1b)	449.02	449.02 (80) - [(NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ TfO ⁻] 150.03 (100) - [NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺]	449.02 (84) 150.03 (100)	449.02 (82) 150.03 (100)	449.02 (57) 150.03 (100)	449.02 (0) 150.03 (100) 94.03 (7) 92.03 (9)	150.03 (100) 94.03 (44) 92.03 (35) 78.03 (17) 51.03 (34)	150.03 (4) 94.03 (59) 92.03 (85) 74.09 (15) 64.03 (16) 53.00 (44) 51.03 (100) 39.02 (35)
3-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1c)	449.02	449.02 (68) - [(NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ TfO ⁻] 150.03 (100) - [NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺] 122.02 (56) - [NO ₂ C ₆ H ₄ ⁺]	449.02 (64) 150.03 (100) 122.02 (54)	449.02 (68) 150.03 (100) 122.02 (57)	449.02 (45) 150.03 (100) 122.02 (58)	449.02 (0) 150.03 (51) 122.02 (100)	449.02 (0) 150.03 (7) 122.02 (100) 92.03 (7)	150.03 (0) 122.02 (78) 92.03 (80) 75.02 (100) 64.03 (11)
4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1d)	449.02	449.02 (49) - [(NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ TfO ⁻] 150.03 (100) - [NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺] 122.02 (48) - [NO ₂ C ₆ H ₄ ⁺]	-	-	449.02 (29) 150.03 (100) 122.02 (52)	449.02 (0) 150.03 (48) 122.02 (100) 74.10 (16)	150.03 (6) 122.02 (100) 74.10 (18)	150.03 (0) 122.02 (91) 92.03 (89) 75.02 (100) 74.10 (35) 64.03 (12)
4-CH ₃ O-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1e)	419.06	419.06 (65) - [(CH ₃ OC ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ TfO ⁻] 135.05 (100) - [CH ₃ OC ₆ H ₄ N ₂ ⁺] 107.05 (38) - [CH ₃ OC ₆ H ₄ ⁺]	419.06 (64) 135.05 (100) 107.05 (37)	419.06 (61) 135.05 (100) 107.05 (42)	419.06 (37) 417.25 (15) 135.05 (100) 107.05 (34)	419.06 (0) 135.05 (60) 107.05 (100) 77.04 (7)	135.05 (11) 107.05 (100) 77.04 (13)	135.05 (0) 107.05 (62) 92.03 (37) 77.04 (100)
4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TsO ⁻ (2)	471.07	471.07 (33) - [(NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ TsO ⁻] 150.03 (100) - [NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺] 122.03 (46) - [NO ₂ C ₆ H ₄ ⁺]	471.07 (33) 150.03 (100) 122.03 (49)	471.07 (32) 150.03 (100) 122.03 (46)	471.07 (17) 150.03 (100) 122.03 (49)	471.07 (0) 150.03 (66) 122.03 (100)	150.03 (10) 122.03 (100) 92.03 (10)	150.03 (0) 122.03 (100) 92.03 (38) 75.03 (56)
4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ BF ₄ ⁻ (3)	387.07	387.07 (53) - [(NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ BF ₄ ⁻] 150.03 (100) - [NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺] 122.02 (46) - [NO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺]	387.07 (45) 150.03 (100) 122.02 (56)	387.07 (45) 150.03 (100) 122.02 (51)	387.07 (17) 150.03 (100) 122.02 (49)	387.07 (0) 150.03 (26) 122.02 (100)	150.03 (0) 122.02 (100) 92.02 (9)	122.02 (49) 92.03 (72) 75.02 (100) 64.03 (17)
2-HOOC-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1f)	447.02	-	-	-	-	-	-	-

Соединение	Прекурсор	M/Z, (Intensity %)						
		0 eV	0.01 eV	0.1 eV	1 eV	10 eV	20 eV	40 eV
4-Br-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1h)	514.86	518.86 (32) - [(BrC ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ TfO ⁻] 516.86 (23) 514.86 (0) 184.96 (97) 182.96 (100) - [BrC ₆ H ₄ N ₂ ⁺] 156.95 (80) 154.95 (51) - [BrC ₆ H ₄ ⁺]	518.86 (20) 516.86 (14) 514.86 (41) 184.96 (100) 182.96 (91) 156.95 (13) 154.95 (38)	518.86 (20) 516.86 (63) 514.86 (39) 184.96 (100) 182.96 (92) 156.95 (0) 154.95 (10)	518.86 (32) 516.86 (23) 514.86 (16) 184.96 (97) 182.96 (100) 156.95 (40) 154.95 (31)	518.86 (0) 516.86 (0) 514.86 (0) 184.96 (55) 182.96 (89) 156.95 (96) 154.95 (100)	184.96 (0) 182.96 (0) 156.95 (100) 154.95 (70)	156.95 (77) 154.95 (100)
Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1a)	359.04	359.04 (15) - [(C ₆ H ₅ N ₂ ⁺) ₂ TfO ⁻] 105.05 (100) - [C ₆ H ₅ N ₂ ⁺] 77.04 (84) - [C ₆ H ₅ ⁺]	359.04 (16) 105.05 (100) 77.04 (67)	359.04 (13) 105.05 (100) 77.04 (84)	359.04 (14) 105.05 (100) 77.04 (84)	359.04 (0) 105.05 (24) 77.04 (100)	105.05 (2) 77.04 (100)	105.05 (0) 77.04 (100) 51.06 (5)
4-HOOC-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻ (1g)	447.02	447.02 (29) - [(HCO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺) ₂ TfO ⁻] 149.04 (47) - [HCO ₂ C ₆ H ₄ N ₂ ⁺] 121.03 (100) - [HCO ₂ C ₆ H ₄ ⁺]	447.02 (45) 149.04 (100) 121.03 (78)	447.02 (28) 149.04 (96) 121.03 (100)	447.02 (12) 149.04 (91) 121.03 (100)	447.02 (0) 149.04 (12) 121.03 (100)	149.04 (0) 121.03 (100)	149.04 (0) 121.03 (100)

Следует отметить закономерности фрагментации этих частиц. Во первых, полностью отсутствуют промежуточные массы между массой кластерного иона и одиночного диазониевого катиона, то есть при энергетических воздействиях не происходит внутримолекулярных процессов в кластере, а только отщепление катиона.

Во вторых, дальнейшая фрагментация, при более высоких энергиях соударений приводит к появлению масс полностью совпадающих с масс спектрами второго порядка соответствующих диазониевых катионов, и не содержит дополнительных линий, что также свидетельствует об отсутствии внутримолекулярных процессов в кластерной частице. Никаких линий в спектрах соответствующих отщеплению азота от кластерной частицы мы не наблюдали.

В третьих, глубокая фрагментация кластеров, с разрушением диазониевых и фенильных катионов, наблюдается только при высоких энергиях (20, 40 эВ), причем диазониевые катионы существуют вплоть до 20 эВ, а фенильные катионы до 40 эВ, вероятно в присутствии анионов в кластерах происходит стабилизация диазониевых катионов от энергетических воздействий. Если сравнить ряд диазониевых солей для одного вида катионов, можно оценить степень стабилизации от вида аниона (таблица 8). По результатам эксперимента, в присутствии тозилата и трифрата соотношение интенсивностей диазониевого катиона к фенильному выше, чем у тетрафторбората для энергий больше 1 эВ. Стабилизирующий эффект возрастает в следующем ряду противоионов ArN₂⁺ X⁻: BF₄⁻ < TsO⁻ ~ TfO⁻.

Таблица 8.

Соотношение интенсивностей диазониевого катиона ($4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+$ $M/Z=150.03$) к интенсивности арильного катиона ($4\text{-NO}_2\text{-Ph}^+$ $M/Z=122.03$) в спектрах MS2 кластерных диазониевых ионов $[M + X\text{-Ar-N}_2]^+$ при различных энергиях столкновений

Кластерный ион	Прекурсор	Intensity($4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+$) / Intensity($4\text{-NO}_2\text{-Ph}^+$)			
		0 eV	1 eV	10 eV	20 eV
$[4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^-$	449.02	2.08	1.92	0.48	0.06
$[4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TsO}^-$	471.07	2.17	2.04	0.60	0.10
$[4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ BF}_4^-$	387.07	2.17	2.04	0.26	0.00

3.4. Квантовохимический расчет прочности кластерных катионов

Для теоретического описания процесса фрагментации кластерных ионов мы выполнили квантовохимический расчет структуры кластеров и энергетики двух процессов - диссоциации катион-анионной пары и отщепление катиона от кластерной частицы, результаты представлены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9.

Термодинамика диссоциации катион-анионной пары в газовой фазе для диазониевых солей, рассчитанная методом DFT Restricted B3LYP в базисе 6-31G(d,p)

№	Process	ΔE_0 , kJ/mol	ΔG_{298} , kJ/mol	ΔH_{298} , kJ/mol	$\Delta S_{298} \cdot T$, kJ/mol
1a	$\text{Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = \text{Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	365.15	316.70	360.78	44.12
1b	$2\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 2\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	391.77	342.08	386.39	44.35
1c	$3\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 3\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	406.91	355.65	401.25	45.63
1d	$4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	408.03	357.21	402.39	45.21
1e	$4\text{-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 4\text{-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	348.53	302.47	343.29	40.85
1f	$2\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 2\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	367.89	319.97	362.96	43.02
1g	$4\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 4\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	381.41	333.59	376.31	42.74
1h	$4\text{-Br-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 4\text{-Br-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	375.52	329.79	370.80	41.04
1i	$2\text{-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^- = 2\text{-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+ + \text{TfO}^-$	369.74	322.28	364.92	42.67
2	$4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TsO}^- = 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + \text{TsO}^-$	446.67	399.91	440.57	40.69
3	$4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ BF}_4^- = 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + \text{BF}_4^-$	438.56	386.13	432.81	46.71

Таблица 10.

Термодинамика отщепления диазониевых катионов от кластерных частиц в газовой фазе рассчитанная методом DFT Restricted B3LYP в базисе 6-31G(d,p)

№	Process	ΔE_0 , kJ/mol	ΔG_{298} , kJ/mol	ΔH_{298} , kJ/mol	$\Delta S_{298} \cdot T$, kJ/mol
1a-v1	$[\text{Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- = \text{Ph-N}_2^+ + \text{Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	138.67	96.35	132.33	36.00
1a-v2		136.29	94.47	130.01	35.57
1b-v1		130.34	91.37	124.74	33.39

№	Process	ΔE_0 , kJ/mol	ΔG_{298} , kJ/mol	ΔH_{298} , kJ/mol	$\Delta S_{298} \cdot T$, kJ/mol
1b-v2	$[2\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- = 2\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + 2\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	127.06	86.73	121.67	34.96
1c-v1	$[3\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- = 3\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + 3\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	126.86	88.16	121.30	33.16
1c-v2		124.17	83.95	118.60	34.67
1d-v1	$[4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- = 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	125.53	86.86	119.96	33.12
1d-v2		125.97	83.76	120.13	36.39
1e-v1	$[4\text{-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- = 4\text{-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ + 4\text{-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	129.79	85.81	124.36	38.58
1e-v2		126.29	85.43	121.02	35.61
1f-v1	$[2\text{-HOOC-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- =$ $2\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ + 2\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	127.07	86.05	121.06	35.04
1f-v2		115.03	75.08	109.45	34.40
1g-v1	$[4\text{-HOOC-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- =$ $4\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ + 4\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	127.96	83.97	121.92	37.96
1g-v2		124.64	86.54	118.59	32.07
1h-v1	$[4\text{-Br-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- = 4\text{-Br-Ph-N}_2^+ + 4\text{-Br-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	127.78	83.54	121.78	38.27
1h-v2		125.90	82.48	120.05	37.59
1i-v1	$[2\text{-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TfO}^- =$ $2\text{-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+ + 2\text{-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+ \text{ TfO}^-$	125.14	83.23	119.14	35.93
1i-v2		113.96	73.36	108.35	35.01
2-v1	$[4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ TsO}^- = 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ TsO}^-$	134.44	89.60	128.47	38.89
2-v2		132.80	89.23	126.93	37.73
3-v1	$[4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+]_2 \text{ BF}_4^- = 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ + 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ \text{ BF}_4^-$	141.89	93.74	135.82	42.11
3-v2		145.01	97.17	138.71	41.56

(v1 - строение при котором диазониевые группы двух катионов максимально близки в пространстве и взаимодействуют с одним и тем же атомом кислорода сульфогруппы, v2 - диазониевые группы двух катионов взаимодействуют с разными атомами кислорода сульфогруппы противоиона)

Приведенные в приложении 4 значения структурных параметров в таблице 4S.3 показывают, что в кластерных катионах связывание происходит как за счет ионного взаимодействия, так и за счет водородной связи аниона с орто-протоном диазониевого катиона. Сумма ван-дер-ваальсовых радиусов водорода и кислорода 2.500 Å значительно выше, чем дистанция между атомом кислорода сульфогруппы и атомом водорода в орто-положении d(O-H) от 1.979 Å до 2.190 Å, что свидетельствует о наличии водородной связи. Сходные параметры связывания наблюдаются и в кристаллическом состоянии, по рентгеноструктурными данными d(O-H)=2.454 Å, для 4-I-C₆H₄N₂⁺ TfO⁻, для арендиазоний тозилатов дистанция d(O-H)=2.280 Å, 2.350 Å, 2.450 Å для 2-nitrobenzenediazonium, 4-цианобенzenediazonium, 4-iodobenzenediazonium tosylates соответственно [3, 1s]. Образование водородных связей также характерно для хлоридов и тетрафторборатов PhN₂⁺ (Cl⁻, BF₄⁻) d(Cl-H)=1.960 Å, d(F-H)=2.380 Å [1a, 7n, 32n, 36n].

При сравнении структурных параметров приведенных в таблицах 4S.1-3 можно заметить, что в ионной паре по сравнению со свободными диазониевыми катионами, значительно возрастает длина связи N-N что свидетельствует о том что электроны азота в большей степени участвуют во взаимодействии с арильным катионом и противоионами, в результате азот должен удерживаться в этой молекулярной системе значительно прочнее чем в катионе за счет сильного взаимодействия с анионом (вплоть до образования ковалентной структуры в случае тозилата), исключением является тетрафторборат, для него длина связи

не меняется. Однако при этом увеличивается и длина связи C-N (для тетрафторбората также), вероятно в следствии компенсации недостатка электронной плотности через конкурирующий путь - водородную связь с орто-протоном. Для кластерных катионов параметры связей C-N, N-N угла связи C-N-N имеют промежуточное значение в сравнение со свободным диазониевым катионом и ионной парой.

Термодинамические расчеты показали, что энергии диссоциации DS в газовой фазе находятся в диапазоне 300-400 кДж/моль. Вероятно при энергиях столкновений до 10 эВ катион-анионная пара не подвергается распаду.

Энергетика отщепления одного диазониевого катиона от кластерной частицы (табл. 8) значительно ниже и составляет величину от 73 до 97 кДж/моль, что соответствует результатам эксперимента представленного в разделе 3.3. В спектрах MS2 существенное изменение интенсивностей линий кластерных частиц и диазониевых катионов наблюдается при энергиях от 1 эВ. Таким образом, процесс фрагментации происходит на первой стадии с отщеплением диазониевого катиона, а при более высоких энергиях соударений ужк происходит дальнейший распад диазониевых катионов, что объясняет отсутствие промежуточных масс.

4. Conclusions

При исследовании мы выявили следующие закономерности.

Прочность арендиазониевых катионов в составе трифлатных и тозилатных кластеров в эксперименте выше чем в случае тетрафторборатных анионов. Наблюдается меньшее количество продуктов распада 4-нитрофенилдиазония в присутствии сульфонат ионов, что свидетельствует об их более высокой стабилизирующей способности.

Первой стадией фрагментации диазониевых катионов в условиях ESI-MSMS является процесс отщепления молекулярного азота и образование арильных катионов, что согласуется с литературными данными. Диазониевые катионы характеризуются невысокими значениями энергии отщепления азота в диапазоне 82-116 кДж/моль. Особенностью фрагментации 2-нитрофенилдиазония является отсутствие массы соответствующей о-нитрофенильному катиону. Сканирование поверхности потенциальной энергии показало, что происходит перегруппировка и последующий распад с отщеплением NO. На энергетической диаграмме отщепления окиси азота наблюдаются резонансные структуры с раскрытием бензольного кольца.

Образование кластерных ионов обусловлено высокой энергией взаимодействия катион-анион. Природа связей - ионная и водородная. Диазониевая группа, как сильнейший электрон-акцептор, активирует водород в орто-положении бензольного кольца, что способствует его взаимодействию анионом с образованием водородной связи. Вследствие высокой энергии взаимодействия катиона с анионом при фрагментации в первую очередь происходит отщепление катиона от кластера, что объясняет отсутствие в спектре MS2 заряженных частиц с массами промежуточными между массой кластера и диазониевого катиона, в том числе линий соответствующих потере азота кластерной частицей, то есть анионы способствуют более прочному связыванию азота.

Кроме того, в условиях электроспрея при отщеплении трифлатной кислоты от кластерных ионов происходят процессы образования интермедиатов и соединений бензинового ряда, способных вступать в реакции азосочетания и полимеризации, соответствующие продукты мы наблюдали в эксперименте.

Это исследование может быть важным для развития новых препаративных методов синтеза с применением электроспрея [1p-4p]. Наличие динамического равновесия при распаде диазониевых катионов позволяет проводить процессы в вакууме и атмосфере азота, которые являются идеальной диэлектрической средой. В нашей работе мы наблюдали процессы синтеза, реакции азосочетания и полимеризации с образованием углерод-углеродной связи. Использование метода ионизации электроспреем открывает новые технологические возможности для GreenChemistry в целом, модификации поверхностей, проведения уникальных реакций и осуществление синтезов с участием диазониевых частиц в вакууме или газовой фазе.

References

1. (a) Zollinger, H. *Diazo Chemistry I: Aromatic and Heteroaromatic Compounds*; VCH, Weinheim, **1994**. (b) Roglands, A.; Pla-Quintana, A.; Moreno-Manas M. *Chem. Rev.* **2006**, *106*, 4622. (c) Bonin H.; Fouquet, E.; Felpin, F.-X. *Adv. Synth. Catal.* **2011**, *353*, 3063. (d) Mo, F.; Dong, G.; Zhang, Y.; Wang, J. *Org. Biomol. Chem.* **2013**, *11*, 1582. (e) Kölmel, D. K.; Jung, N.; Bräse, S. *Aust. J. Chem.* **2014**, *67*, 328. (f) Deadman, B. J.; Collins, S.G.; Maguire, A. R. *Chem. Eur. J.* **2015**, *21*, 2298.
2. Mahouche-Chergui, S.; Gam-Derouich, S.; Manganey, C.; Chehimi, M. M. *Chem. Soc. Rev.* **2011**, *40*, 4143.
3. Filimonov V. D., Trusova M.E., Postnikov P.S., Krasnokutskaya E.A., Lee Y.M., Hwang H.Y., Kim H., Ki-Whan Chi. Unusually Stable, Versatile, and Pure Arenediazonium Tosylates: their Preparation, Structures, and Synthetic Applicability. *Org. Lett.*, **2008**, *10*, 3961-3964
4. (a) Krasnokutskaya E.A., Semenischeva N.I., Filimonov V.D., Knochel P. *Synthesis*, **2007**, 81 (b) Gorlushko D.A., Filimonov V.D., Krasnokutskaya E.A., Semenischeva N.I., Go B.S., Hwang H.Y., Chi K-W. *Tetrahedron Lett.*, **2008**, *49*, 1080 (c) Moon M.E., Choi Y., Lee Y.M., Vajpayee V., Trusova M.E., Filimonov V.D., Chi K.-W. *Tetrahedron Lett.*, **2010**, *51*, 6769. (d) Lee Y.M., Moon M.E., Vajpayee V., Filimonov V.D., Chi K.-W. *Tetrahedron*, **2010**, *66*, 7418. (e) Trusova M.E., Krasnokutskaya E.A. Postnikov, P.S., Choi Y.; Chi, K-W., Filimonov V.D. *Synthesis*, **2011**, 2154. (f) Riss, P. J.; Kuschel, S.; Aigbirhio, F. I. *Tetrahedron Lett.* 2012, *53*, 1717; (g) Kutonova, K.V.; Trusova, M.E.; Postnikov, P.S.; Filimonov, V.D.; Parello, J. *Synthesis*. **2013**, *45*, 2706.
5. (a) Velikorodov, A. V.; Ionova, V. A.; Temirbulatova, S. I.; Suvorova, M. A. *Rus. J. Org. Chem.* 2013, *49*, 1004. (b) Tang, Z. Y.; Zhang, Y.; Wang, T.; Wang, W. *Synlett.* 2010, 804. (c) Chaturbhuj, G. U.; Akamanchi, K. C. *Tetrahedron Lett.* 2011, *52*, 4950. (d) Vajpayee, V.; Song, Y. H.; Ahn, J. S.; Chi, K.-W. *Bull. Korean Chem. Soc.* 2011, *32*, 2970. (e) Postnikov, P. S.; Trusova, M. E.; Fedushchak, T. A.; Uimin, M. A.; Ermakov, A. E.; Filimonov, V. D. *Nanotechnologies in Russia*, **2010**, *5*, 446. (f) Min, M.; Seo, S.; Lee, J.; Lee, S. M.; Hwang, E.; Lee, H. *Chem. Commun.* **2013**, *49*, 6289
6. (a) S.K. Dhingra, P. Nag, R. Saxena, Synthesis of Fluoro-Aromatics by Balz-Schiemann Reaction –A Greener Approach, *Chem Sci Trans.*, 2015, *4*(4), 1149-1155, (b) K. Al-saadie, I.M. Al-Mousawi, N.Abdul karime, *National Journal of Chemistry*, Volume 25, (2007) 195-205, (c) N. Kamigata, M. Kobayashi, H. Minato, Cationic Arylation. V. Reaction of Substituted Benzenes with p-Nitrophenyl Cation», *Bulletin of the chemical society of Japan*, vol. 45, 2047-2050 (1972), (d) Zhang, Y.; Tu, G.; Cao, W. Inclusion Complexation of Diphenylamine-4-diazonium Chloride and p-Sulfonatocalix[4]arene. *Supramolec. Chem.* 2002, *14*, 473-475.
7. (a) Jinyu Chen, Chao Zhao, Renxiang Wang, Shuguang Cao, Weixiao Cao, Photochemical and thermal decomposition of diphenylamine diazonium salts, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 125 (1999) 73-78, (b) M. Tsuda and S. Oikawa, Photochemical proton generation mechanism from onium salts, *Journal of Photopolymer Science and Technology*. Volume 3, Number 3 (1990) 249 – 258

8. (a) R. Ullrich, Th. Grever, Decomposition of aromatic diazonium compounds, *Thermochemica Acta*, 225 (1993) 201-211, (b) L.L. Brown, J.S. Drury, Nitrogen Isotope Effects in the Decomposition of Diazonium Salts, *The Journal of Chemical Physics*, Vol. 43, Number 5, 1 September 1965, (c) P.D. Storey, Calorimetric Studies of The Thermal Explosion Properties of Aromatic Diazonium Salts, *Institution. Chem. Eng. Symposium Series* 1981, No. 68. P. 1-3. P. 9
- 1s. V. Filimonov, E. Krasnokutskaya, A. Kassanova, V. Fedorova, K. Stankevich, N. Naumov, A. Bondarev, V. Kataeva. Synthesis, structure, and synthetic potential of arenediazonium trifluoromethanesulfonates as stable and safe diazonium salts. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201800887>
- 1n. B.F. Minaev, S.V. Bondarchuk, M.A. Gîrtu, DFT Study of Electronic Properties, Structure and Spectra of Aryl Diazonium Cations, *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM* (2009), doi: 10.1016/j.theochem.2009.02.022
- 2n. Alessandra Bianco Prevot, Debora Fabbri, Edmondo Pramauro, Claudio Baiocchi, Claudio Medana. High-performance liquid chromatography coupled to ultraviolet diode array detection and electrospray ionization mass spectrometry for the analysis of intermediates produced in the initial steps of the photocatalytic degradation of sulfonated azo dyes. / *J. Chromatogr. A* 1202 (2008) 145–154. doi:10.1016/j.chroma.2008.06.038
- 3n. M.A. Meetani, S.M. Hisaindee, F. Abdullah, S.S. Ashraf, M.A. Rauf. Liquid chromatography tandem mass spectrometry analysis of photodegradation of a diazo compound: A mechanistic study. / *Chemosphere* 80 (2010) 422–427. doi:10.1016/j.chemosphere.2010.04.065
- 4n. Sergey V. Bondarchuk, Boris F. Minaev. Density functional study of ortho-substituted phenyl cations in polar medium and in the gas phase. / *Chemical Physics* 389 (2011) 68–74. doi:10.1016/j.chemphys.2011.08.005
- 5n. A. T. Lebedev, A. G. Kazaryan, V. A. Bakulev, Yu. M. Shafran, V. S. Fal'ko, V. G. Lukin, and V. S. Petrosyan. Mass-spectrometric study of the cyclization of diazo compounds. 10. 2-Diazomalonic acid amides. Mass spectra of the negative ions. / *Chemistry of Heterocyclic Compounds* · July 1987
- 6n. Ksenia V. Kutonova, Marina E. Trusova, Pavel S. Postnikov, Victor D. Filimonov, Joseph Parello. A Simple and Effective Synthesis of Aryl Azides via Arenediazonium Tosylates. / *Synthesis* 2013, 45, 2706–2710 DOI: 10.1055/s-0033-1339648
- 7n. R. Paul Brint, Dona1 J. Coveney, Fergus L. Lalor. The Origin of the Remarkable Stability of the 1 H-3,5-Dimethylpyrazole-4-diazonium Cation: an X-Ray Crystallographic and MNDO Theoretical Investigation. / *J. CHEM. SOC. PERKIN TRANS. II* 1985
- 8n. J.R. Fulton, V.K. Aggarwal, J.de Vicente. The Use of Tosylhydrazone Salts as a Safe Alternative for Handling Diazo Compounds and Their Applications in Organic Synthesis. / *Eur. J. Org. Chem.* 2005, 1479–1492 DOI: 10.1002/ejoc.200400700

- 9n. S. Banerjee, S. Mazumdar. Electrospray Ionization Mass Spectrometry: A Technique to Access the Information beyond the Molecular Weight of the Analyte / International Journal of Analytical Chemistry Volume 2012, Article ID 282574, 40 pages doi:10.1155/2012/282574
- 10n. Minoru Tsuda, Setsuko Oikawa. Photochemical proton generation mechanism from onium salts. / Journal of Photopolymer Science and Technology Volume 3, Number 3 (1990) 249 — 258
- 11n. T. J. Kemp, P. Pinot de moira. The photochemistry of aryldiazonium salts: fundamental aspects and applications to reprographic processes. / Rev. Port. Quím., 17, 174 (1975)
- 12n. Shriver, James A.; Flaherty, Daniel P.; and Herr, Cameron C. (2009) "Aryl Ethers from Arenediazonium Tetrafluoroborate Salts: from Neat Reactions to Solvent-mediated Effects," The Journal of the Iowa Academy of Science: JIAS: Vol. 116: No. 1-4 , Article 6. Available at: <http://scholarworks.uni.edu/jias/vol116/iss1/6>
- 13n. Rezaee, Mohammadreza, "Experimental and Ab initio Computational Study of Azobenzene and Several of its Derivatives. " PhD diss., University of Tennessee, 2015. http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/3518
- 14n. Omer Khayyam Rasheed. New Directions in the Chemistry of Azo-compounds. A Thesis submitted to The University Manchester for the degree of Master of Philosophy in the Faculty of Engineering and Physical Sciences. 2011
- 15n. A.K. Vrkic, R.A.J. O'Hair. Gas phase ion chemistry of para substituted benzene diazonium ions, their salt clusters and their related phenyl cations / International Journal of Mass Spectrometry 218 (2002) 131–160
- 16n. Anastasia A. Golosova, Christine M. Papadakis, Rainer Jordan. Chemical functionalization of carbon nanotubes with aryl diazonium salts. / Mater. Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 1362 © 2011 Materials Research Society DOI: 10.1557/opl.2011.1141
- 17n. Matjeka, Edward Ray, "Part I: Mass spectrometry of organic azides and diazocompounds; Part II: Transformations of [alpha]-organosilyldiazoacetates; Part III: Solvolysis of 2-ferrocenylcyclopropylcarbinyl esters" (1974). Retrospective Theses and Dissertations. 5154. <http://lib.dr.iastate.edu/rtd/5154>
- 18n. Bethany I. Taggart, Richard A. J. O'Hair, Uta Wille. Environmental Polymer Degradation: Using the Distonic Radical Ion Approach to Study the Gas-Phase Reactions of Model Polyester Radicals. J. Phys. Chem. A 2017, 121, 5290–5300 DOI: 10.1021/acs.jpca.7b04217
- 19n. Tom Waters, Richard A. J. O'Hair. Organic gas phase ion chemistry. / Annu. Rep. Prog. Chem., Sect. B, 2002, 98, 433–501
- 20n. [btsj.45.2047.pdf]
- 21n. L. L. Brown and J. S. Drury. Nitrogen Isotope Effects in the Decomposition of Diazonium Salts. The Journal of Chemical Physics 43, 1688 (1965); doi: 10.1063/1.1696991

- 22n. Trevor J. Broxton, Ray Colton, John C. Traeger. Electrospray Mass Spectral Studies of Aromatic Diazonium Salts and Diazotates. *Journal of mass spectrometry*, vol. 30, 319-323 (1995).
- 23n. Nicole J. Rijs, Gustavo B. Sanvido, George N. Khairallah, Richard A. J. O'Hair. Gas phase synthesis and reactivity of dimethylaurate. / *Dalton Trans.*, 2010, 39, 8655–8662 | 8655 DOI: 10.1039/c0dt00508h
- 24n. Aurélie Grondein, Daniel Bélanger. Chemical modification of carbon powders with aminophenyl and aryl-aliphatic amine groups by reduction of in situ generated diazonium cations: Applicability of the grafted powder towards CO₂ capture. / *Fuel* 90 (2011) 2684–2693 doi:10.1016/j.fuel.2011.03.019
- 25n. O. A. Gusel'nikova, K. V. Kutonova, M. E. Trusova, P. S. Postnikov, V. D. Filimonov. First examples of arenediazonium 4-dodecylbenzenesulfonates: synthesis and characterization. / *Russian Chemical Bulletin, International Edition*, Vol. 63, No. 1, pp. 289—290, January, 2014
- 26n. B. R. Ussing, D. A. Singleton. Isotope Effects, Dynamics, and the Mechanism of Solvolysis of Aryldiazonium Cations in Water // *J. AM. CHEM. SOC.* 2005, 127, 2888-2899
- 27n. Z. Wu, R. Glaser. Ab Initio Study of the SN1Ar and SN2Ar Reactions of Benzenediazonium Ion with Water. On the Conception of “Unimolecular Dediazonation” in Solvolysis Reactions / *J. AM. CHEM. SOC.* 2004, 126, 10632-10639
- 28n. M. N. Weaver, S. Z. Janicki, P. A. Petillo. Ab Initio Calculation of Inner-Sphere Reorganization Energies of Arenediazonium Ion Couples. / *J. Org. Chem.* 2001, 66, 1138-1145
- 29n. K. K. Laali, G. Rasul, G. K. Surya Prakash, G. A. Olah. DFT Study of Substituted and Benzannelated Aryl Cations: Substituent Dependency of Singlet/Triplet Ratio. / *J. Org. Chem.* 2002, 67, 2913-2918
- 30n. E. A. Krasnokutskaya, A. Zh. Kassanova, M. T. Estaeva, V. D. Filimonov. new synthesis of pyridinyl trifluoromethanesulfonates via one-pot diazotization of aminopyridines in the presence of trifluoromethanesulfonic acid. / *Tetrahedron Letters* 55 (2014) 3771–3773 <http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2014.05.052>
- 32n. Hua Mei, Don VanDerveer, D. D. DesMarteau. Synthesis of diazonium (perfluoroalkyl) benzenesulfonylimide zwitterions. / *Journal of Fluorine Chemistry* 145 (2013) 35–40 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jfluchem.2012.11.007>
- 33n. B. F. Minaev, S. V. Bondarchuk, M. A. Gîrtu. DFT study of electronic properties, structure and spectra of aryl diazonium cations. / *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM* 904 (2009) 14–20 doi:10.1016/j.theochem.2009.02.022
- 34n. A. A. Sabino, A. H. L. Machado, C. R. D. Correia, M. N. Eberlin. Probing the Mechanism of the Heck Reaction with Arene Diazonium Salts by Electrospray Mass and Tandem Mass Spectrometry. / *Angew. Chem. Int. Ed.* 2004, 43, 2514–2518 DOI: 10.1002/anie.200353076

- 35n. G. Schmelzeisen-Redeker, F. W. Rollgen, H. Wirtz, F. Vogtle. Thermospray Mass Spectrometry of Diazonium and Di-, Tri- and Tetra-quaternary Onium Salts. / ORGANIC MASS SPECTROMETRY, VOL. 20, NO. 12, 1985
- 36n. M. Cygler, M. Przybylski, R.M. Eloffson. The crystal structure of benzenediazonium tetrafluoroborate, $C_6H_5N_2^+BF_4^-$ / CAN. J. CHEM. VOL. 60, 1982
- 1p. S. Kwak, J. Yeo, S. Jung, I. Nam. Microdroplet Chemistry: Difference of Organic Reactions between Bulk Solution and Aqueous Microdroplets. / *Academ J Polym Sci* 1(1): AJOP.MS.ID.555551 (2018)
- 2p. C. E. Falcone, Z. Jaman, M. Wleklinski, A. Koswara, D. H. Thompson, R. G. Cooks. Reaction Screening and Optimization of Continuous-Flow Atropine Synthesis by Preparative Electrospray Mass Spectrometry. DOI: 10.1039/C7AN00622E
- 3p. T. Muller, A. Badu-Tawiah, R. G. Cooks. Accelerated Carbon Carbon Bond-Forming Reactions in Preparative Electrospray. / *Angew. Chem. Int. Ed.* 2012, 51, 11832 –11835 DOI: 10.1002/anie.201206632
- 4p. METHODS OF ELECTROSPRAY CHEMICAL SYNTHESIS AND DEVICE FOR USE THEREIN. United States Patent № US 8,926,801 B2 Jan. 6, 2015
- 1f. Gaussian 09, Revision A.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, X. Li, M. Caricato, A. Marenich, J. Bloino, B. G. Janesko, R. Gomperts, B. Mennucci, H. P. Hratchian, J. V. Ortiz, A. F. Izmaylov, J. L. Sonnenberg, D. Williams-Young, F. Ding, F. Lipparini, F. Egidi, J. Goings, B. Peng, A. Petrone, T. Henderson, D. Ranasinghe, V. G. Zakrzewski, J. Gao, N. Rega, G. Zheng, W. Liang, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, K. Throssell, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, J. M. Millam, M. Klene, C. Adamo, R. Cammi, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, O. Farkas, J. B. Foresman, and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2016.
- 2f. Smith CA, I'Maille G, Want EJ, Qin C, Trauger SA, Brandon TR, Custodio DE, Abagyan R, Siuzdak G (December 2005). "METLIN: a metabolite mass spectral database". *Ther Drug Monit.* 27 (6): 747–51. doi:10.1097/01.ftd.0000179845.53213.39. PMID 16404815
- 3f. Wolf S, Schmidt S, Muller-Hannemann M, Neumann S (March 2010). "In silico fragmentation for computer assisted identification of metabolite mass spectra". *BMC Bioinformatics.* 11: 148. doi:10.1186/1471-2105-11-148. PMC 2853470 Freely accessible. PMID 20307295
- 4f. Sturm et al., *BMC Bioinformatics* (2008), 9, 163
Kohlbacher et al., *Bioinformatics* (2007), 23:e191-e197
- 5f.
- 6f. Neese, F. (2012) The ORCA program system, *Wiley Interdiscip. Rev.: Comput. Mol. Sci.*, 2, 73–78.

- 7f. Williams, T. and Kelley, C. (2011). Gnuplot 4.5: an interactive plotting program. URL <http://gnuplot.info>. (Last accessed: 2011 June 7)

Приложение 1. Характеристики полученных солей

General synthesis of arenediazonium triflates (1a-i)

В 6 мл ледяной уксусной кислоты растворяли 0.5 мл (1.2 mmol) трифторметансульфо кислоты и 1.0 mmol aniline. К раствору при перемешивании по каплям прибавляли 1 mmol butyl nitrite при температуре 0-5 °C. Затем, при охлаждении по каплям прибавляли 0,6 мл бутилнитрита. Реакционную массу перемешивали при 10-15 °C в течение 10-20 мин до исчезновения пятна анилина на ТСХ (элюент гексан-EtOAc 3:2). К реакционному раствору прибавляли 100-150 мл эфира, отфильтровывали осадок соли **1**, промывали эфиром и высушивали в вакууме при комнатной температуре 48 часов.

Benzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1a): Light beige solid; yield 246 mg (97%); m.p. 88-89 (lit. m.p. 81 °C [9c]). ¹H NMR (300 MHz, DMSO-d₆): δ = 8.66 (d, J = 8.1 Hz, 2H, CH Ar), 8.25-8.20 (m, 1H, CH Ar), 7.98-7.93 (m, 2H, CH Ar), ppm. ¹³C NMR (75 MHz, DMSO-d₆): δ = 141.2 (CH Ar), 132.9 (CH Ar), 131.5 (CH Ar), 120.9 (q, J = 319.6 Hz, CF₃), 116.1 (C Ar -N²⁺) ppm. IR (KBr): 2297 cm⁻¹ (lit. 2260 cm⁻¹ [9c]).

2-Nitrobenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1b). White solid; yield 281 mg (94%), m.p. 110 °C. ¹H NMR (300 MHz, DMSO-d₆): δ = 9.12 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CH Ar), 8.79 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CH Ar), 8.56-8.51 (m, 1H, CH Ar), 8.39-8.44 (m, 1H, CH Ar) ppm. ¹³C NMR (75 MHz, DMSO-d₆): δ = 144.5 (C Ar -NO₂), 136.6 (CH Ar), 128.1 (CH Ar), 122.8 (CH Ar), 120.6 (q, J = 320.0 Hz, CF₃), 118.5 (CH Ar), 111.1 (C Ar -N²⁺) ppm. IR (KBr): 2359 cm⁻¹. CHNS-analysis: calc. for C₇H₄F₃N₃O₅S: C, 28.10; H, 1.35; N, 14.04; S, 10.72; F, 19.05. Found C, 28.09; H, 1.32; N, 13.89; S, 10.85; F, 19.40.

3-Nitrobenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1c). White solid; yield 293 mg (98%), m.p. 108-109 °C. ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 9.60 (s, 1H, CH Ar), 9.03-8.99 (m, 2H, CH Ar), 8.27-8.23 (m, 1H, CH Ar) ppm. ¹³C NMR (100.5 MHz, DMSO-d₆): δ = 148.1 (C Ar -NO₂), 138.3 (CH Ar), 135.5 (CH Ar), 132.2 (CH Ar), 128.5 (CH Ar), 121.1 (q, J = 245.0 Hz, CF₃), 118.7 (C Ar -N²⁺) ppm. IR (KBr): 2294 cm⁻¹. CHNS-analysis: calc. For C₇H₄F₃N₃O₅S: C, 28.10; H, 1.35; N, 14.04; S, 10.72. Found C, 28.29; H, 1.57; N, 14.16; S, 10.58.

4-Nitrobenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1d). White solid; yield 284 mg (95%), m.p. 104 °C (lit. m.p. 99 °C [9c]). ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ = 8.93 (d, J = 9.2 Hz, 2H, CH Ar), 8.71 (d, J = 9.7 Hz, 2H, CH Ar) ppm. ¹³C NMR (75 MHz, DMSO-d₆): δ = 153.2 (C Ar -NO₂), 136.2 (CH Ar), 134.5 (CH Ar), 126.0 (CH Ar), 120.0 (q, J = 320.0 Hz, CF₃), 121.8 (C Ar -N²⁺) ppm. IR (KBr): 2303 cm⁻¹.

4-Methoxybenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1e). Light beige solid; yield 241 mg (85%); m.p. 94-97 °C (lit. 55 °C [9c]). ¹H NMR (300 MHz, DMSO-d₆): δ = 8.55 (d, J = 9.0 Hz, 2H, CH Ar), 7.47 (d, J = 9.0 Hz, 2H, CH Ar), 4.04 (s, 3H, OCH₃) ppm. ¹³C NMR (75 MHz, DMSO-d₆): δ = 168.9 (C Ar -OCH₃), 136.2 (CH Ar), 120.7 (q, J = 320.0 Hz, CF₃), 118.6 (CH Ar), 103.3 (C Ar -N²⁺), (OCH₃) ppm. IR (KBr): 2249 cm⁻¹.

2-Carboxybenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1f). ???,

4-Carboxybenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1g). White solid; yield 295 mg (99%), m.p. 118 °C. ¹H NMR (300 MHz, DMSO-d₆): δ = 8.77 (d, J = 8.4 Hz, 2H, CH Ar), 8.41 (d, J = 8.4 Hz, 2H, CH Ar) ppm. ¹³C NMR (75 MHz, DMSO-d₆): δ = 164.9 (CO 2 H), 140.8 (C Ar -CO 2 H), 133.2 (CH Ar), 131.4 (CH Ar), 120.7 (q, J = 245.0 Hz, CF₃), 119.7 (C Ar -N²⁺) ppm. IR (ATR): 2297 cm⁻¹ . CHNS-analysis: calc. for C₈ H₅ F₃ N₂ O₅ S: C, 32.22; H, 1.69; N, 9.39; S, 10.75. Found C, 32.26; H, 1.77; N, 9.42; S, 10.81.

4-Bromobenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1h). ???,

4-Carboxy-4-bromobenzenediazonium trifluoromethanesulfonate (1i). ???,

4-Nitrobenzenediazonium tosylate (2)

В 5 мл ледяной уксусной кислоты растворяли 0.928 г (5.4 mmol) *p*-TsOH и 0.553 г (4.0 mmol) *p*-nitroaniline. К раствору при перемешивании по каплям прибавляли 0.6 мл (4.8 mmol) butyl nitrite при температуре 0-5 °C. Реакционную массу перемешивали при 10-15 °C в течение 20 мин до исчезновения пятна анилина на ТСХ (элюент гексан-EtOAc 3:2). К реакционному раствору прибавляли 200 мл эфира, отфильтровывали осадок соли **2**, промывали эфиром и высушивали в вакууме при комнатной температуре 48 часов. Yield, 1.4 g (90%), mp 132 °C (lit.³ 132 °C).

¹H ЯМР (300 МГц, DMSO-d₆), δ, ppm: 2.28 (s, 3H), 7.09 (d, 2H, J=7.8 Гц), 7.45 (d, 2H, J=7.8 Гц), 8.68 (d, 2H, J=9.3 Гц), 8.92 (d, 2H, J=9.0 Гц). ¹³C ЯМР (75 МГц, ДМСО), δ, ppm: 20.84, 121.96, 125.57, 126.05, 128.18, 134.59, 137.85, 145.55, 153.22.

4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate (3) получен по методу [9].

Приложение 2. Результаты квантовохимических расчетов структур дiazониевых катионов в (S)-синглетном и (T)-триплетном состоянии

Таблица S2.1.

Термодинамика синглет-триплетного перехода

№	Process	ΔE_0 , kJ/mol	ΔG_{298} , kJ/mol	ΔH_{298} , kJ/mol	$\Delta S_{298} \cdot T$, kJ/mol
1	$\text{Ph}^+ (\text{S}) = \text{Ph}^+ (\text{T})$	79.70	79.37	81.87	2.50
2	$\text{Ph-N}_2^+ (\text{S}) = \text{Ph-N}_2^+ (\text{T})$	247.32	228.51	239.48	10.99
3	$2\text{-NO}_2\text{-Ph}^+ (\text{S}) = 2\text{-NO}_2\text{-Ph}^+ (\text{T})$	298.07	291.80	293.87	2.07
4	$2\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 2\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	213.54	201.43	206.50	5.08
5	$3\text{-NO}_2\text{-Ph}^+ (\text{S}) = 3\text{-NO}_2\text{-Ph}^+ (\text{T})$	80.80	77.97	81.91	3.95
6	$3\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 3\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	223.43	210.04	215.59	5.56
7	$4\text{-NO}_2\text{-Ph}^+ (\text{S}) = 4\text{-NO}_2\text{-Ph}^+ (\text{T})$	68.20	63.99	69.77	5.79
8	$4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 4\text{-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	186.81	178.10	180.60	2.50
9	$4\text{-CH}_3\text{O-Ph}^+ (\text{S}) = 4\text{-CH}_3\text{O-Ph}^+ (\text{T})$	-15.95	-11.23	-10.67	0.56
10	$4\text{-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 4\text{-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	189.93	176.94	183.83	6.90
11	$2\text{-HOOC-Ph}^+ (\text{S}) = 2\text{-HOOC-Ph}^+ (\text{T})$	72.96	71.15	73.62	2.46
12	$2\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 2\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	269.44	247.33	258.09	10.77
13	$4\text{-HOOC-Ph}^+ (\text{S}) = 4\text{-HOOC-Ph}^+ (\text{T})$	71.03	70.10	73.21	3.12
14	$4\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 4\text{-HOOC-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	249.23	232.14	239.22	7.08
15	$4\text{-Br-Ph}^+ (\text{S}) = 4\text{-Br-Ph}^+ (\text{T})$	20.03	24.35	25.25	0.90
16	$4\text{-Br-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 4\text{-Br-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	210.81	198.47	205.03	6.57
17	$2\text{-HOOC-4-Br-Ph}^+ (\text{S}) = 2\text{-HOOC-4-Br-Ph}^+ (\text{T})$	18.21	21.17	22.49	1.32
18	$2\text{-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+ (\text{S}) = 2\text{-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+ (\text{T})$	234.39	219.18	227.30	8.13

Таблица S2.2.

Термодинамика отщепления азота diazonиевых катионов
рассчитанная методом DFT B3LYP в базисе 6-31G(d,p)

№	Process	ΔE_0 , kJ/mol	ΔG_{298} , kJ/mol	ΔH_{298} , kJ/mol	$\Delta S_{298} \cdot T$, kJ/mol
1	$\text{s-Ph-N}_2^+ = \text{s-Ph}^+ + \text{N}_2$	146.51	82.64	129.36	46.75
2	$\text{s-2-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ = \text{s-2-NO}_2\text{-Ph}^+ + \text{N}_2$	-61.41	-123.84	-73.30	50.57
3	$\text{s-3-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ = \text{s-3-NO}_2\text{-Ph}^+ + \text{N}_2$	154.35	91.30	137.60	46.33
4	$\text{s-4-NO}_2\text{-Ph-N}_2^+ = \text{s-4-NO}_2\text{-Ph}^+ + \text{N}_2$	158.28	95.37	141.38	46.04
5	$\text{s-4-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ = \text{s-4-CH}_3\text{O-Ph}^+ + \text{N}_2$	180.96	115.55	163.35	47.83
	$\text{s-4-CH}_3\text{O-Ph-N}_2^+ = \text{t-4-CH}_3\text{O-Ph}^+ + \text{N}_2$	165.01	104.32	152.68	48.40
6	$\text{s-2-HOOC-Ph-N}_2^+ = \text{s-2-HOOC-Ph}^+ + \text{N}_2$	166.04	100.08	149.45	49.40
7	$\text{s-4-HOOC-Ph-N}_2^+ = \text{t-s-4-HOOC-Ph}^+ + \text{N}_2$	148.67	84.83	131.52	46.72
8	$\text{s-4-Br-Ph-N}_2^+ = \text{s-4-Br-Ph}^+ + \text{N}_2$	165.99	100.91	148.44	47.56
9	$\text{s-2-HOOC-4-Br-Ph-N}_2^+ = \text{s-2-HOOC-4-Br-Ph}^+ + \text{N}_2$	183.66	116.23	166.60	50.40

Приложение 3. Фрагментация кластерных катионов

Приложение 4. Результаты квантовохимических расчетов структур диазониевых катионов и кластерных частиц

Таблица 4S.1.

Структурные параметры диазониевых катионов в газовой фазе, рассчитанные методом DFT Restricted B3LYP в базисе aug-ccpVDZ

N _o	Cation	d(C-N), Å	d(N-N), Å	Angle CNN
1a	Ph-N ₂ ⁺	1.383	1.114	180
1b	2-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺	1.392	1.112	170
1c	3-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺	1.387	1.113	180
1d, 2, 3	4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺	1.389	1.113	180
1e	4-CH ₂ O-Ph-N ₂ ⁺	1.364	1.119	180
1f	2-HOOC-Ph-N ₂ ⁺	1.395	1.112	171
1g	4-HOOC-Ph-N ₂ ⁺	1.384	1.114	180
1h	4-Br-Ph-N ₂ ⁺	1.375	1.116	180
1i	2-HOOC-4-Br-Ph-N ₂ ⁺	1.386	1.113	172

Таблица 4S.2.

Структурные параметры катион-анионной пары в газовой фазе, рассчитанные методом DFT Restricted B3LYP в базисе 6-31G(d,p)

N _o	Formula	d(C-N), Å	d(N-N), Å	d(O-N), Å	d(O-H), Å	Angle CNN
1a	Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.396	1.137	2.081	2.223	153
1b	2-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.338	1.119	2.356	2.258	160
1c	3-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.393	1.120	2.362	2.416 2.358*	170
1d	4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.393	1.120	2.359	2.483 2.362*	169
1e	4-CH ₂ O-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.365	1.114	2.859	2.122 2.447	179
1f	2-HOOC-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.394	1.120	2.286	1.976	163
1g	4-HOOC-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.390	1.123	2.239	2.014	168
1h	4-Br-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.384	1.123	2.267	1.976	172
1i	2-HOOC-4-Br-Ph-N ₂ ⁺ TfO ⁻	1.390	1.121	2.280	1.957	163
2	4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ TsO ⁻	1.414	1.193	1.631	2.108	136
3	4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺ BF ₄ ⁻	1.393	1.113	2.347**	1.911*	175

* - F-H distance; ** - F-O distance









Таблица 4S.3.









Структурные параметры кластерных катионов в газовой фазе,
рассчитанные методом DFT Restricted B3LYP в базисе 6-31G(d,p)







№	Cluster	d(C-N), Å	d(N-N), Å	d(O-N), Å	d(O-H), Å	Angle CNN
1a-v1*	[Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO ⁻	1.383	1.115	2.589	2.053	177
		1.384	1.115	2.623	2.057	175
1a-v2*		1.380	1.112	2.739	2.139	180
		1.385	1.116	2.587	2.038	175
1b-v1	[2-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO	1.389	1.112	2.681	2.067	170
		1.389	1.113	2.567	1.967	171
1b-v2		1.390	1.113	2.612	1.979	171
		1.389	1.112	2.583	2.158	169
1c-v1	[3-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO ⁻	1.389	1.115	2.583	2.037	177
		1.388	1.114	2.563	2.032	175
1c-v2		1.390	1.116	2.558	2.108	173
		1.384	1.111	2.726	2.017	180
1d-v1	[4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO ⁻	1.390	1.114	2.593	2.039	175
		1.390	1.114	2.559	2.028	176
1d-v2		1.384	1.111	2.751	2.020	179
		1.391	1.115	2.560	2.121	173
1e-v1	[4-CH ₂ O-Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO ⁻	1.367	1.119	2.651	2.036	176
		1.366	1.119	2.625	2.040	178
1e-v2		1.367	1.119	2.626	2.026	176
		1.364	1.116	2.697	2.187	180
1f-v1	[2-HOOC-Ph-N ₂ ⁺] ₂ -TfO ⁻	1.392	1.112	2.594	2.067	172
		1.391	1.113	2.710	1.981	173
1f-v2		1.387	1.113	2.631	1.995	178
		1.391	1.111	2.616	2.170	171
1g-v1	[4-HOOC-Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO ⁻	1.386	1.115	2.606	2.059	175
		1.385	1.114	2.591	2.053	177
1g-v2		1.387	1.115	2.532	2.047	176
		1.381	1.112	2.706	2.191	180
1h-v1	[4-Br-Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO ⁻	1.379	1.117	2.620	2.038	175
		1.378	1.116	2.597	2.035	177
1h-v2		1.375	1.114	2.710	2.127	180
		1.379	1.117	2.594	2.022	175
1i-v1	[2-HOOC-4-Br-Ph-N ₂ ⁺] ₂ TfO ⁻	1.386	1.114	2.722	1.977	173
		1.386	1.113	2.629	2.039	173
1i-v2		1.381	1.114	2.635	1.981	178
		1.384	1.112	2.665	2.129	172
2-v1	[4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺] ₂ TsO ⁻	1.394	1.117	2.471	2.008	170
		1.393	1.117	2.463	2.002	170
2-v2		1.389	1.125	2.224	2.193	161
		1.388	1.117	2.393	1.992	176
3-v1	[4-NO ₂ -Ph-N ₂ ⁺] ₂ BF ₄ ⁻	1.387	1.112	2.582	2.096**	178
		1.384	1.112	2.584	2.096**	178
3-v2		1.386	1.112	2.609	2.055**	178
		1.385	1.112	2.630	2.066**	178

* - v1 - несимметричное, v2 - симметричное строение; ** - приведена наименьшая дистанция d(F-H)

Пространственное строение кластерных катионов в газовой фазе, рассчитанные
методом DFT Restricted B3LYP в базисе aug-ccpVDZ

	1a-v1		1a-v2
	1b-v1		1b-v2
	1c-v1		1c-v2
	1d-v1		1d-v2

	1e-v1		1e-v2
	1f-v1		1f-v2
	1g-v1		1g-v2
	1h-v1		1h-v2

	1i-v1		1i-v2
	2-v1		2-v2
	3-v1		3-v2

5S. Расчет профиля потенциальной энергии отщепления азота при фрагментации 2-нитрофенилдиазония

Для более подробного исследования аномального спектра и энергетики распада 2-нитрофенилдиазониевого катиона (А) мы произвели расчет и построили энергетический профиль (рис. 5S.1) при увеличении длины связи C-N (отщеплении азота). При дистанции $d(\text{C-N})=3.750 \text{ \AA}$ происходит переход атома кислорода нитро-группы 2-nitrobenzene-1-ylum (В) к соседнему атому углерода, с существенным понижением энергии (-240 кДж/моль) и образованием 1-nitroso-6-оксосилохекса-2,4-диенилия (С). Происходит внутримолекулярный, практически необратимый окислительно-восстановительный процесс.




Рисунок 5S.1. Профиль потенциальной энергии и схема процесса отщепления азота при фрагментации 2-нитрофенилдиазония **рассчитанный методом DFT Restricted B3LYP в базисе aug-cc-pVDZ.**

В свою очередь образовавшийся катион 2-нитрозофенола способен к дальнейшему распаду, с отщеплением оксида азота (NO). Энергетический профиль такого процесса представлен на рисунке 5S.2. Процесс отщепления оксида азота требует энергетических затрат (240 кДж) и становится существенным при энергиях фрагментации более 1 эВ. Интересным фактом является наличие двух минимумов на энергетической диаграмме, соответствующих открытой структуре (A) 6-охо-1-(охоiminio)hexa-2,4-dien-6-ylum-1-ide с разрушением бензольного кольца $d(\text{C-N}) = 1.191$ Å и циклической структуре (B) $d(\text{C-N}) = 1.311$ Å. Разница энергий составляет 4.4 кДж/моль, энергетический барьер 26 кДж/моль, то есть эти две формы находятся в равновесии. Вероятно, наличие открытой формы (E) облегчает процесс дальнейшей фрагментации и в эксперименте мы не наблюдаем масс соответствующих 2-nitrobenzene-1-ylum катиону (B).

Главной причиной аномального поведения 2-нитробензолдiazоний катиона является крайняя нестабильность образующегося после отщепления азота 2-nitrobenzene-1-ylum за счет соседства сильной электроноакцепторной группы NO₂ с карбокатионным центром.




Рисунок 5S.2. Профиль потенциальной энергии и схема процесса отщепления оксида азота (NO) при фрагментации 2-нитрофенильного катиона **рассчитанный** методом DFT Restricted B3LYP в базисе aug-cc-pVDZ.

Оглавление

Экспериментальное и теоретическое исследование процессов в условиях электроспрея и фрагментации арендиазоний тозилатов, трифлатов и тетрафторборатов методами ESI-MS и DFT.....	1
Abstract.....	1
1. Introduction.....	1
2. Experimental section.....	4
2.1. Получение диазониевых солей.....	4
2.2. Масс спектрометрия растворов солей.....	4
2.3. Квантовохимические расчеты.....	5
3. Results and discussion.....	5
3.1. Масс спектры растворов солей диазония.....	5
3.2. Фрагментация диазониевых катионов.....	17
3.3. Фрагментация кластерных катионов.....	20
3.4. Квантовохимический расчет прочности кластерных катионов.....	23
4. Conclusions.....	25
References.....	27
Приложение 1. Характеристики полученных солей.....	33
Приложение 2. Результаты квантовохимических расчетов структур диазониевых катионов в (S)-синглетном и (T)-триплетном состоянии.....	35
Приложение 3. Фрагментация кластерных катионов.....	36
Приложение 4. Результаты квантовохимических расчетов структур диазониевых катионов и кластерных частиц.....	36
5S. Расчет профиля потенциальной энергии отщепления азота при фрагментации 2-нитрофенилдиазония.....	40