1-2
植物史文獻收集

從亞熱帶闊葉浮島到林蔭大道

圓山一帶的植物史，是一部濃縮了六千年的臺北地景變遷史。從史前漂浮於鹹淡水湖上的亞熱帶闊葉林小島，到日治時期以樟樹與楓香構築的文化軸線，再到戰後因國安考量而密植的綠色隧道，每一棵樹都是一個時代的生態記憶、遷移痕跡、政治判斷，層層覆蓋又未完全消失的地景紋理。

一、潟湖期｜約5500 - 3200 BP

臺北盆地為半鹹水潟湖，圓山為湖中海拔約36公尺砂岩孤丘（國立臺灣博物館，圓山貝塚展示説明）。臺大地質系劉平妹教授 (Liew) 在臺北盆地鑽探花粉分析顯示，全新世暖期植被以青剛櫟屬 (Cyclobalanopsis) 與栲屬 (Castanopsis) 為優勢，屬楠櫧林帶 (Liew et al., 2006, Quaternary International) 。丘陵推測覆蓋樟科 (紅楠、樟樹)、殼斗科、桑科榕屬等亞熱帶常綠闊葉林。孤丘的高度使它免於潮汐淹沒，成為闊葉林的避難所；湖岸鹹淡交界帶則由耐鹽的穗花棋盤腳 Barringtonia racemosa 與風箱樹 Cephalanthus naucleoides 主導，這類物種的存在直接依賴潮汐脈動，潮水帶來鹽分與養分，退潮暴露的泥灘供其紮根。今僅北投五分港溪殘存野生族群。換言之，穗花棋盤腳的消失是整套潟湖水文系統消失的結果。


青剛櫟
Ring-cupped Oak


紅楠（豬腳楠）
Red Machilus


香楠
Zuiho Machilus


風箱樹
Buttonbush


穗花棋盤腳
Powder-puff Tree

二、淡水化轉型期｜約3200 - 2500 BP（圓山文化期）

貝塚貝類組成從鹹水種的牡蠣、九孔螺轉為淡水種烏蚬，記錄潟湖到沖積平原的環境變遷 (劉益昌，2019，《典藏臺灣史（一）》) 。碳十四定年確認圓山文化距今約3200至2500年 (張光直、宋文薰，1964，《國立臺灣大學考古人類學刊》23/24期) 。出土石鋤、石刀等農具暗示旱稻等種子植物栽培，柱洞遺構顯示建材取自周邊森林 (劉益昌、楊鳳屏，1999，《圓山遺址史蹟公園範圍區考古發掘研究計畫》) 。水的淡化改寫了物種組成，鹹水濕地林退場，轉變成淡水沼澤與旱地森林，同時也改寫了人的農業行為：當潟湖不再提供牡蠣，農耕便成為替代方案。