

FACULDADE FAIPE

THAMARA DIAS DA SILVA

TRATAMENTO ORTODÔNTICO PARA PACIENTES COM AGENESIA DE
INCISIVO LATERAL SUPERIOR: revisão de literatura

Belo Horizonte

2025

THAMARA DIAS DA SILVA

TRATAMENTO ORTODÔNTICO PARA PACIENTES COM AGENESIA DE
INCISIVO LATERAL SUPERIOR: revisão de literatura

Monografia apresentada ao
programa de Especialização em
Ortodontia da FAIPE, como parte dos
requisitos a obtenção do título de
Especialista em Ortodontia.

ORIENTADORA: Ma. Sandra Lello

Belo Horizonte

2025

THAMARA DIAS DA SILVA

TRATAMENTO ORTODÔNTICO PARA PACIENTES COM AGENESIA DE
INCISIVO LATERAL SUPERIOR

Monografia apresentada ao
programa de Especialização em
Ortodontia da FAIPE, como parte dos
requisitos a obtenção do título de
Especialista em Ortodontia.

Aprovado em ____ de _____ de _____ 2025.

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: Ma. Sandra Lello

Professor

Professor

Este trabalho é todo dedicado aos meus pais, pois é graças ao esforço deles que hoje posso concluir essa especialização.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por me proporcionar tal formação.

À minha família por todo incentivo e dedicação. Sem vocês eu nada seria.

A todos os professores, por toda paciência e dedicação durante todo o curso e ainda por fornecerem todas as bases necessárias para a realização deste trabalho.

Por fim, expresso ainda a minha gratidão a todos que de maneira direta ou indiretamente contribuíram para a realização dessa pós-graduação.

“Sonhos determinam o que você quer. Ação determina o que você conquista.”
Aldo Novak

RESUMO

A agenesia dentária (AD) é uma condição que afeta o desenvolvimento dentário e se caracteriza pela ausência congênita de dentes. Essa anomalia pode impactar tanto a dentição decídua quanto a permanente, sendo que nesse último caso, os dentes mais comumente afetados são os incisivos laterais. A ausência desses dentes pode gerar consequências estéticas, funcionais e emocionais, incluindo dificuldades mastigatórias e problemas oclusais. Logo, faz-se necessário que tão logo seja feito o diagnóstico dessa condição, seja realizado o tratamento. Nesse contexto, o presente estudo se propôs a conduzir uma revisão de literatura a respeito do tratamento ortodôntico envolvendo pacientes com agenesia de incisivos laterais superiores. Para tal, foram revisados artigos que dissertavam a respeito da temática. A literatura analisada revelou que para o tratamento de agenesia dos incisivos laterais, pode-se recorrer a: fechamento ortodôntico de espaços seguido pela reanatomização dos caninos ou abertura de espaço e reabilitação protética. Considerando, pois que, que ambas as abordagens apresentam benefícios e limitações, é crucial um planejamento criterioso para garantir resultados estéticos e funcionais adequados. A escolha entre as estratégias deve ser individualizada, considerando fatores como a idade do paciente, características dentofaciais, condições oclusais e expectativas pessoais.

Palavras-chave: Hipodontia. Implantodontia. Ortodontia. Resina composta.

ABSTRACT

Dental agenesis (DA) is a condition that affects dental development and is characterized by the congenital absence of teeth. This anomaly can impact both the deciduous and permanent dentition, and in the latter case, the most commonly affected teeth are the lateral incisors. The absence of these teeth can generate aesthetic, functional, and emotional consequences, including chewing difficulties and occlusal problems. Therefore, it is necessary that treatment be performed as soon as the diagnosis of this condition is made. In this context, the present study proposed to conduct a literature review on orthodontic treatment involving patients with agenesis of upper lateral incisors. For this purpose, articles that discussed the subject were reviewed. The literature analyzed revealed that for the treatment of agenesis of lateral incisors, the following can be used: orthodontic space closure followed by canine reanatomization or space opening and prosthetic rehabilitation. Considering that both approaches have benefits and limitations, careful planning is crucial to ensure adequate aesthetic and functional results. The choice between strategies should be individualized, considering factors such as the patient's age, dentofacial characteristics, occlusal conditions and personal expectations.

Keywords: Hypodontics. Implantology. Orthodontics. Composite resin.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Aspecto clínico inicial	12
Figura 2 - Tratamento ortodôntico para abertura de espaço	13
Figura 3 - Instalação dos implantes dentários	13
Figura 4 - Aspecto clínico final	13
Figura 5 -Aspecto inicial	14
Figura 6 -Aspecto final	15
Figura 7 - Aspecto inicial	16
Figura 8 - Tratamento ortodôntico	17
Figura 9 - Aspecto clínico final	17
Figura 10 - Aspecto clínico inicial	18
Figura 11 - Aspecto clínico final	18
Figura 12 - Paciente com agenesia unilateral de incisivo lateral maxilar tratada com abertura de espaço e implante.	20
Figura 13 - Paciente com agenesia bilateral de incisivo lateral maxilar tratado com fechamento de espaço e recontorno dentário	20

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 PROPOSIÇÃO	11
2.1 Objetivo geral	11
2.2 Objetivos específicos.....	11
3 REVISÃO DE LITERATURA	12
3.1 Abertura de espaço para prótese ou implante	12
3.2 Fechamento de espaço e reanatomização do canino	16
3.3 Comparações de abertura de espaço para prótese ou implante versus fechamento de espaço e reanatomização do canino	19
4 DISCUSSÃO	23
5 CONCLUSÕES	25
REFERÊNCIAS.....	26

1 INTRODUÇÃO

A agenesia dentária (AD) é uma condição que afeta o desenvolvimento dentário e se caracteriza pela ausência congênita de dentes. Essa anomalia pode impactar tanto a dentição decídua quanto a permanente e é classificada em hipodontia (ausência de até seis dentes, exceto terceiros molares), oligodontia (mais de seis dentes ausentes) e anodontia (ausência total dos dentes). A etiologia é multifatorial, envolvendo interações entre fatores genéticos e ambientais, podendo causar alterações no tamanho e forma dos dentes remanescentes ou sucessores (ABU-HUSSEIN *et al.*, 2015; TORRES *et al.*, 2015; BARBOSA *et al.*, 2016).

Na dentição permanente, a AD tem prevalência média de 7,4%, com maior incidência em mulheres e em indivíduos faiodermos. Os dentes mais comumente afetados são: incisivos laterais superiores, segundos pré-molares, e incisivos centrais inferiores (AMORIM; SOBRINHO, 2023). A ausência de dentes como caninos e molares é rara (FINKELSTEIN *et al.*, 2018).

Considerando com especial ênfase a agenesia de incisivos laterais, tem-se que a ausência desses dentes pode gerar consequências estéticas, funcionais e emocionais, incluindo dificuldades mastigatórias, problemas oclusais (devido principalmente a migração mesial dos dentes vizinhos) e insatisfação com a aparência, sendo o impacto estético a principal queixa dos pacientes (ALMEIDA *et al.*, 2014; NEGI; AMITA, 2020).

Com efeito, tão logo feito o diagnóstico de agenesia dos incisivos laterais por meio de exames clínicos e radiográficos, é necessário que o paciente seja encaminhado ao tratamento ortodôntico. Este inclui dentre suas alternativas terapêuticas: fechamento ortodôntico de espaços seguido pela reanatomização dentária, ou abertura de espaço e reabilitação protética (LEBBE *et al.*, 2017; HEDMO; LINDSTEN; JOSEFSSON, 2022).

Trata-se, pois de um tratamento complexo e multidisciplinar. Com isso, é fundamental que os ortodontistas aprofundem seus conhecimentos sobre as estratégias terapêuticas aplicáveis, garantindo abordagens personalizadas que atendam às necessidades e expectativas dos pacientes.

2 PROPOSIÇÃO

2.1 Objetivo geral

O presente estudo se propôs a conduzir uma revisão de literatura a respeito do tratamento ortodôntico envolvendo pacientes com agenesia de incisivos laterais superiores.

2.2 Objetivos específicos

- Definir o conceito de agenesia dentária;
- Comparar a estratégia de abertura de espaço e instalação de implante dentário, e o fechamento de espaço associado a reanatomização dos caninos para o tratamento de pacientes com agenesia de incisivos laterais superiores;
- Determinar as vantagens e desvantagens das estratégias terapêuticas que podem ser usadas para o tratamento ortodôntico desse grupo especial de pacientes.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Abertura de espaço para prótese ou implante

Negi e Amita (2020) descreveram em um caso clínico o tratamento de um paciente com ausência bilateral de incisivos laterais superiores. Uma abordagem interdisciplinar envolvendo ortodontista, implantodontista e protesista foi utilizada no tratamento. Uma paciente do sexo feminino, de 26 anos, relatou ao ambulatório a queixa principal de incisivo lateral maxilar congênito ausente e espaçamento na região frontal superior. No exame extraoral, nenhuma anormalidade foi detectada, a paciente tinha lábios competentes, face mesioprosópica com perfil ortognático (Figura 1). O plano de tratamento incluiu abertura no espaço dos incisivos laterais maxilares para instalação do implante e correção da oclusão. Para tal, um aparelho fixo multibraquete pré-ajustado edgewise (prescrição MBT, tamanho do slot 0,022"x.028" com Ni-Ti redondo de 0,016") foi instalado (Figura 2). Após tratamento ortodôntico ativo de 14 meses, a paciente foi encaminhada para a instalação de implantes dentários (Figura 3). Ao final do tratamento, o paciente apresentou molar e canino classe I, sobremordida e sobressaliência normais e boa estética facial com oclusão protegida dos caninos (Figura 4). Conclui-se que quando indicada, a abertura de espaço e a substituição de incisivos laterais ausentes com substituição de dentes implantados podem proporcionar excelentes resultados estéticos e funcionais.

Figura 1 - Aspecto clínico inicial




Fonte: Negi e Amita (2020)

Figura 2 - Tratamento ortodôntico para abertura de espaço



Fonte: Negi e Amita (2020)

Figura 3 - Instalação dos implantes dentários



Fonte: Negi e Amita (2020)

Figura 4 - Aspecto clínico final



Fonte: Negi e Amita (2020)

Plakwicz, Fudalej, Czochrowska (2016) relataram o caso de uma jovem com agenesia bilateral dos incisivos laterais superiores tratada com transplante de terceiro molar superior em desenvolvimento de um lado e implante dentário do lado contralateral, após abertura de espaço ortodôntico. O exame periodontal, incluindo teste bacteriano do transplante, do implante e do incisivo central

controle, foi realizado 9 anos após o tratamento. Uma avaliação radiológica também foi realizada. O dente transplantado não diferiu de um incisivo natural, exceto pela obliteração pulpar, e a contagem total de bactérias foi maior no local do implante. Os tecidos periodontais ao redor do implante apresentaram sinais progressivos de recessão. Os autores concluíram que tanto os transplantes dentários como os implantes dentários para substituição de incisivos superiores perdidos podem ser eficazes a longo prazo.

Turini *et al.* (2021) apresentaram um relato de caso clínico envolvendo o tratamento multidisciplinar de uma paciente com agenesia dentária de múltiplos elementos. Paciente ACFO, 21 anos, gênero feminino”, foi diagnosticada com agenesia dos elementos dentários 12, 22, 32, 31, 41, 42, e caninos conóides (Figura 5), foi submetida a um tratamento ortodôntico com o intuito de manutenção de espaços e reabilitação posterior com implantes osseointegrados. O plano de tratamento consistiu em realizar implantes nos dentes 12, 22, 32, 42, com próteses em cerâmica pura cimentadas, restaurações estéticas minimamente invasivas por meio de laminados cerâmicos para corrigir o formato dos dentes alterados, e cirurgia plástica periodontal para estética do sorriso (Figura 6). Como resultados obtidos, obteve-se a satisfação do paciente, utilização de técnicas com respeito aos limites biológicos e propriedades dos materiais, proporcionando função e estética, além de ressaltar a importância da interação entre as especialidades odontológicas para o correto diagnóstico, planejamento e execução do caso.

Figura 5 -Aspecto inicial



Fonte: Turini et al. (2021)

Figura 6 -Aspecto final



Turini et al. (2021)

Rei *et al.* (2016) avaliaram a confiabilidade clínica e o resultado de implantes dentários com carga precoce para o tratamento de pacientes com agenesia de incisivos laterais que foram submetidos a abertura de espaço. Para o estudo, implantes dentários de pequeno diâmetro (AstraTech OsseoSpeed TX 3.0 S, Dentsply) de diferentes comprimentos foram instalados usando um protocolo cirúrgico de um estágio com um período de cicatrização de 6 a 10 semanas antes do carregamento. Profundidade da bolsa de sondagem, sangramento à sondagem e pontuação do zênite gengival foram avaliados após 6, 12, 24 e 36 meses. O exame radiográfico foi avaliado aos 6, 12 e 36 meses. No total, 38 pacientes foram incluídos nesta análise e 62 implantes de pequeno diâmetro foram colocados. A distância média entre os dentes adjacentes foi de 6,30 mm (DP: 1,36). Dois implantes foram perdidos durante o período de cicatrização antes do carregamento, proporcionando uma taxa de sobrevivência total do implante de 96,8%. Nenhuma fratura do implante foi relatada. A alteração média do nível ósseo marginal da cirurgia para as visitas de acompanhamento aos 6, 12 e 36 meses foi de 0,39 mm, 0,22 mm e 0,23 mm, respectivamente. A condição dos tecidos moles foi estável em todas as visitas de acompanhamento. Considerando que os dados coletados destacaram a estabilidade do nível ósseo marginal e tecidos moles ao redor dos implantes dentários em conjunto com a função mecânica durável os autores concluíram que implantes de pequeno diâmetro podem ser considerados uma solução válida no tratamento restaurador de hipodontia nas regiões de incisivos laterais.

3.2 Fechamento de espaço e reanatomização do canino

Almeida *et al.* (2014) apresentaram um caso clínico de agenesia de incisivos laterais superiores tratados por uma associação de terapia ortodôntica e restauradora. Paciente do sexo feminino, 12 anos, em fase de dentição mista tardia foi encaminhada ao tratamento ortodôntico com queixa principal de espaçamento entre os dentes anteriores superiores. A análise do sorriso mostrou exposição de 100% dos incisivos superiores, diastema generalizado e plano sagital da linha média coincidente com a linha média do sorriso. O exame intraoral revelou relação de Classe II de Angle de molares e caninos, sobressaliência de 1 mm, sobremordida normal, linha média superior e inferior coincidentes em relação ao plano facial e ausência de incisivos laterais superiores (Figura 7). O plano de tratamento proposto foi o fechamento de espaço das áreas correspondentes aos incisivos laterais superiores ausentes, através da movimentação dos caninos e dos dentes posteriores para mesial. Foi instalado aparelho fixo superior e inferior com slot Andrews 0,022 polegadas (3M-UNITEK, Monrovia, Califórnia, EUA), prescrição Andrews (Figura 8). Após a correção ortodôntica, foi realizada a transformação/reanatomização dos caninos (Figura 9). Os resultados foram considerados esteticamente e funcionalmente satisfatórios. Assim, os autores concluíram que o fechamento de espaço associado a reanatomização dentária constitui uma estratégia eficaz de tratamento de pacientes com agenesias dentárias.

Figura 7 - Aspecto inicial



Fonte: Almeida *et al.* (2014)

Figura 8 - Tratamento ortodôntico



Fonte: Almeida *et al.* (2014)

Figura 9 - Aspecto clínico final



Fonte: Almeida *et al.* (2014)

Thiesen (2015) descreveram o tratamento ortodôntico de um paciente com agenesia de incisivo lateral superior esquerdo e má oclusão de Classe II, Divisão 1 de Angle. Paciente do sexo masculino, 26 anos e 5 meses, procurou tratamento ortodôntico com boa saúde geral e tabagismo ocasional. Sua queixa principal era "estética prejudicada na região anterior" (Figura 10). O tratamento envolveu instalação de aparelho fixo completo com objetivo de promover a redução interproximal em ambas as arcadas, alinhamento e nivelamento dos dentes superiores e inferiores e remodelação estética realizada com resina composta. Os resultados mostraram-se extremamente satisfatórios (Figura 11) o que permitiu que os autores concluíssem que a redução interproximal associada a substituição do incisivo lateral por um canino em vez de abrir espaço para reabilitação protética mostra-se vantajosa, pois proporciona resultados estéticos satisfatórios, não induz problemas funcionais na articulação temporomandibular e permite uma melhor manutenção das condições de saúde periodontal, quando em comparação com casos de reabilitação implante-protética.

Figura 10 - Aspecto clínico inicial



Fonte: Thiesen (2015)

Figura 11 - Aspecto clínico final



Fonte: Thiesen (2015)

França *et al.* (2021) explanaram sobre as manobras técnicas ortodônticas para a abordagem da agenesia bilateral de incisivos laterais superiores por meio do fechamento dos espaços. Para autores ao planejar-se o tratamento das más oclusões associadas à agenesia bilateral de incisivos laterais superiores permanentes por meio do fechamento dos espaços o ortodontista deve considerar: 1) Biotipo gengival, características do tecido de suporte periodontal, nível de exigência estética e expectativa do paciente quanto ao tempo de tratamento e 2) A necessidade de diferentes sistemáticas de ancoragem, conforme a discrepância anteroposterior existente. A viabilidade mecânica do fechamento dos espaços deve considerar, também, a experiência do profissional, visto que a condução do tratamento nem sempre é simples, especialmente em pacientes com má oclusão de Classe I inicial, sem ou com pouca sobressalência.

3.3 Comparações de abertura de espaço para prótese ou implante versus fechamento de espaço e reanatomização do canino

Andrade *et al.* (2013) compararam, por meio de uma revisão sistemática, a eficácia e segurança de três modalidades de tratamento ortodôntico para agenesia de incisivos laterais superiores: 1) fechamento do espaço com o canino remodelado substituindo o incisivo lateral, 2) abertura do espaço com instalação de ponte fixa convencional e 3) abertura do espaço com a instalação de um implante unitário e uma coroa implanto-suportada. Para o estudo, as seguintes bases de dados foram investigadas: Cochrane Register of Controlled Trials, EMBASE, MEDLINE, LILACS e Banco de Bibliografia Brasileira de Odontologia). A partir da análise dos documentos recuperados, os autores infeririam que a maioria das evidências a respeito da temática provem de estudos com baixa qualidade metodológica e alto risco de viés. Com efeito, ainda não é possível determinar qual a melhor estratégia ortodôntica e protética nesses casos.

Marchi *et al.* (2014) avaliaram a atratividade do sorriso de pacientes tratados para agenesia de incisivos laterais superiores em comparação com indivíduos com dentição completa. Foram feitas fotografias dos sorrisos de pacientes com agenesia de incisivos laterais superiores que foram tratados com fechamento de espaço e recontorno dos dentes (n=26) (Figura 12) ou abertura de espaço e implantes (n=20) (Figura 13) e de um grupo controle com dentição completa (n=22). Tanto leigos quanto dentistas avaliaram a atratividade do sorriso usando uma escala analógica visual. Pacientes e controles também avaliaram o nível de satisfação com o próprio sorriso. As avaliações foram realizadas duas vezes e a confiabilidade do método foi determinada com Cronbach α e correlação intraclass. As classificações de atratividade por dentistas e leigos não diferiram significativamente entre os grupos de estudo. As classificações de dentistas do sexo masculino e leigos do sexo feminino diferiram significativamente das de outros avaliadores. Pacientes com fechamento de espaço e recontorno dos dentes foram significativamente mais satisfeitos do que os controles. Não foram encontradas diferenças significativas entre os pacientes com implantes e controles ou entre os pacientes com implantes e aqueles com fechamento de espaço e recontorno dos dentes. Os autores concluíram que os

sorrisos dos pacientes com agenesia dos incisivos laterais superiores foram considerados tão atraentes quanto os dos controles e que os pacientes tratados com fechamento de espaços e recontorno dos dentes foram os mais satisfeitos em comparação aos demais.

Figura 12 - Paciente com agenesia unilateral de incisivo lateral maxilar tratada com abertura de espaço e implante.



Fonte: Marchi *et al.* (2014)

Figura 13 - Paciente com agenesia bilateral de incisivo lateral maxilar tratado com fechamento de espaço e recontorno dentário



Fonte: Marchi *et al.* (2014)

Por meio de estudo retrospectivo, Jamilian, Perillo, Marco Rosa (2015) compararam os resultados estéticos, periodontais e funcionais do fechamento do espaço ortodôntico versus a substituição do implante em pacientes com incisivos superiores ausentes cinco anos após a conclusão do tratamento. O grupo de estudo foi composto por dez pacientes tratados com fechamento de espaço ortodôntico e dez pacientes tratados com inserção de implante. Mobilidade dentária, índice de placa, profundidade de sondagem, infraoclusão, ameia gengival aberta (triângulo preto) e função da articulação temporomandibular foram registrados no seguimento de 5,6 anos. A autopercepção da estética dental também foi avaliada. O teste T foi usado para

avaliar os dados. Todos os pacientes ficaram igualmente satisfeitos com a aparência de seus dentes $5,6 \pm 0,4$ anos após a conclusão do tratamento. Além disso, não foram encontradas diferenças significativas na mobilidade dentária, índice de placa ($P < 0,632$) e na prevalência de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular. No entanto, infraoclusão significativa foi observada em todos os pacientes com implante. A profundidade de sondagem também foi significativamente maior em pacientes com implantes. Assim, os autores concluíram que o fechamento ortodôntico do espaço e o implante de incisivos superiores ausentes produziram resultados estéticos semelhantes e bem aceitos.

Kiliaridis *et al.* (2016) examinaram por meio de revisão sistemática o tratamento da agenesia de incisivos laterais superiores, seja por fechamento de espaço ortodôntico por reposicionamento e remodelação mesial de caninos, ou por uma intervenção protética, a fim de comparar os resultados biológicos, funcionais e estéticos de essas duas abordagens. Para tal, uma busca eletrônica no MEDLINE foi realizada por dois revisores independentes. A busca inicial na base de dados produziu 8.453 títulos. Após cuidadosa análise e discussão, 12 artigos foram selecionados para inclusão, onde 5 deles compararam diretamente as duas opções terapêuticas. Não foram identificados ensaios clínicos randomizados. De acordo com esta revisão sistemática, ambas as opções terapêuticas são eficazes. No entanto, parece que o fechamento ortodôntico do espaço, sempre que possível, é vantajoso em relação à reabilitação protética.

Silveira *et al.* (2016) determinaram, com as evidências disponíveis na literatura, o melhor tratamento para agenesia de incisivos laterais superiores na dentição permanente, avaliando os resultados estéticos, oclusais (funcionais) e periodontais entre a substituição protética e o fechamento do espaço ortodôntico. Para tal, bases de dados eletrônicas (CENTRAL, PubMed, Web of Science, Scopus e LILACS) foram pesquisadas. A busca identificou 2.174 artigos, dos quais 21 artigos foram lidos na íntegra e 9 estudos caso-controle foram incluídos após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Os dados foram extraídos dos artigos selecionados e foi elaborada uma tabela para comparação e análise dos resultados. Não houve randomização e cegamento, e a avaliação do risco de viés encontrou lacunas nos domínios de compatibilidade e resultado em quase todos os estudos selecionados. Os autores concluíram que o fechamento

de espaço associado a reanatomização dentária se associa a melhores índices periodontais e resultados estéticos satisfatórios.

Hedmo, Lindsten e Josefsson (2022) investigaram a opinião de leigos e profissionais de odontologia sobre o resultado estético da terapia com implantes e fechamento de espaço ortodôntico para incisivos laterais superiores ausentes. A avaliação foi realizada por três grupos: leigos de 20 a 30 anos ($n = 26$), leigos de 50 a 70 anos ($n = 26$) e ortodontistas ($n = 25$). Os avaliadores visualizaram fotografias de 44 casos diferentes tratados com implantes ou fechamento de espaço e fizeram uma avaliação da estética. A cor gengival adjacente ao dente substituído foi avaliada como de melhor estética nos casos fechamento de espaço ($p = 0,000$). Os ortodontistas preferiram a estética da dentição nos casos fechamento de espaço ($p = 0,042$). Os leigos jovens, comparados aos leigos mais velhos e ortodontistas, mostraram-se mais insatisfeitos com a cor do dente substituindo o incisivo lateral ausente nos casos fechamento de espaço ($p = 0,043$). Os autores concluíram que o fechamento de espaço tende a apresentar resultados estéticos superiores, embora, de maneira genérica ambas as terapias sejam igualmente boas.

Cordeiro *et al.* (2023) conduziram uma revisão integrativa de literatura a respeito do manejo da agenesia dental em pacientes pediátricos. Para tal, seguiu-se as Diretrizes da Declaração PRISMA, utilizado a base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde BVS e PubMed Medline, por meio das palavras-chave indexadas nos descritores em Ciências da Saúde DECS: “dental agenesis”, “pediatric dentistry” e “treatment”. A partir dos 234 artigos achados, 17 estudos no idioma inglês e um artigo no idioma português foram incluídos nessa revisão de literatura. Houve uma alta prevalência de estudos pautados no tratamento de agenesia dentária de pacientes síndrômicos. Além disso, a partir da análise por desfecho de tratamento, constatou-se que o manejo odontológico mais utilizado em odontopediatria para agenesia, é a prótese dentária (22,22%) associada, ou não com as especialidades de ortodontia e cirurgia, para manter ou gerar espaços, e dentística, para melhorar os aspectos dos dentes subjacentes ou até mesmo aumentar a largura dos dentes adjacentes visando o fechamento dos espaços edêntulos.

4 DISCUSSÃO

A partir dos artigos incluídos na presente revisão, observa-se que existem consensos e controvérsias a respeito da finalização do tratamento ortodôntico de pacientes com agenesias de incisivos laterais. A maior parte dos questionamentos referem-se à modalidade terapêutica mais adequada para restabelecer forma, função e estética do sorriso. Autores como Kiliaridis *et al.* (2016), Marchi *et al.* (2014), Jamilian, Perillo, Marco Rosa (2015), Thiesen (2015), Hedmo, Lindsten e Josefsson (2022), Silveira *et al.* (2016) concluíram que o fechamento de espaço e reanatomização estética dos dentes é melhor, pois garante um melhor contorno gengival, mantém a saúde periodontal, oferece um maior sucesso quanto a reabilitação e se associa benéficos como rapidez, praticidade, custo e bons resultados estéticos e funcionais. Afinal, esse recurso terapêutico pode ser indicado para pacientes jovens já que não tem como requisito maturidade óssea, pode ser feito imediatamente ao término da movimentação dentária, é mais barato e não predispõem o indivíduo a problemas periodontais ou temporomandibulares. Por outro lado, Andrade *et al.* (2013) concluíram que a maior parte desses estudos apresentavam um alto risco de viés e baixa qualidade metodológica. Portanto, ainda não é possível determinar qual é a melhor estratégia ortodôntica e protética.

Se não bastasse, algumas consequências desse tipo de abordagem foram questionadas por Jamilian, Perillo, Rosa (2015) e Silveira *et al.* (2016) que apontaram para o maior risco de recidiva, de resultados insatisfatórios (oclusão insatisfatória), e de comprometimento funcional devido a maior sobrecarga oclusal dos pré-molares. Ademais, segundo França *et al.* (2021), Almeida *et al.* (2014), a viabilidade mecânica, capacidade profissional e a presença de pouca ou nenhum overjet também são pontos importantes para serem analisados para esse tipo de intervenção.

Por outro lado, a abertura do espaço protético e posterior reabilitação protética com o uso de implantes, foi considerada por autores como Rei *et al.* (2016), Negi e Amita (2020) como uma alternativa muito eficaz ao longo do tempo. Para eles, esse tipo de tratamento viabiliza escores superiores de atratividade do sorriso, sobretudo, entre especialistas, maior previsibilidade e menor risco de recidiva. Todavia, esse tipo de abordagem tal como demonstrado

por Negi e Amita (2020), Plakwicz, Fudalej, Czochrowska (2016), Turini *et al.* (2021), ressalta a importância da multidisciplinaridade para uma correta conduta, planejamento e execução do tratamento, como foi mostrado nos resultados dos estudos.

Nesse sentido, para Negi e Amita (2020), Plakwicz, Fudalej, Czochrowska (2016), Turini *et al.* (2021) as vantagens da abertura do espaço protético e posterior reabilitação protética com o uso de implantes incluem: estética satisfatória, restabelecimento de uma oclusão adequada e bons resultados funcionais. Além disso, segundo Rei *et al.* (2016), a utilização de implantes de pequeno diâmetro para as reabilitações de pacientes com hipodontia de incisivos laterais, garante uma maior estabilidade do nível ósseo e gengival marginal da prótese.

Considerando as vantagens e desvantagens de cada alternativa terapêutica, autores como Andrade *et al.* (2013) e Cordeiro *et al.* (2023) reafirmaram a importância de cada paciente seja avaliado individualmente considerando aspectos como: idade; morfologia dento-facial; tipo de perfil facial ou expectativa.

5 CONCLUSÕES

A partir da literatura analisada é lícito concluir que:

- A agenesia dentária refere-se à ausência congênita de um ou mais dentes, resultado de falhas no desenvolvimento embrionário, podendo afetar tanto dentes decíduos quanto permanentes. Sendo que na dentição permanente, os dentes mais comumente afetados são: incisivos laterais superiores.
- O fechamento de espaço com reanatomização dos caninos, abordagem frequentemente adotada para tratamento da agenesia dos dentes laterais, apresenta como vantagens: melhor contorno gengival, preservação da saúde periodontal, menor custo e a ausência de dependência da maturidade óssea, sendo especialmente indicada para pacientes jovens. Contudo, pode apresentar desvantagens como maior risco de recidiva, oclusão insatisfatória e sobrecarga funcional dos pré-molares.
- Abertura de espaço e reabilitação protética com implantes dentários para o tratamento de agenesia de incisivos laterais mostra-se como abordagem eficaz a longo prazo, proporcionando melhor estética e menor risco de recidiva. No entanto, envolve maior custo, necessidade de maturidade óssea completa e um planejamento multidisciplinar detalhado.

REFERÊNCIAS

- ABU-HUSSEIN, M. *Et al.* Clinical genetic basis of tooth agenesis. *Journal of dental and medical sciences (iosr-jdms)* v. 14, n. 12 ver. Iii, p. 98-77. 2015
- ALMEIDA, R. R.; MORANDINI, A. C. F.; ALMEIDA-PEDRIN, R. R. *et al.* A multidisciplinary treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors: a 14-year follow-up case report. **J Appl Oral Sci.**, v.22, n.5, p.465-71, 2014.
- AMORIM, A. V.; SOBRINHO, S. I. Avaliação da prevalência de agenesia dentária. Cap.104: Ciências da saúde e suas descobertas científicas. 1397-1407.
- ANDRADE, D. C. M. C; LOUREIRO, V.; ARAÚJO, E *et al.* Treatment for agenesis of maxillary lateral incisors: a systematic review. **Orthod Craniofac Res.**, v. 16, n.3, p. 129-36, 2013.
- BARBOSA, D. F. M. *Et al.* Agenesias múltiplas, planejamento e hereditariedade. *Revista faipe. Cuiabá*, v. 6, n. 2, p. 14-27, jul./dez. 2016.
- CORDEIRO, W. A.; CAVALCANTE, E. L. F.; PEREIRA, A. L. *et al.* Agenesia dental e seu manejo em pacientes pediátricos: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v.5, b.5, p.1731-48, 2023.
- DE-MARCHI, L. M.; PINI, N. I. P.; RAMOS, A. L. *et al.* Smile attractiveness of patients treated for congenitally missing maxillary lateral incisors as rated by dentists, laypersons, and the patients themselves. **J Prosthet Dent.**, v.112, n.3, p.540-6, 2014.
- FINKELSTEIN, T.; SHAPIRA, Y.; PAVLIDI, A. M. *et al.* Agenesis of Permanent Canines in Orthodontic Patients: Prevalence, Location, Treatment Options and Outcomes. **J Dent Child (Chic)**, v. 85, n. 3, p. 133-8, 2018.
- FRANÇA, F.; BOTTON, L. M. S.; JUNQUEIRA-MENDES, C. H. Z. *et al.* Tratamento da agenesia bilateral de incisivos laterais superiores com fechamento dos espaços: uma revisão de literatura. **J Multidiscipl Dent.**, v.11, n.2, p.86-91, 2021.
- HEDMO, C.; LINDSTEN, R.; JOSEFSSON, E. Laypeople and dental professionals' perception of the aesthetic outcome of two treatments for missing lateral incisors. **Clin Exp Dent Res.**, v.8, n.1, p.262-69, 2022.
- JAMILIAN, A.; PERILLO, L.; ROSA, M. Missing upper incisors: a retrospective study of orthodontic space closure versus implant. **Prog Orthod.**, v.1, n.25, 2015.
- KILIARIDIS, S.; SIDIRA, M.; KIRMANIDOU, Y. *et al.* Treatment options for congenitally missing lateral incisors. **Eur J Oral Implantol.**, v.9, n.1, p.5-24, 2016.
- LEBBE, a. Et al dental development in patients with agenesis. **International journal of legal medicine.** v.131, p.537–546, 2017.

NEGI, A.; AMITA, A. Interdisciplinary management of congenitally missing maxillary lateral incisors. **J Oral Biol Craniofac Res.**, v.10, n.2, p. 184-88, 2020.

PLAKWICZ, P.; FUDALEJ, P.; CZOCHROWSKA, E. W. Transplant vs implant in a patient with agenesis of both maxillary lateral incisors: A 9-year follow-up. **Am J Orthod Dentofacial Orthop.**, v.149, n.5, p. 751-6, 2016.

SILVEIRA, G. S.; ALMEIDA, N. V.; PEREIRA, D. M. T. *et al.* Prosthetic replacement vs space closure for maxillary lateral incisor agenesis: A systematic review. **Am J Orthod Dentofacial Orthop.**, v.150, n.2, p.228-37, 2016.

THIESEN, G. Agenesis of maxillary lateral incisor in an Angle Class II, Division 1 malocclusion patient. BBO Case Report. **Dental Press J. Orthod.**, v. 20, n. 5, 2015.

TORRES, P. F. *Et al.* Anomalias dentárias de número em pacientes ortodônticos. Revista de odontologia da unesp. V.44, n.5, p. 280-284, set/ out. 2015

TURINI, N. K; SILVA, P. R.; HOFSTAETTER, M. F. F. *et al.* Interação perio-prótese-implante para correção de agenesia de incisivos laterais superiores e inferiores e incisivos centrais inferiores: relato de caso. **Revista Mundi Saúde e Biológicas.** Curitiba, PR, v. 6, n. 1, jan./jun., 2021.