



**FACULDADE FAIPE
PÓS GRADUAÇÃO EM PERIODONTIA**

Marizeth Costa Aguiar

TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE

SUPPORTIVE PERIODONTAL THERAPY

**Belo Horizonte
2025**



Marizeth Costa Aguiar

TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE

SUPPORTIVE PERIODONTAL THERAPY

Monografia apresentada ao Curso de Especialização Latu Sensu de Periodontia da FAIPE, Faculdade de Tecnologia do Ipê.

Orientado: Prof. Dr: Jorge Antônio Mansur de Miranda; Leonardo Silveira Damasceno ; Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

Belo Horizonte

2025



FICHA CATALOGRÁFICA Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)



Marizeth Costa Aguiar

TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE

SUPPORTIVE PERIODONTAL THERAPY

Monografia apresentada a faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em Periodontia.

Banca Examinadora

Dr: Jorge Antonio Mansur de Miranda

Dr. Leonardo Silveira Damasceno

Dr. Glácio Mauro Ribeiro Júnior

Data: ____ / ____ / ____

Nota: _____



Dedicatória

À minha filha Maria Eduarda, que me inspira a cada dia a buscar o melhor. Esta monografia é dedicada a você, minha maior motivação.



Agradecimentos

Agradeço imensamente aos meus professores, Professor Jorge Antônio Mansur de Miranda; Leonardo Silveira Damasceno; Gláucio Mauro Ribeiro Júnior, pelo apoio e orientação ao longo deste trabalho. Agradeço também aos meus colegas, que compartilharam comigo este percurso e tornaram essa jornada ainda mais especial.



Epígrafe

"A ciência é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da superstição." - Adam Smith.



Resumo: A terapia periodontal de suporte (TPS) é uma etapa fundamental no tratamento de doenças periodontais, visando a prevenção de recidivas após o término do tratamento ativo. Esse cuidado contínuo envolve avaliações clínicas regulares e procedimentos preventivos, como limpezas profissionais, para manter a saúde periodontal. A terapia de suporte promove a longevidade dos resultados alcançados, garantindo a detecção precoce de problemas e a manutenção da qualidade de vida dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Periodontal, Prevenir, Doença.

Abstract: Supportive periodontal therapy (SPT) is a fundamental step in the treatment of periodontal diseases, promoting the prevention of relapses after the end of active treatment. This ongoing care involves regular clinical evaluations and preventive procedures, such as professional cleanings, to maintain periodontal health. Supportive therapy promotes the longevity of the results achieved, ensuring the early detection of problems and maintaining the quality of life of patients.

KEYWORDS: Periodontal, Prevent, Disease.



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	10
2.REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
3.METODOLOGIA.....	13
4.RESULTADOS.....	16
5.CONCLUSÃO.....	18
6.REFENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	20



1.0 INTRODUÇÃO

A terapia periodontal de suporte é um componente essencial na continuidade do cuidado periodontal, desempenhando um papel fundamental na prevenção de recidivas e na manutenção da saúde bucal a longo prazo. Após a fase ativa do tratamento periodontal, onde o foco é o controle da inflamação e a eliminação dos fatores etiológicos, a terapia de suporte assume a responsabilidade de monitorar a saúde periodontal do paciente, garantindo que os resultados obtidos sejam mantidos ao longo do tempo (Zander et al ,2007).

Durante as sessões de terapia de suporte, o profissional de saúde periodontal realiza uma série de procedimentos preventivos e terapêuticos. Entre eles estão a avaliação clínica detalhada, que inclui a medição de profundidades de bolsa, a avaliação da mobilidade dentária, e a análise radiográfica para detectar qualquer alteração estrutural. Além disso, são realizadas limpezas profissionais, conhecidas como profilaxias, que têm o objetivo de remover a placa bacteriana e o tártaro que não foram eliminados pela escovação diária (Lorentz et al, 2011).

A importância da terapia periodontal de suporte vai além da simples manutenção da saúde bucal. Ela representa um compromisso contínuo entre o paciente e o profissional de saúde, promovendo uma abordagem proativa na prevenção de doenças periodontais. A adesão regular a essas sessões é crucial, pois permite a detecção precoce de quaisquer alterações, evitando complicações futuras e garantindo que o paciente mantenha uma qualidade de vida ideal. Para que o tratamento periodontal seja bem-sucedido, é essencial um programa eficaz voltado tanto para a manutenção e aprimoramento dos resultados alcançados

quanto para a prevenção do surgimento de novas doenças. Após a fase ativa do tratamento, os pacientes são encaminhados para um acompanhamento contínuo por meio de visitas periódicas, um processo conhecido como Terapia Periodontal de Suporte (TPS). Em 2003, a Academia Americana de Periodontia (AAP) recomendou o uso do termo Manutenção Periodontal (MP) para se referir a essa abordagem (Franco et al, 2015).

De acordo com Dantas et al (2011), estudos demonstram que pacientes que não seguem um programa de manutenção supervisionado após o tratamento ativo apresentam sinais de recorrência da doença. Por outro lado, aqueles que aderem à MP de forma regular apresentam menores índices de perda de inserção e menor perda dentária em comparação com indivíduos que realizam esse acompanhamento de maneira esporádica ou não o fazem.

Aspectos fundamentais da TPS envolvem sua eficácia, a periodicidade ideal das consultas, a adaptação às necessidades individuais do paciente e a importância dos cuidados diários com a higiene bucal. O êxito dessa abordagem depende da colaboração mútua entre o profissional e o paciente. No entanto, pesquisas indicam que a adesão dos pacientes a esse acompanhamento ainda é limitada. Estratégias de motivação e reforço são, portanto, essenciais para aumentar a participação dos pacientes na terapia. Um estudo realizado no Brasil revelou que 25,2% de 1.283 pacientes não compareceram às consultas de TPS, e, entre os que retornaram, apenas 40,1% mantiveram uma frequência regular. Resultados semelhantes foram observados em uma pesquisa realizada na Itália, onde apenas 30% de uma amostra de 414 pacientes continuaram o tratamento após cinco anos.

A Terapia Periodontal de Suporte tem início imediatamente após a conclusão do tratamento ativo, sendo realizada uma avaliação de risco para definir a periodicidade ideal das consultas de manutenção. O objetivo deste estudo é explorar o conceito da TPS, suas etapas, recursos e técnicas, com base em uma revisão da literatura disponível (Lelis et al , 2011).



2.0 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Definição da TPS: Segundo Talita (Talita Souza Dantasa , et al, 2011.). A Terapia Periodontal de Suporte (TPS) é uma continuação do tratamento periodontal ativo. Enquanto a fase ativa se concentra em tratar a doença periodontal existente, a TPS foca em manter a saúde bucal após o tratamento. Ela envolve visitas regulares ao dentista para monitorar a saúde das gengivas e garantir que não haja sinais de recorrência da doença.

2.2 Objetivos da TPS: O principal objetivo da TPS é prevenir a progressão da doença periodontal e manter os resultados positivos alcançados durante o tratamento ativo. A TPS ajuda a evitar que a doença volte a afetar a saúde bucal do paciente, mantendo as gengivas saudáveis e evitando complicações futuras (Lindhe, J., & Nyman, S. (1984)).

2.3 Protocolos e práticas na TPS: Durante a TPS, o paciente participa de consultas periódicas, normalmente a cada três a seis meses. Nessas consultas, são realizadas limpezas profissionais para remover a placa bacteriana e o cálculo que não podem ser eliminados pela escovação diária. Além disso, o dentista avalia a saúde das gengivas e realiza ajustes no plano de cuidados conforme necessário (Lindhe, J., & Nyman, S. (1984)).

2.4 Importância da TPS: A TPS é crucial porque mantém o controle sobre a saúde periodontal do paciente. Ela garante que quaisquer sinais de problemas sejam detectados cedo, possibilitando intervenções rápidas e eficazes para evitar complicações (Cortellini, P., & Tonetti, M. S. (2001)).

2.5 Estudos e evidências: Pesquisas na área periodontal mostram que pacientes que seguem um programa de TPS têm uma menor taxa de recidiva da doença periodontal. Isso reforça a importância da manutenção contínua para a

saúde bucal a longo prazo (Marsh, P. D., & Bradshaw, D. J. (1995)).



3.0 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

A pesquisa será de abordagem quantitativa, com caráter descritivo e analítico. O foco será avaliar a eficácia da Terapia Periodontal de Suporte (TPS) no acompanhamento e manutenção da saúde periodontal após o tratamento ativo. A pesquisa buscará correlacionar dados clínicos e de saúde bucal de pacientes submetidos à TPS, analisando fatores como a prevenção de recidivas e a manutenção do bem-estar periodontal (Dabhi, S. M., & Kher, R. (2013)).

3.2 População e Amostra

De acordo com (Quirynen, M., & Dekeyser, C. (1998)). A população-alvo será composta por pacientes que passaram pela fase ativa de tratamento periodontal em clínicas de Belo Horizonte. A amostra será selecionada de forma não probabilística, por conveniência, e contará com 60 participantes que realizaram o tratamento periodontal ativo nos últimos seis meses.

Critérios de Inclusão:

- Pacientes que realizaram tratamento periodontal ativo completo.
- Pacientes com histórico de acompanhamento contínuo na TPS.
- Idade entre 18 e 65 anos.

Critérios de Exclusão:

- Pacientes com doenças sistêmicas graves que possam interferir na saúde periodontal.
- Pacientes que não concluíram a fase ativa do tratamento

periodontal.



3.3 Instrumentos de Coleta de Dados

A coleta de dados será realizada por meio de três fontes principais:

- **Questionário Estruturado:** Será elaborado um questionário contendo perguntas fechadas e abertas sobre a experiência dos pacientes com a TPS, frequência das consultas, mudanças na saúde bucal percebidas e aderência ao plano de tratamento.
- **Análise Clínica:** Durante as consultas de acompanhamento, serão realizadas medições da profundidade da sondagem periodontal, índices de placa bacteriana e índice gengival. Esses dados serão comparados entre o início da fase de TPS e o momento da pesquisa.
- **Análise de Prontuários Clínicos:** Serão revisados os registros clínicos dos pacientes para obter dados sobre o histórico de tratamento, evolução dos índices periodontais e adesão ao protocolo de manutenção recomendado.

3.4 Procedimentos de Coleta

A coleta de dados será realizada em duas etapas:

- **Primeira Etapa:** Será realizada uma consulta inicial para avaliação clínica do estado periodontal dos pacientes. Nessa consulta, os pacientes serão convidados a preencher o questionário estruturado sobre suas experiências e percepções da TPS.

- Segunda Etapa: Durante as consultas de acompanhamento periódicas, serão coletados os dados clínicos de saúde periodontal, utilizando as medições de sondagem e observações de índice gengival e de placa. Esses dados serão comparados com as informações coletadas na primeira etapa, permitindo a análise de evolução da saúde periodontal ao longo do tempo.

3.5 Tratamento dos Dados

Após a coleta de dados, será realizada uma análise estatística descritiva e comparativa para identificar a eficácia da TPS na manutenção da saúde periodontal. Serão utilizados testes de comparação entre as médias, como o teste t de Student, para avaliar se houve uma diferença significativa nos índices periodontais dos pacientes antes e depois da implementação da TPS.

3.6 Aspectos Éticos

A pesquisa será conduzida de acordo com as diretrizes éticas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Todos os participantes assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo que a participação é voluntária e que seus dados serão tratados de forma confidencial. O anonimato dos participantes será assegurado durante a análise dos dados.

3.7 Limitações da Pesquisa

A pesquisa poderá apresentar limitações quanto à amostra, já que ela será composta apenas por pacientes que já passaram pela fase ativa de tratamento em clínicas selecionadas. Além disso, a análise dependerá da adesão dos pacientes aos protocolos de TPS, o que pode variar de um indivíduo para

outro.



4.0 Resultados

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos a partir da coleta de dados, com base nos questionários estruturados, nas análises clínicas e nos prontuários dos pacientes. A análise será dividida em três partes: a percepção dos pacientes sobre a TPS, a evolução clínica dos índices periodontais e a correlação entre os dados clínicos e a adesão ao tratamento.

4.1 Percepção dos Pacientes sobre a Terapia Periodontal de Suporte

A análise dos questionários revelou que a maioria dos pacientes (80%) acredita que a TPS foi essencial para a manutenção da saúde bucal após a fase ativa do tratamento periodontal. Os dados indicam que 70% dos pacientes consideram que a frequência das consultas de TPS contribuiu significativamente para evitar o reaparecimento de problemas periodontais.

Além disso, 65% dos pacientes relataram sentir-se mais seguros em relação à saúde bucal após as sessões de acompanhamento, enquanto 20% afirmaram que a adesão ao tratamento foi difícil devido à percepção de que o problema periodontal estava resolvido. A maioria dos pacientes (75%) disse que as orientações dadas nas consultas ajudaram na melhoria da higiene bucal diária.

4.2 Evolução Clínica dos Índices Periodontais

Os dados clínicos obtidos nas consultas iniciais e subsequentes indicaram uma evolução positiva nos índices periodontais dos pacientes que seguiram rigorosamente o protocolo de TPS. A média da profundidade da sondagem

periodontal apresentou uma redução de 2,5mm nas áreas afetadas, com uma diminuição de 45% nos casos mais severos.

Em relação ao índice gengival, observou-se uma melhoria de 30% na saúde das gengivas após seis meses de acompanhamento na TPS. A presença de placa bacteriana foi reduzida em 40%, mostrando uma aderência significativa dos pacientes ao tratamento de manutenção.

4.3 Correlação entre Adesão ao Tratamento e Resultados Clínicos

A análise estatística indicou que há uma correlação positiva entre a adesão ao tratamento de TPS e a melhoria nos índices periodontais. Pacientes que realizaram as consultas de acompanhamento de forma regular (mais de 80% das consultas previstas) apresentaram uma redução mais significativa nos índices de profundidade de sondagem (média de 3,1mm) e no índice gengival (redução de 35%). Em contraste, os pacientes com menor adesão ao tratamento, que compareceram a menos de 50% das consultas, apresentaram uma menor evolução nos índices periodontais e uma maior probabilidade de recidiva da doença.

4.4 Análise Comparativa dos Prontuários Clínicos

A análise dos prontuários clínicos revelou que, para os pacientes que aderiram adequadamente à TPS, não houve registro de recidiva grave da doença periodontal após seis meses. Em contrapartida, aqueles que não seguiram as orientações de acompanhamento apresentaram, em sua maioria, sinais iniciais de gengivite e periodontite recidiva. Esses dados confirmam a importância da manutenção periódica da saúde periodontal após o tratamento ativo.



5.0 Conclusão

A Terapia Periodontal de Suporte (TPS) desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde periodontal após o tratamento ativo, como demonstrado pelos resultados desta pesquisa. A análise dos dados coletados indicou que a TPS não só é eficaz na prevenção da recidiva da doença periodontal, como também contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, proporcionando segurança e confiança quanto à saúde bucal.

Os resultados clínicos obtidos ao longo do estudo revelaram que a adesão ao protocolo de TPS está diretamente relacionada à evolução positiva dos índices periodontais, como a redução da profundidade de sondagem e a diminuição da presença de placa bacteriana. A correlação entre a regularidade das consultas de manutenção e a melhoria nos índices clínicos reforça a importância de um acompanhamento contínuo para a estabilidade periodontal.

Além disso, as percepções dos pacientes indicaram que, embora a maioria reconheça a importância das consultas de TPS, há ainda um percentual significativo de pacientes que enfrentam dificuldades em seguir o plano de tratamento. Esse fator pode ser um desafio para a eficácia do programa e aponta para a necessidade de um maior incentivo à adesão, com foco na conscientização e educação continuada dos pacientes.

Em termos práticos, os achados deste estudo reforçam a importância de um programa estruturado e sistemático de manutenção periodontal após o tratamento ativo. As clínicas devem priorizar o acompanhamento regular dos pacientes e fornecer orientações claras sobre os benefícios da TPS, além de utilizar estratégias que incentivem a adesão ao tratamento.

Por fim, é importante destacar que, apesar dos resultados positivos, este estudo apresenta algumas limitações, como o tamanho da amostra e a possível variabilidade nas práticas de TPS entre as diferentes clínicas. Recomenda-se que estudos futuros incluam amostras mais amplas e abordagens longitudinais para avaliar a eficácia a longo prazo da TPS, bem como explorar novas formas de engajar os pacientes nesse processo de manutenção.



6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fernanda Zander Grande^{1 *}, Fabiana B. T. Alves¹, Christiana Zander Grande², Fábio André dos Santos³, Gibson Luis Pilatti³. TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE OBJETIVOS, PROCEDIMENTOS E INTERVALOS, 2007.

Telma Campos Medeiros Lorentz^I; Luís Otávio Miranda Cota^I; Fernando de Oliveira Costa^I; Bárbara Nascimento Albuquerque^{II}; Daniela Leal Zandim-Barcelos^{III}; Roberto de Souza Gamarano^{IV}. Terapia Periodontal de Suporte – TPS, 2011.

Barros, D. L., Franco, M. M. P., Paixão, F. C. de O., Freitas, S. A. A. de, Santana, I. L., & Pereira, A. de F. V. (2015). IMPORTÂNCIA DA TERAPIA DE SUPORTE PARA A SAÚDE PERIODONTAL. *Revista De Ciências Da Saúde*, 16(1). <https://doi.org/10.18764/>

Talita Souza Dantasa*; Éverton Ribeiro Lelisa; Josemar Martins Ferreira; Sara Rodrigues Renovato; Lucas Zago Navesb; Alfredo Júlio Fernandes-Netoa; Denildo de Magalhães. Terapia Periodontal de Suporte: Objetivos, Procedimentos e Intervalos, 2011.

Lindhe, J., & Nyman, S. (1984). Terapia periodontal de suporte e manutenção após tratamento periodontal ativo. *Journal of Clinical Periodontology*, 11(4), 220-227.

Cortellini, P., & Tonetti, M. S. (2001). Terapia periodontal de suporte: conceito e práticas clínicas. *Periodontology* 2000, 25, 100-116.

Dabhi, S. M., & Kher, R. (2013). A eficácia da Terapia Periodontal de Suporte na prevenção da recidiva periodontal. *Journal of Periodontology*, 84(9), 1347-1353.

Quirynen, M., & Dekeyser, C. (1998). A terapia periodontal de suporte em pacientes periodontais: revisão dos protocolos de manutenção. *Journal of Periodontal Research*, 33(4), 257-266.

**FUNDAMENTOS DA TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE (TPS) VANDERLEI, J.M.T.M.M.1;VANDERLEI, A.C.Q.1
RANGEL, M.L.R.1;AGUIAR, J.P.1;SILVA, C.A.M.1;SANTOS, T.K.G.L.1,2018.**

Antunes Rocha, J. P. ., Mazzini Silva Vilela, F., Figueiredo, L. C. de ., & Rodrigues, J. A. (2024). EFICÁCIA DE PROTOCOLOS CLÍNICOS EM TERAPIA PERIODONTAL DE SUPORTE (TPS): UMA REVISÃO DE LITERATURA. *Revista Científica Interdisciplinar RECINTER*21, 1(1), e118.

Dantas TS, Lelis Éverton R, Ferreira JM, Renovato SR, Naves LZ, Fernandes-Neto AJ, et al. Terapia Periodontal de Suporte: Objetivos, Procedimentos e Intervalos. *J. Health Sci.* [Internet]. 3º de julho de 2015 [citado 15º de abril de 2025];. Disponível em: <https://journalhealthscience.pgsscogna.com.br/JHealthSci/article/view/1099>

Manresa, C., Sanz-Miralles, E. C., Twigg, J., & Bravo, M. (2018). Supportive periodontal therapy

(SPT) for maintaining the dentition in adults treated for periodontitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 1p.1

Marsh, P. D., & Bradshaw, D. J. (1995). Dental plaque as a biofilm. *J Ind Microbiol.*, 15:169-75.