

# **Método de Newton-Raphson**

## Métodos Numéricos para encontrar raíces

Gleny Angélica Condori Mamani   Nexu Yohan Mamani Yucra  
Cristian Ronaldo Paucar Yupanqui   Henry Ccoarite Dueñas

Universidad Nacional Del Altiplano

October 2, 2025

# Idea general

- Objetivo: Resolver  $f(x) = 0$ .
- Idea geométrica: usar la **recta tangente** en un punto cercano para aproximar la raíz.
- Fórmula de iteración:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

# Derivación del método

- 1 Expansión de Taylor en  $x_n$ :

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

- 2 Se impone  $f(x) = 0$ .

- 3 Se despeja  $x$ :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

## Resultado

Si  $f(r) = 0$ ,  $f'(r) \neq 0$  y  $f \in C^2$ :

$$e_{n+1} \approx C e_n^2 \quad \text{con } C = \frac{|f''(r)|}{2|f'(r)|}$$

- Orden de convergencia: **cuadrático**.
- Significa que los dígitos correctos se duplican en cada iteración.

# Ventajas y desventajas

## Ventajas

- Muy rápido (convergencia cuadrática).
- Alta precisión en pocas iteraciones.

## Desventajas

- Requiere derivada  $f'(x)$ .
- Puede divergir si  $x_0$  está lejos de la raíz.
- Problemas si  $f'(x)$  es cercano a cero.

## Ejemplo: Calcular $\sqrt{10}$

$$f(x) = x^2 - 10, \quad f'(x) = 2x$$

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{10}{x_n} \right)$$

Iteraciones con  $x_0 = 3$ :

- $x_1 = 3.1667$
- $x_2 = 3.1623$
- $x_3 = 3.162278$

$$\sqrt{10} \approx 3.162278$$

# Aplicaciones del método

- Física y química computacional.
- Optimización en machine learning.
- Resolución de polinomios y ecuaciones trascendentes.
- Ingeniería: modelos no lineales y simulaciones.

- Método iterativo basado en tangentes.
- Muy eficiente: convergencia cuadrática.
- Requiere derivada y un buen punto inicial.
- Ampliamente usado en ciencias e ingeniería.