

Protocol aanvoer schapen

Versie 2, 18 januari 2022

1 Doelstelling

Dit protocol is bedoeld voor de schapenhouderijen die dieren aanvoeren van een ander bedrijf. Het beoogt op een praktische wijze de kans op insleep van CL zoveel mogelijk te beperken.

2 Stappenplan

Uitvoering van visuele inspecties volgens 'Protocol visuele inspectie CL'.

Uitvoering van hygiënemaatregelen volgens 'Protocol hygiënemaatregelen CL'.

Voorafgaand aan het transport

Probeer een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het bedrijf van herkomst:

- CL status en verleden
- Recente contacten met andere bedrijven
- Mate van alertheid op aanwezigheid van CL

Op basis van deze beeldvorming kan besloten worden om de aanvoer wel of niet te laten plaats vinden.

Visuele inspectie van de aan te voeren dieren .

Na aankomst op het bedrijf

- Quarantaine periode van minimaal 6 maanden. Om het risico te spreiden wordt het aanbevolen om de quarantainegroepen niet te groot te maken, bijvoorbeeld niet meer dan 10 dieren.
- Bloedonderzoek direct na aankomst.
- Maandelijks visuele inspectie volgens 'Protocol visuele inspectie CL'.
- Tweede bloedonderzoek 6 maanden na het eerste bloedonderzoek.

Indien alle inspecties en bloedonderzoeken een gunstig resultaat hebben opgeleverd mag worden geconcludeerd dat de kans op de aanwezigheid van CL minimaal is. De dieren kunnen vervolgens worden toegevoegd aan de andere dieren op het bedrijf.