



I. ORFANIDIS

3.2 Determine the causal impulse response $h(n)$ for $n \geq 0$ of the LTI systems described by the following I/O difference equations:

a. $y(n) = 3x(n) - 2x(n-1) + 4x(n-3)$

b. $y(n) = 4x(n) + x(n-1) - 3x(n-3)$

c. $y(n) = x(n) - x(n-3)$

Giải:

a) Thay $x(n) = \delta(n) \Rightarrow y(n) = h(n)$ ta được:

$$h(n) = 3\delta(n) - 2\delta(n-1) + 4\delta(n-3) = \{3, -2, 0, 4\}$$

b) Thay $x(n) = \delta(n) \Rightarrow y(n) = h(n)$ ta được:

$$h(n) = 4\delta(n) + \delta(n-1) - 3\delta(n-3) = \{4, 1, 0, -3\}$$

c) Thay $x(n) = \delta(n) \Rightarrow y(n) = h(n)$ ta được:

$$h(n) = \delta(n) - \delta(n-3) = \{1, 0, 0, -1\}$$

3.3 Determine the causal impulse response $h(n)$ for $n \geq 0$ of the LTI systems described by the following I/O difference equations:

a. $y(n) = -0.9y(n-1) + x(n)$

b. $y(n) = 0.9y(n-1) + x(n)$

c. $y(n) = 0.64y(n-2) + x(n)$

d. $y(n) = -0.81y(n-2) + x(n)$

e. $y(n) = 0.5y(n-1) + 4x(n) + x(n-1)$

a) Thay $x(n) = \delta(n) \Rightarrow y(n) = h(n)$ ta được:

$$h(n) = -0.9h(n-1) + \delta(n)$$

▪ $n = 0 \Rightarrow h(0) = -0.9h(-1) + \delta(0) = 1$

▪ $n = 1 \Rightarrow h(1) = -0.9h(0) + \delta(1) = (-0.9)^1$

▪ $n = 2 \Rightarrow h(2) = -0.9h(1) + \delta(2) = (-0.9)^2$

$$\Rightarrow h(n) = (-0.9)^n u(n) = \begin{cases} (-0.9)^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

b) Tương tự câu a, ta có:

$$\Rightarrow h(n) = 0.9^n u(n) = \begin{cases} 0.9^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

c) Thay $x(n) = \delta(n) \Rightarrow y(n) = h(n)$ ta được:

$$h(n) = 0.64h(n-2) + \delta(n)$$

- $n = 0 \Rightarrow h(0) = 0.64h(-2) + \delta(0) = 1$
- $n = 1 \Rightarrow h(1) = 0.64h(-1) + \delta(1) = 0$
- $n = 2 \Rightarrow h(2) = 0.64h(0) + \delta(2) = 0.64^1$
- $n = 3 \Rightarrow h(3) = 0.64h(1) + \delta(3) = 0$
- $n = 4 \Rightarrow h(4) = 0.64h(2) + \delta(4) = 0.64^2$
- $n = 5 \Rightarrow h(5) = 0.64h(3) + \delta(5) = 0$
- $n = 6 \Rightarrow h(6) = 0.64h(4) + \delta(6) = 0.64^3$

$$\Rightarrow h(n) = \begin{cases} (0.64)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ chẵn} \\ 0, & n \text{ lẻ} \end{cases} \text{ hay } h(n) = \begin{cases} 0.8^n, & n \text{ chẵn} \\ 0, & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

d) Tương tự câu c, ta có:

$$\Rightarrow h(n) = \begin{cases} (-0.81)^{\frac{n}{2}}, & n \text{ chẵn} \\ 0, & n \text{ lẻ} \end{cases} \text{ hay } h(n) = \begin{cases} -0.9^n, & n \text{ chẵn} \\ 0, & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

d) Thay $x(n) = \delta(n) \Rightarrow y(n) = h(n)$ ta được:

$$h(n) = 0.5h(n-1) + 4\delta(n) + \delta(n-1)$$

- $n = 0 \Rightarrow h(0) = 0.5h(-1) + 4\delta(0) + \delta(-1) = 4$
- $n = 1 \Rightarrow h(1) = 0.5h(0) + 4\delta(1) + \delta(0) = 0.5.4 + 1 = 3 = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0$
- $n = 2 \Rightarrow h(2) = 0.5h(1) + 4\delta(2) + \delta(1) = 0.5.3 = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1$
- $n = 3 \Rightarrow h(3) = 0.5h(2) + 4\delta(3) + \delta(2) = 0.5.0.5.3 = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$$\Rightarrow h(n) = 4\delta(n) + 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u(n-1) = \begin{cases} 4, & n = 0 \\ 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, & n > 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

3.4 Determine the I/O difference equations relating $x(n]$ and $y(n]$ for the LTI systems having the following impulse responses:

- a. $h(n) = (0.9)^n u(n)$
- b. $h(n) = (-0.6)^n u(n)$
- c. $h(n) = (0.9)^n u(n) + (-0.9)^n u(n)$
- d. $h(n) = (0.9j)^n u(n) + (-0.9j)^n u(n)$

a) Ta có:

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n-m) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + h(2)x(n-2) + \dots \\
 &= x(n) + 0.9x(n-1) + 0.9^2x(n-2) + 0.9^3x(n-3) + \dots \\
 &= x(n) + 0.9 \left[x(n-1) + 0.9x(n-2) + 0.9^2x(n-3) + \dots \right] + \dots \\
 &= x(n) + 0.9 y(n-1)
 \end{aligned}$$

b) Làm như trên $\Rightarrow y(n) = x(n) - 0.6y(n-1)$

c) Ta có:

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n-m) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + h(2)x(n-2) + \dots \\
 &= [1+1]x(n) + [0.9-0.9]x(n-1) + [0.9^2 + (-0.9)^2]x(n-2) + [0.9^3 - 0.9^3]x(n-3) \\
 &\quad + [0.9^4 + 0.9^4]x(n-4) + \dots \\
 &\Leftrightarrow y(n) = 2x(n) + 2.0.9^2x(n-2) + 2.0.9^4x(n-4) + 2.0.9^6x(n-6) + \dots \\
 &= 2x(n) + 0.9^2 \left[2x(n-2) + 2.0.9^2x(n-4) + 2.0.9^4x(n-6) + 2.0.9^6x(n-8) + \dots \right] \\
 &= 2x(n) + 0.9^2 y(n-2) \\
 &= 2x(n) + 0.81y(n-2)
 \end{aligned}$$

d) Ta có:

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n-m) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + h(2)x(n-2) + \dots \\
 &= [1+1]x(n) + [0.9j-0.9j]x(n-1) + [(0.9j)^2 + (-0.9j)^2]x(n-2) + [0.9j^3 - 0.9j^3]x(n-3) \\
 &\quad + [(0.9j)^4 + (0.9j)^4]x(n-4) + \dots \\
 &= 2x(n) + 2.(0.9j)^2x(n-2) + 2.(0.9j)^4x(n-4) + 2.(0.9j)^6x(n-6) + \dots \\
 &= 2x(n) + (0.9j)^2 \left[2x(n-2) + 2.(0.9j)^2x(n-4) + 2.(0.9j)^4x(n-6) + 2.(0.9j)^6x(n-8) + \dots \right]
 \end{aligned}$$

$$= 2x(n) + (0.9j)^2 y(n-2) = 2x(n) - 0.81y(n-2)$$

3.5 A causal IIR filter has impulse response $h(n) = 4\delta(n) + 3(0.5)^{n-1}u(n-1)$. Working with the convolutional equation $y(n) = \sum_m h(m)x(n-m)$, derive the *difference equation* satisfied by $y(n)$.

Ta có đáp ứng xung: $h(n) = \{4, 3, 3.0, 5, 3.0, 5^2, 3.0, 5^3, \dots\}$

$$y(n) = \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n-m) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + h(2)x(n-2) + \dots$$

$$= 4x(n) + 3[x(n-1) + 0.5x(n-2) + 0.5^2x(n-3) + 0.5^3x(n-4) \dots]$$

$$\Leftrightarrow y(n) = 4x(n) + 3x(n-1) + 3[0.5x(n-2) + 0.5^2x(n-3) + 0.5^3x(n-4) \dots] \quad (*)$$

Mặt khác:

$$y(n-1) = 4x(n-1) + 3[x(n-2) + 0.5x(n-3) + 0.5^2x(n-4) + \dots] \quad \rightarrow \text{Đang thiếu } 0.5$$

$$\Leftrightarrow 0.5y(n-1) = 2x(n-1) + 3[0.5x(n-2) + 0.5^2x(n-3) + 0.5^3x(n-4) + \dots] \quad (**)$$

Thêm 0.5 dỏ để cho xuất hiện cụm giống nhau, khi trừ nhau sẽ triệt tiêu ^^.

Lấy (*) - (**) \rightarrow Phép màu là đây:

$$\Leftrightarrow y(n) - 0.5y(n-1) = 4x(n) + 3x(n-1) - 2x(n-1)$$

$$\Rightarrow y(n) = 4x(n) + x(n-1) + 0.5y(n-1)$$

3.6 A causal IIR filter has impulse response:

$$h(n) = \begin{cases} 5, & \text{if } n = 0 \\ 6(0.8)^{n-1}, & \text{if } n \geq 1 \end{cases}$$

Working with the convolutional filtering equation, derive the *difference equation* satisfied by $y(n)$.

Ta có đáp ứng xung: $h(n) = \{5, 6, 6.0, 8, 6.0, 8^2, \dots\}$

$$y(n) = \sum_{m=0}^{\infty} h(m)x(n-m) = h(0)x(n) + h(1)x(n-1) + h(2)x(n-2) + \dots$$

$$= 5x(n) + 6[x(n-1) + 0.8x(n-2) + 0.8^2x(n-3) + 0.8^3x(n-4) \dots]$$

$$\Leftrightarrow y(n) = 5x(n) + 6x(n-1) + 6[0.8x(n-2) + 0.8^2x(n-3) + 0.8^3x(n-4) \dots] \quad (*)$$

Mặt khác:

$$y(n-1) = 5x(n-1) + 6[x(n-2) + 0.8x(n-3) + 0.8^2x(n-4) + \dots]$$

$$\Leftrightarrow 0.8y(n-1) = 4x(n-1) + 6[0.8x(n-2) + 0.8^2x(n-3) + 0.8^3x(n-4) + \dots] \quad (**)$$

Lấy () – (**) \rightarrow Phép màu tiếp tục:*

$$\Leftrightarrow y(n) - 0.8y(n-1) = 5x(n) + 6x(n-1) - 4x(n-1)$$

$$\Rightarrow y(n) = 5x(n) + 2x(n-1) + 0.8y(n-1)$$